



22 e 21


BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio 12

Palchetto

Num.° d'ordine 24

24644



131 D 10

P. Prov. II 327 (17-3)



382
609369

TRAITE' DES LIGNES D U PREMIER GENRE

Expliquées par une Methode nouvelle
& facile.

*Par M. O Z A N A M , Professeur
en Mathematique.*



A PARIS,

Chez ESTIENNE MICHALLET, rue S. Jacques,
à l'Image S. Paul.

M. DC. LXXXVII.

AVEC PERMISSION.



THE

NEW YORK

LIBRARY



AU LECTEUR.

CE *Traité* ayant été composé principalement en faveur de ceux qui desirent sçavoir résoudre les Equations de plus de deux dimensions par le moyen des Sections Coniques, dont ils doivent par conséquent connoître les propriétés; je n'ay pas crû être obligé de le rendre plus ample, parce qu'ils y trouveront tout ce qui leur sera nécessaire pour faire une juste application des Sections Coniques à l'Algebre, qui demeure tres-imparfaite dans celui qui n'a pas au moins la connoissance des Lignes du premier Genre. Ceux qui en souhaiteront davantage, pourront voir le grand *Traité* des Sections Coniques de M. De la Hire, pour satisfaire pleinement leur curiosité. Si ce *Traité* a le bonheur de vous plaire,

Mon cher Lecteur , je vous donnerai ensuite un *Traité des Lieux Geometriques* , que je prétends expliquer si clairement , qu'il pourra être facilement entendu par les moins habiles. Cependant pour finir agréablement ce *Livre* , nous ajoûterons à la fin la *Solution de quatre Problemes curieux* , qui est de nôtre invention , & que je n'ay communiquée qu'à peu de personnes.





T R A I T E'

D E S L I G N E S

D U P R E M I E R G E N R E.



Les lignes du premier Genre sont des lignes courbes , dans lesquelles tirant des lignes paralleles entre elles , leurs Quarrez sont à de certains Rectangles correspondans en raison donnée , telles que sont les *Sections Coniques* , ainsi appellées , parce qu'elles representent les Sections d'un *Cone* & d'un *Plan* , differemment incliné sur la base de ce *Cone*.

Cette differente inclination peut causer cinq Sections differentes, sçavoir le *Triangle*, le *Cercle*, la *Parabole*, l'*Ellipse*, & l'*Hyperbole*. Et comme le *Triangle* n'entre pas au nombre des lignes du premier genre, & que le *Cercle* est assez connu , nous parlerons seulement des trois dernieres Sections , en les considerant premierement hors du *Cone* , pour les rendre plus faciles à comprendre ; après quoy nous demontrons l'origine de ces lignes dans le *Cone*.

Nous considererons une propriété, qui soit generale pour ces trois Sections Coniques, pour pouvoir en demontrer toutes les autres proprieté qui leur sont particulieres. Cette propriété generale sera la comparaison que nous ferons des Rectangles precedens à leurs Quarrez correspondans en cette sorte.

1. 2. & 3. *Fig.* Que les deux lignes AB , BG , fassent au point B , que nous appellerons *Sommet*, l'angle donné ABG . Supposons que la ligne BG , que nous appellerons *Parametre*, soit d'une grandeur determinée, & que l'autre ligne AB , que nous appellerons *Diametre* à l'égard du Parametre BG , puisse être d'une grandeur finie & infinie.

Supposons encore, que par le point B , il passe la ligne courbe BCE , dont la propriété soit telle, que si l'on tire en dedans à droit ou à gauche, au Parametre BG , la parallele CD , terminée par le Diametre AB , prolongé quand il en sera besoin, & par la courbe BCE , le Rectangle ADB , soit au Quarré correspondant CD , comme le Diametre AB , à son Parametre BG ; & que pareillement si l'on tire au même Parametre BG , une autre parallele EF , le Rectangle AFB , soit à son Quarré correspondant EF , comme le même Diametre AB , à son Parametre BG ; & ainsi de toutes les autres paralleles que l'on peut tirer à l'infini au dedans de la courbe BCE .

Toutes ces paralleles CD , EF , seront appellées *Ordonnées* au Diametre AB , que nous appellerons *Axe*, lorsqu'il sera perpendiculaire à ses Ordonnées, c'est-à-dire, lorsque l'Angle ABG sera droit. Ainsi vous voyez que le Diametre d'une ligne courbe est

une ligne droite, qui divise en deux également toutes ^{1. 2. & 3.} ses Ordonnées, & qu'un Axe est un Diametre per- ^{Figure 1.} pendiculaire à ses Ordonnées.

Il est évident que lorsque le Diametre AB , sera au dedans de la courbe BCE , comme dans la *Fig. 2.* cette courbe BCE , renfermera un espace, & que le même Diametre AB , en représentera la longueur, quand il sera un Axe plus grand que son Parametre BG , & la largeur, quand il sera moindre.

Il est aussi évident, que lorsque le Diametre AB , sera au dehors de la courbe BCE , comme dans les *Fig. 1. 3.* cette courbe BCE , s'élargira toujours à l'infini, & qu'elle ne renfermera jamais un espace.

Il suit aisément de cette propriété generale une autre propriété, qui est aussi generale, sçavoir que le Rectangle ADB , est à son Quarré correspondant CD , comme le Rectangle AFB , à son Quarré correspondant EF , parce que toutes ces raisons sont égales à une même, sçavoir à celle du Diametre AB , à son Parametre BG .

Il suit aussi de cette même propriété generale, que la courbe BCE , doit passer par le Sommet B , & qu'on la peut décrire par une méthode aussi generale, excepté lorsque le Diametre AB , sera d'une grandeur infinie, auquel cas il faudra chercher une construction particuliere; ce que nous ferons, en cherchant auparavant une propriété particuliere pour chacune des trois courbes proposées BCE , par le moyen d'une Equation, qui exprime la relation des points de la courbe BCE , sur son Diametre AB . Une semblable Equation se nommera *Equation constitutive*.

1. 2. & 3.
Figures.

Pour donc tirer de la même propriété generale une propriété particuliere pour chaque Section Conique , pour les differencier les unes d'avec les autres, & pour en tirer des constructions particulieres, supposons

$$AB \propto d.$$

$$BG \propto p.$$

$$BD \propto x.$$

$$CD \propto y.$$

pour avoir $AD \propto d+x$, pour les Fig. 1. 3. & $AD \propto d-x$, pour la Fig. 2. & par la propriété generale on aura cette analogie,

$$dx \dagger xx, yy :: d, p.$$

pour les Fig. 1. 3. & pour la Fig. 2. on aura celle-cy,

$$dx - xx, yy :: d, p.$$

& par conséquent cette Equation constitutive,

$$yy \propto px \dagger \frac{p^2}{d}.$$

pour les Fig. 1. 3. & pour la Fig. 2. on aura celle-cy,

$$yy \propto px - \frac{p^2}{d}.$$

1. Figure.

Si nous supposons le Diametre AB , d'une grandeur infinie, en sorte qu'on ait $d \propto 0$, le terme $\frac{p^2}{d}$ s'évanouira, & l'Equation constitutive $yy \propto px \dagger \frac{p^2}{d}$ ou $yy \propto px - \frac{p^2}{d}$, se changera en celle-cy, $yy \propto px$, où l'on voit que le Quarré de l'Ordonnée CD , est égal au Rectangle sous le Parametre BG , & la partie correspondante BD , lorsque le Diametre AB , est infini, c'est-à-dire, lorsque la courbe BCE , n'a point de Diametre déterminé en dehors. Dans ce cas la courbe BCE , se nommera *Parabole*.

PARA-
BOLE.

Ainsi vous voyez qu'une Parabole est une Section Conique indéterminée, où les Quarrez des Ordonnées

nées à un Diametre sont égaux aux Rectangles sous le Parametre de ce Diametre , & les parties correspondantes du même Diametre, en les prenant depuis le Sommet , & sont par conséquent proportionnels à ces mêmes parties ; c'est-à-dire, que le Quarré CD , est au Quarré EF , comme la partie BD , à la partie BF . Mais cela se connoîtra mieux , lorsque nous traiterons en particulier de la Parabole.

Lorsque le Diametre AB , sera déterminé, l'Equation constitutive de la Fig. 2. où la courbe BCE , renferme un espace, demeurera la même, sçavoir $yy \propto px - \frac{1}{2}x^2$, & cette courbe BCE , se nommera *Ellipse*, laquelle se changera en *Cercle*, lorsque le Diametre AB , sera égal à son Parametre BG , & qu'il sera un Axe, parce que dans ce cas l'Equation constitutive $yy \propto px - \frac{1}{2}x^2$, se changera en celle-cy, $yy \propto px - xx$, laquelle fait connoître que le Rectangle ADB , seroit égal au Quarré de l'Ordonnée correspondante CD , & que pareillement le Rectangle AFB , seroit égal au Quarré de l'Ordonnée correspondante EF , comme dans le Cercle. C'est pourquoy pour faire que la courbe BCE , soit toujours une Ellipse, il ne faut pas que le Diametre AB , soit un Axe, lorsqu'il est égal à son Parametre BG .

Ainsi vous voyez qu'une Ellipse est une Section Conique qui renferme un espace, où les Quarrés des Ordonnées à un Diametre sont proportionnels aux Rectangles sous les parties correspondantes du même Diametre, qui ne doit pas être un Axe, lorsqu'il est égal à son Parametre; c'est-à-dire, que le Quarré CD , est au Quarré EF , comme le Rectangle ADB , au Rectangle AFB . Mais cela se concevra mieux, lors-

10 DES LIGNES DU PREMIER GENRE.

que nous traiterons en particulier de l'Ellipse.


3. Fig.

Enfin, lorsque le Diametre AB , sera aussi déterminé, l'Equation constitutive de la Fig. 3. où la courbe BCE , est indéterminée, demeurera aussi la même, sçavoir $yy \propto px + \frac{p^2}{4}$, & cette courbe BCE , se nommera *Hyperbole*, que nous appellerons *Equilatre*, lorsque le Diametre AB , sera égal à son Parametre BG , auquel cas l'Equation constitutive $yy \propto px + \frac{p^2}{4}$, se changera en celle-cy, $yy \propto px + xx$, laquelle fait connoître que dans ce même cas le Rectangle ADB , sera égal au Quarré CD , & que pareillement le Rectangle AFB , sera égal au Quarré de l'Ordonnée correspondante EF .

HYPER-
BOLE.

Ainsi vous voyez qu'une Hyperbole est une Section Conique indéterminée, où les Quarrés des Ordonnées à un Diametre indéterminé sont proportionnels aux Rectangles sous les parties correspondantes du Diametre indéterminé, en les prenant depuis le Sommet, & les mêmes parties augmentées du Diametre déterminé. C'est-à-dire, que le Quarré CD , est au Quarré EF , comme le Rectangle ADB , au Rectangle AFB . Mais cela s'entendra mieux, lorsque nous traiterons en particulier de l'Hyperbole.





DE LA PARABOLE.

Generation de la Parabole.

S'IL y a sur un Plan un Angle quelconque FBG , *1. Figure.* dont l'une des lignes comme BF , soit indéterminée, & l'autre BG , soit déterminée; je dis, que l'on peut trouver sur le même Plan une infinité de points d'une Parabole, dont le Sommet sera B , le Diamètre BF , & le Paramètre BG , en sorte que le Quarré d'une Ordonnée au Diamètre BF , comme de CD , soit égal au Rectangle sous le Paramètre BG , & la partie correspondante BD , telle qu'est la propriété de la courbe que nous avons appelée *Parabole*: sçavoir en cherchant entre le Paramètre BG , & la partie BD , une moyenne proportionnelle DC , laquelle étant parallèle au Paramètre BG , donnera en son extrémité C , un point de la Parabole; & pareillement en cherchant entre le même Paramètre BG , & la partie BF , une moyenne proportionnelle FE , laquelle étant parallèle au Paramètre BG , donnera en son extrémité E , un autre point de la Parabole; & ainsi ensuite.

Mais pour avoir une pratique aisée, supposons que l'Angle FBG , soit droit, en sorte que le Diamètre BF , soit un Axe. Prolongez cet Axe BF , au delà du Sommet B , en H , en sorte que la partie BH , *4. Fig.*
*Constru-
tion de la
Parabole.*

B ij

4. *Figure.* soit égale au Diametre BG , & décrivez à l'entour des lignes HD , HF , &c. les demi-cercles HID , HLE , qui donneront sur le Parametre BG , prolongé, les longueurs BI , BL , des Ordonnées CD , EF , qu'on cherche.

Demonstration.

La demonstration en est évidente : car puisque le Rectangle des lignes HB , BD , ou des lignes BG , BD , est par 35.3. égal au Quarré de la ligne BI , ou CD , il est de nécessité que le point D , soit de la Parabole. Pareillement, puisque le Rectangle des lignes, BH , BD , ou BG , BD , est égal au Quarré BI , ou EF , le point E , doit être de la Parabole. Ainsi des autres.

L'Analyse nous enseignera une autre construction de la Parabole, qui sera beaucoup plus facile que la precedente. Pour découvrir cette construction, supposons que sur l'Axe BD , on ait décrit par le Sommet B , la Parabole BC , dont le Parametre soit BG , & une des Ordonnées à l'Axe BD , soit CD . Supposons encore que sur le même Axe BD , prolongé, on ait déterminé les deux lignes égales BA , BF , en sorte qu'en quelque distance du Sommet B , que soit l'Ordonnée CD , les lignes AD , FC , soient toujours égales entre elles: car ainsi en portant la longueur de la ligne AD , depuis F , de côté & d'autre sur la perpendiculaire indéterminée CD , on aura en C , deux points de la Parabole, & l'on en pourra trouver de la même façon sur d'autres perpendiculaires indéterminées autant d'autres points que l'on voudra, lorsqu'on aura une fois déterminé la longueur des lignes BA , BF , en sorte que cette longueur soit

invariable & propre pour toutes les Ordonnées que l'on voudra tirer à l'Axe BD , pour y marquer sur chacune deux points de la Parabole, comme nous venons de dire. *s. Figure.*

Pour cette fin, il faut que la longueur des lignes BA , BF , soit indépendante de la partie indéterminée BD ; autrement cette même longueur ne pourroit pas servir pour toutes les perpendiculaires indéterminées; & il la faudroit changer autant de fois, que la perpendiculaire indéterminée CD , changeroit de place; c'est-à-dire, autant de fois que la partie correspondante BD , deviendrait plus grande ou plus petite; ce qui seroit trop incommode, & il vaudroit bien mieux décrire la Parabole par la methode precedente.

Pour donc determiner la longueur des lignes égales BA , BF , indépendamment de la partie BD , & seulement par rapport au Parametre BG , qui est invariable à l'égard de son Diametre BD , au lieu que la longueur BD , peut changer en une infinité de manieres différentes: supposons

$$BD \propto x,$$

$$CD \propto y,$$

$$BG \propto p.$$

$$BA \propto z.$$

$$BF \propto z.$$

pour avoir

$$AD \propto x + z.$$

$$DF \propto x - z.$$

$$CFq \propto xx - 2zx + zz + yy,$$

$$\text{ou } CFq \propto xx - 2zx + zz + px,$$

$$\text{à cause de } yy \propto px.$$

5. *Figure.* par la propriété de la Parabole ; & parce que la ligne AD , doit être égale à la ligne CF , leurs Quarrez seront égaux, & l'on aura cette Equation, $xx + 2zx + zz \sim xx - 2zx + zz + px$, dans laquelle on trouvera $z \sim \frac{1}{2}p$; ce qui fait connoître que la longueur des lignes BA , BF , est égale chacune au quart du Parametre BG ; & comme le Parametre BG , est invariable, la longueur des lignes BA , BF , sera aussi invariable; & elle contribuera pour trouver autant de points que l'on voudra de la Parabole, en cette sorte.

*Constru-
tion plus
facile de
la Para-
bole.* Ayant pris sur l'Axe BD , prolongé, les lignes BA , BF , égales chacune au quart du Parametre BG , portez la ligne AD , à droit & à gauche depuis le point F , sur la perpendiculaire correspondante CD , pour avoir en C , deux points de la Parabole, de sorte que le Rectangle des lignes BG , BD , sera égal au Carré de l'Ordonnée CD .

*Demon-
stration.* Car par 3. 2. on a $4BFB D + DFq \sim ADq$, & à cause de $4BF \sim BG$, & de $AD \sim CF$ par la construction, on aura $BGB D + DFq \sim CFq$; & à cause de $CFq \sim CDq + DFq$, par 47. 1. on aura $BGB D + DFq \sim CDq + DFq$; & ôtant DFq , il restera $BGB D \sim CDq$. Ce qu'il falloit démontrer.

Ce qui nous a excité à faire la ligne CF , égale à la ligne AD , plutôt qu'à la ligne BD , ou qu'à quelque autre ligne, est afin d'avoir les lignes BA , BF , d'une grandeur invariable, & conséquemment indépendante de la ligne indéterminée $BD \sim x$. Pour cette fin il ne faut pas que dans la valeur trouvée de CFq , sçavoir $xx - 2xz + zz + px$, la quantité indéterminée x , y demeure : ce qui ne se peut faire plus

commodément, qu'en égalant cette valeur $xx - 2xz$ 5. *Figure.*
 $\dagger zz \dagger px$, au Quarré $xx \dagger 2xz \dagger zz$, de la ligne AD $\in$
 $x \dagger z$, comme il a été fait.

Ce qui nous a aussi incité à rendre égales les lignes
 BA , BF , est que si on leur donnoit une autre rai-
 son qu'une raison d'égalité, on n'en pourroit pas de-
 terminer les longueurs indépendamment de la ligne
 indéterminée BD . Car si ayant supposé $BF \in z$,
 on supposoit $BA \in \frac{a}{b}$, afin qu'elle fût à la premiere
 $BF \in z$, dans la raison des deux quantitez a , b , on
 auroit $AD \in x \dagger \frac{a}{b}$, & par conséquent $ADq \in xx \dagger$
 $\frac{a^2}{b^2} \dagger \frac{2ax}{b}$, lequel étant égal à CFq , qui est $xx - 2xz$
 $\dagger zz \dagger px$, on auroit cette Equation, $xx \dagger \frac{a^2}{b^2} \dagger \frac{2ax}{b} \in xx$
 $- 2xz \dagger zz \dagger px$, laquelle étant reduite par l'Antithese
 & par l'Isomerie, on auroit celle-cy, $2abxz \dagger 2bbxz$
 $\in bbp x \dagger bbz z - aa z z$, où l'on pourroit trouver la va-
 leur de z , ou de BF : & comme la quantité indéter-
 minée x , demeureroit dans cette valeur, ce qui em-
 pêcheroit de pouvoir donner des longueurs invaria-
 bles aux lignes BA , BF , il faut faire évanouir cette
 lettre x , de l'Equation precedente, $2abxz \dagger 2bbxz \in$
 $bbp x \dagger bbz z - aa z z$; ce qui se pourroit faire, si les deux
 termes $aa z z$, $bb z z$, n'y étoient pas, parce que le
 reste $2abxz \dagger 2bbxz \in bbp x$, se pourroit diviser par x .
 Détruifons donc ces deux termes $aa z z$, $bb z z$, par
 cette Equation, $bb z z - aa z z \in 0$, dans laquelle on
 trouvera $a \in b$. Ce qui fait connoître que l'on doit
 donner une raison d'égalité aux deux lignes, BA, BF ,
 comme il a été fait.

COROLLAIRE I.

APRÈS avoir dit que le point F , se nomme

3. *Figure.* *Foyer*, nous dirons qu'il suit évidemment de ces deux constructions, que la Parabole BC , doit passer par le point B , lequel par conséquent sera son Sommet à l'égard de l'Axe BD , qui est un Diametre.

COROLLAIRE II.

IL suit aussi de ces deux constructions, que la Parabole BC , va toujours s'élargissant, parce que les Ordonnées à l'Axe BD , vont toujours croissant à mesure qu'elles s'éloignent du Sommet E .

COROLLAIRE III.

IL s'ensuit encore des deux mêmes constructions, que l'Axe BD , divise ses Ordonnées en deux également; & c'est à cause de cela que nous avons dit auparavant qu'il étoit un Diametre.

COROLLAIRE IV.

IL s'ensuit de plus, que toutes les Ordonnées à l'Axe BD , sont toujours plus petites à mesure qu'elles s'approchent du Sommet B , de sorte que celle qui passeroit par le Sommet B , se réduiroit à rien, & étant prolongée toucheroit la Parabole BC , en ce même point B , parce qu'autrement elle ne seroit pas divisée en deux également par l'Axe BD .

Ainsi, on voit que le Parametre EG , dans la position que nous luy avons donnée, qui est d'être toujours parallèle aux Ordonnées de l'Axe BD , ou perpendiculaire à l'Axe BD , touche la Parabole BC , au Sommet B , tant par ce qui vient d'être dit, que parce que s'il la rencontroit encore en un point, comme O , la ligne FO , seroit égale à la ligne AB , par la generation, & par conséquent à la ligne BF , ce qui est impossible, parce que la ligne FO , qui est opposée à

à l'Angle droit B , doit être plus grande que la ligne $B F$, qui est opposée à l'Angle aigu O , du Triangle Rectangle FBO . *3. Figure.*

DEFINITIONS.

Touchante d'une Parabole, c'est une ligne droite, qui ne rencontrant la Parabole qu'en un point, ne la coupe pas, c'est-à-dire, n'entre pas au dedans de la Parabole. 1.

Ordonnées dans une Parabole, ce sont des lignes droites tirées au dedans de la Parabole parallèlement à une même Touchante, & terminées de côté & d'autre par la Parabole. On prend néanmoins ordinairement la moitié d'une semblable ligne pour une Ordonnée. 2.

Diametre d'une Parabole, c'est une ligne droite, qui divise en deux également toutes les Ordonnées, qui sont parallèles entre elles, à l'égard desquelles il est appelé Diametre. Il est évident que ce Diametre passera toujours par le point où la Parabole est touchée par la ligne droite, à laquelle les Ordonnées au même Diametre sont parallèles. 3.

Axe de la Parabole, c'est un Diametre perpendiculaire à ses Ordonnées. 4.

Sommet de la Parabole, c'est l'extrémité du Diametre; ou le point où ce Diametre coupe la Parabole; ou le point par lequel passe la Touchante, à laquelle les Ordonnées à ce Diametre sont parallèles. 5.

Parametre d'un Diametre de la Parabole, c'est une partie de la Touchante qui passe par le Sommet, & qui est troisième proportionnelle à la partie du même Diametre, comprise entre le Sommet & une Ordon-

5. *Figure.* née, & à cette Ordonnée terminée par le Diametre, & par la Parabole.

7. *Foyer* d'une Parabole, c'est un point de l'Axe au dedans de la Parabole, éloigné du Sommet d'une quantité égale à la quatrième partie du Parametre de l'Axe.

8. *Perpendiculaire* à une Parabole, c'est une ligne droite, qui coupant la Parabole en un point, est perpendiculaire à la Touchante, qui passe par ce même point.

PROPOSITION I.

Etant donnée une Parabole, avec son Axe, trouver son Parametre & son Foyer.

5. *Figure.* **O**N donne la Parabole BC , avec son Axe BD , & il est proposé d'en trouver le Parametre à l'égard de cet Axe, & son Foyer. Tirez au dedans de la Parabole BC , une ligne quelconque CD , perpendiculaire à l'Axe BD , laquelle sera une Ordonnée au même Axe BD , par *Def. 3.* & cherchez à la partie BD , & à l'Ordonnée correspondante CD , une troisième proportionnelle BG , laquelle étant tirée par le Sommet B , parallèlement à l'Ordonnée CD , représentera le Parametre de l'Axe BD , par *Def. 6.*

Pour trouver le Foyer, prenez sur l'Axe BD , la partie BF , égale à la quatrième partie du Parametre BG , & le point F , sera le Foyer qu'on cherche, par *Def. 7.*

S C O L I E.

5. Figure.

Si au lieu de l'Axe BD , le Foyer F étoit donné, & que par son moyen on voulût trouver l'Axe, il faudroit décrire du Foyer F , une circonférence de cercle, avec une telle ouverture, qu'elle pût couper la Parabole BC , en deux points, comme C , C , lesquels étant joints par la droite CC , on devoit tirer à cette droite CC , par le Foyer F , la perpendiculaire BD , qui sera l'Axe de la Parabole BC , puisqu'elle divise en deux également, & à Angles droits l'Ordonnée CC .

P R O P O S I T I O N II.

Une ligne droite tirée au dedans d'une Parabole parallèlement à l'Axe, coupe la Parabole en un seul point.

JE dis que si la ligne CH , est parallèle à l'Axe BD , de la Parabole BC , elle coupera la Parabole BC , au seul point C , parce que la Parabole BC , s'élargissant toujours, & s'éloignant par conséquent de plus en plus de son Axe BD , par la generation, elle s'éloignera aussi de la ligne CH , parallèle à l'Axe BD , laquelle par conséquent ne sçauroit couper la Parabole BC , qu'au seul point C . Ce qu'il falloit démontrer. 5. Figure.

S C O L I E.

Si on prolonge cette parallèle CH , au dehors de la Parabole BC , jusqu'à ce qu'elle rencontre en I , la droite AI , laquelle étant parallèle à l'Ordonnée CD , ou perpendiculaire à l'Axe BD , passe par le

C ij

5. *Figure.* point A , autant éloigné du Sommet B , que le Foyer F , & qu'on mene les droites FI , FC , on connoîtra aisément que les lignes CI , CF , sont égales, parce que CI , est égale à AD , à cause du Parallélograme $ADCI$, & que AD , est égale à CF , par la generation. D'où il suit, que les deux Angles CIF , CFI , sont toujours égaux : ce qu'il est bon de remarquer, parce que cela nous servira dans la suite.

PROPOSITION III.

Tirer une Touchante par un point donné sur une Parabole donnée, dont l'Axe est aussi donné.

6. *Figure.* **P**OUR tirer une Touchante par le point donné C , sur la Parabole donnée BEC , dont l'Axe BD , est aussi donné, tirez de ce point C , à l'Axe BD , l'Ordonnée CD ; & ayant prolongé l'Axe BD , en H , en sorte que la partie BH , soit égale à la partie BD , menez la droite HC , qui touchera la Parabole donnée BEC , au point donné C , de sorte qu'elle ne la rencontrera pas en quelque autre point.

Démonstration. Car si on veut que la droite HC , rencontre la Parabole BEC , encore en un point, comme en E , tirez par ce point E , à l'Axe BD , l'Ordonnée EL , & faites $BK \sim BL$, pour avoir $KH \sim DL$, à cause des lignes égales BH , BD , & des deux égales BK , BL , par la construction.

Cette preparation étant faite, on aura par la ge-

neration, cette Analogie $BL, BD :: ELq, CDq$; & 6. *Figure*.
 en doublant les deux premiers termes BL, BD , on
 aura celle-cy, $KL, HD :: ELq, CDq$; & en don-
 nant aux deux premiers termes KL, HD , la hauteur
 commune HD , on aura celle-cy, $KLHD, HDq ::$
 ELq, CDq . Et si à la place des deux derniers ter-
 mes ELq, CDq , on met les deux HLq, HDq ,
 qui sont en même raison, à cause des Triangles sem-
 blables HLE, HDC , on aura cette autre Analo-
 gie $KLHD, HDq :: HLq, HDq$, où l'on voit,
 que puisque les deux conséquens sont égaux, les deux
 antecedens $KLHD, HLq$, sont égaux aussi : d'où
 l'on tire cette Analogie, $KL, HL :: HL, HD$; &
 en divisant, celle-cy $KH, HL :: DL, DH$, où l'on
 voit, que puisque les antecedens KH, DL , sont
 égaux, les conséquens HL, DH , sont égaux aussi;
 ce qui étant impossible, il est impossible aussi que la
 droite HC , rencontre la Parabole BEC , encore au
 point E . C'est pourquoy par *Def. 1.* la droite HC ,
 sera une Touchante. Ce qu'il falloit faire & démon-
 trer.

S C O L I E.

COMME cette démonstration ne suppose pas que
 l'Angle D , soit droit, c'est-à-dire, que le Diametre
 BD , soit un Axe, on voit que cette méthode se peut
 appliquer à quelque Diametre que ce soit, pourvû
 que l'on sçache tirer à ce Diametre une Ordonnée
 par un point donné sur la Parabole donnée, comme
 nous enseignerons dans la *Prop. IX.* & que l'on soit
 persuadé, que les Quarrez des Ordonnées à quelque
 Diametre que ce soit, sont proportionnels aux par-

6. *Figure.* ties correspondantes de ce Diametre, en les prenant depuis le Sommet, comme il sera démontré dans la *Prop. XI.*

*Autre
constru-
tion.*

7. *Figure.*

Si vous voulez une construction particuliere pour le Diametre BD , quand il est un Axe, ayant trouvé par *Prop. I.* le Parametre BG , & le Foyer F , menez par le point donné C , à l'Axe BD , la parallele CI ; & ayant tiré la droite CF , divisez l'Angle FCI , en deux également par la droite CH , qui touchera la Parabole donnée BCE , au point donné C , de sorte qu'elle ne la rencontrera pas en quelque autre point.

*Demon-
stration.*

Car si on veut que la droite CH , rencontre la Parabole BEC , encore au point E , que l'on tire par ce point E , à l'Axe BD , ou à la ligne CI , la parallele EO , & que l'on joigne les droites EI , EF , & encore la droite FI , qui sera divisée à Angles droits & en deux également au point P , par la droite CH , à cause des deux lignes égales CI , CF , comme il a été démontré au Scolie de la Proposition precedente, par lequel on connoît que les deux lignes EO , EF , sont aussi égales.

Cela étant supposé, on connoitra par 4. 1. que les deux Triangles Rectangles EPI , EPF , sont égaux, parce qu'ils ont le côté commun EP , & les deux autres PI , PF , égaux; ce qui fait que les deux Hypotenuses EI , EF , sont égales entre elles, & par conséquent à la ligne EO ; ce qui étant impossible à cause du Triangle Rectangle EOI , il est impossible aussi, que la droite CH , rencontre la Parabole BEC , encore au point E . Ce qu'il falloit démontrer.

On peut tirer aisément de ces deux constructions

une troisiéme construction, qui est tres-simple, comme vous allez voir. Ayant fait $FH \propto FC$, menez la droite CH , qui touchera la Parabole donnée BEC , au point donné C . *Troisiéme construction. 7. Figure.*

Car à cause de $FH \propto FC$, par la construction, & de $FC \propto AD$, par la generation, on aura $FH \propto AD$; & si de ces deux lignes égales FH , AD , on ôte les deux égales BF , AB , il restera les deux égales BH , BD : c'est pourquoy par la premiere construction, la droite CH , sera une Touchante. Ce qu'il falloit démontrer. *Démonstration.*

PROPOSITION IV.

Si une ligne droite touche une Parabole, cette Touchante coupera l'Axe en un point autant éloigné du Sommet, que l'Ordonnée, qui passe par le point d'attouchement.

JE dis que si la droite CH , touche la Parabole BEC , au point C , par où il passe à l'Axe BD , l'Ordonnée CD , cette Touchante CH , coupe l'Axe BD , au point H , qui est autant éloigné du Sommet B , que l'Ordonnée CD , c'est-à-dire, que les parties BD , BH , sont égales. *8. Figure.*

Car, si l'une étoit plus grande que l'autre, comme BD , qu'on en retranche $BL \propto BH$, & que par le point L , on tire à l'Axe BD , l'Ordonnée EL , qui rencontrera icy la Parabole BEC , au point E , par où l'on tirera au point H , la droite HE , qui touchera la Parabole BEC , au point E , par la Proposition précé-

1. Figure

dente; & parce que la ligne CH , est aussi une Touchante par la supposition, ces deux Touchantes HE , HC , doivent necessairement se rencontrer proche les points d'attouchement E , C , au dehors de la Parabole; & comme elles se rencontrent aussi au point H , elles comprendront un espace: ce qui étant impossible, il est impossible aussi que les deux parties BD , BH , soient inégales. Ce qu'il falloit démontrer.

S C O L I E.

ON voit aisément que ce Theoreme est aussi veritable, quand le Diametre BD , n'est pas un Axe, parce que la Proposition precedente, par le moyen de laquelle celle-cy se demontre, convient à tout Diametre, comme nous avons remarqué.

C O R O L L A I R E I.

AINSI, vous voyez que d'un même point pris hors de la Parabole, on ne peut pas tirer deux Touchantes: mais il s'ensuit aussi, que du même point C , pris sur la Parabole BEC , on ne peut tirer qu'une Touchante, comme CH : car si l'on en pouvoit tirer encore une, comme CK , qui rencontrât l'Axe BD , prolongé au point K , chacune des deux parties BH , BK , seroit égale à la même BD . Ce qui est impossible.

C O R O L L A I R E II.

IL suit aussi de cette Proposition, que si par le point d'attouchement C , on tire à l'Axe BD , la parallele CM , & qu'on acheve le reste, comme dans la Proposition precedente, l'Angle MCN , de la Touchante HN , avec la parallele CM , est égal à l'Angle FCH , de la même Touchante HN , avec la

la ligne CF , qui se tire du Foyer F , par le point *1. Figure.*
d'atouchement C .

Car si aux deux lignes égales BH, BD , on ajoû- *Demon-*
te les deux égales BF, BA , on aura les deux égales *stration.*
 FH, AD , & à cause de $AD \propto CF$, par la genera-
tion, on aura $FH \propto CF$; & l'Angle H , ou son égal
 MCN , sera égal à l'Angle FCH . Ce qu'il falloit
demontrer.

C'est pourquoy, si l'on avoit un Miroir Paraboli-
que, poli en dedans, dont le profil fût la Parabole
 BEC , & que CM , représentât un rayon du Soleil,
parallele à l'Axe BD , ce rayon CM , & tous les au-
tres qui seroient paralleles au même Axe BD , se re-
flechiroient au dedans du Miroir Parabolique par des
Angles de reflexion égaux à ceux d'incidence, & s'u-
niroient au Foyer F , où par consequent ils pourroient
produire du feu; & c'est ce qui a donné le nom de
Foyer au point F .

COROLLAIRE III.

IL suit encore de cette Proposition, que la Tou-
chante CH , divise l'Angle FCI , en deux égale-
ment; de sorte que l'Angle HCI , est égal à l'Angle
 HCF , parce que cet Angle HCF , a été démontré
égal à l'Angle H , ou à l'Angle MCN , qui est égal
à l'Angle HCI .

Puisque la Touchante CH , retranche la partie
 BH , égale à la partie BD , lorsque HD , est un Dia-
metre, s'il falloit tirer une Touchante par le point
donné H , hors de la Parabole, il faudroit tirer par
ce point H , le Diamètre HD ; ce qui sera facile,
parce que tous les Diamètres d'une Parabole sont pa-

8. Figure. ralleles, comme nous le demontrons dans la Prop. VIII. & faire $BD \simeq BH$, pour tirer par le point D , au Diametre HD , l'Ordonnée DC , qui donnera en C , le point d'attouchement.

PROPOSITION V.

Si à la Touchante d'une Parabole on tire par le point d'attouchement une perpendiculaire, qui rencontre l'Axe en un point, la partie de l'Axe comprise entre ce point & l'Ordonnée qui passe par le point d'attouchement, sera égale à la moitié du Parametre de l'Axe.

7. Fig.

JE dis, que si la Touchante CH , de la Parabole BEC , on tire par le point d'attouchement C , la perpendiculaire CP , qui rencontre en P , l'Axe BP , la partie DP , comprise entre le point P , & l'Ordonnée CD , sera égale à la moitié du Parametre BG , ou à la ligne AF , le point F , étant le Foyer, & les deux lignes AB , BF , étant égales.

Demon-
stration.

Car à cause du Triangle Rectangle HCP , on connoît par 8. 6. que le Quarré CD , est égal au Rectangle HDP ; & à cause de la Parabole BEC , on connoît que le même Quarré DC , est égal au Rectangle GBD , d'où il suit que les deux Rectangles HDP , GBP , sont égaux, & que par consequent on a cette Analogie $BG, DH :: PD, BD$; & si on prend les moitez des deux premiers termes, BG, DH , on aura celle-cy, $AF, BD :: PD, BD$; où l'on voit, que puisque les consequens sont égaux, les antecedens

AF , PD , sont égaux aussi. Ce qu'il falloit démontrer. 7. Figure.

COROLLAIRE I.

IL suit de cette Proposition, que les trois lignes FH , FC , FB , sont égales: car il a déjà été démontré au Coroll. II. de la Proposition précédente, que les deux FH , FC , sont égales; & l'on connoîtra que les deux FC , FP , sont égales aussi, en ajoutant à chacune des deux égales AF , DP , la commune DF : car ainsi on aura AD , ou FC , égale à FP .

COROLLAIRE II.

IL s'ensuit aussi, que si on prend sur l'Axe BP , la partie DP , égale à la ligne AF , ou à la moitié du Parametre BG , & qu'on tire la droite CP , cette ligne CP , sera perpendiculaire à la Parabole BEC , par Def. 8. parce que le Triangle HCP , sera Rectangle en C .

Car si aux deux lignes égales DP , AF , on ajoute la commune DF , on aura AD , ou FC , ou FH , égale à FP , & le Foyer F , sera le centre d'un cercle, qui passera par les trois points H , C , P , ce qui rend droit l'Angle HCP ; & la ligne CP , perpendiculaire à la Parabole BEC . Ce qu'il falloit démontrer. Démonstration.

PROPOSITION VI.

Tirer une ligne, qui touchant une Parabole donnée, fasse avec l'Axe un Angle égal à un Angle aigu donné.

POUR tirer une ligne droite, comme CH , qui touche la Parabole donnée BC , dont l'Axe BD , 2. Figure.

8. *Figure.* est aussi donné, & qui fasse avec le même Axe BD , un Angle, comme CHD , égal à un Angle aigu donné; ayant trouvé par *Prop. I.* le Foyer F ; & ayant fait $BA \propto BF$, tirez par les deux points A, F , à l'Axe BD , les perpendiculaires indefinies AI, FE ; & ayant tiré du Foyer F , la droite FI , qui fasse avec la ligne FE , l'Angle EFI , égal à l'Angle aigu donné, tirez par le point I , où elle rencontre la ligne AI , à l'Axe BD , la parallèle IC , qui donnera sur la Parabole BC , le point C , par où vous tirerez, par *Prop. III.* la Touchante CH , qui fera en H , l'Angle CHD , égal à l'Angle EFI , & par conséquent à l'Angle aigu donné.

*Demon-
stration.*

Car la droite FI , sera perpendiculaire à la Touchante CH , par *Constr. 2. Prop. III.* c'est pourquoy les deux Triangles Rectangles IPQ , $H AQ$, seront semblables, à cause des Angles droits A, P , & des deux égaux IQP , AQH , ce qui rend l'Angle QIP , ou $EF P$, égal à l'Angle AHQ . Et comme l'Angle $EF P$, est égal au donné, par la construction, l'Angle AHQ , sera aussi égal au donné. Ce qu'il falloit faire & démontrer.

SCOLIE.

IL est évident, que si au contraire on vouloit tirer à la Parabole BC , une perpendiculaire, comme CR , qui fît avec l'Axe BD , un Angle égal à un Angle aigu donné, il faudroit faire l'Angle AFI , égal au donné; & ayant tiré la Touchante CH , comme auparavant, on luy devroit tirer par le point C , d'attouchement, la perpendiculaire CR , qui feroit avec l'Axe BD , l'Angle CRB , égal au donné, parce que cet

Angle CRB , est égal à l'Angle EFI , égal au donné, *9. Figure*
 par la construction, à cause des deux paralleles RC ,
 FI , la premiere RC , étant perpendiculaire à la Tou-
 chante CH , par la construction, & la seconde FI ,
 aussi, par *Prop. I.*

Il est aussi évident, que puisque la ligne CR , est
 perpendiculaire à la Parabole BC , elle est la plus cour-
 te de toutes celles qu'on peut tirer du point R , à la
 même Parabole BC ; & que puisque la ligne CH ,
 touche la Parabole BC , elle est la plus grande de
 toutes celles qu'on peut tirer du point H , à la même
 Parabole BC .

PROPOSITION VII.

*Si par un point d'une Parabole on tire une ligne
 droite qui coupe la Parabole & son Axe, cette
 ligne droite étant continuée, coupera la Pa-
 rabole en un autre point.*

JE dis, que si par le point C , de la Parabole BC , *10. & 11. Figures.*
 on tire la droite CE , qui coupe la Parabole BC ,
 au même point C , & son Axe BH , en I , cette ligne
 CE , étant continuée, coupera la Parabole BC , en
 quelque autre point, comme en E .

La demonstration en sera évidente par la genera- *Demon-*
 tion, lorsque la ligne CE , sera perpendiculaire à *stration.*
 l'Axe BH ; & dans un autre cas, on fera la demon-
 stration en cette sorte.

Cherchez aux deux lignes BD , BI , une troisième
 proportionnelle BH , & tirez par le point H , à l'Axe

10. & 11.
Figures.

BH , la perpendiculaire HE , qui rencontre icy la ligne CE , au point E , par où je dis, que la Parabole BC passe.

Car ayant tiré par le point C , à l'Axe BH , la perpendiculaire CD , qui sera parallele à la ligne HE , ce qui rend semblables les deux Triangles Rectangles CDI , EHI , on considerera, que puisque par la construction, on a cette Analogie, $BD, BI :: BI, BH$, en divisant dans la *Fig. 10.* ou en composant dans la *Fig. 11.* on aura celle-cy, $BI, BH :: DI, IH$; & si à la place des deux derniers termes DI, IH , on met les deux CD, HE , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables CDI, EHI , on aura cette autre Analogie $BI, BH :: CD, HE$, & par consequent celle-cy, $BIq, BHq :: CDq, HEq$; & si à la place du Quarré BI , on met le Rectangle $BDBH$, qui luy est égal à cause des trois proportionnelles BD, BI, BH , par la construction, on aura cette autre Analogie $BDBH, BHq :: CDq, HEq$; & enfin, si à la place des deux premiers termes, ou des deux Rectangles $BDBH, BHq$, qui ont une même hauteur BH , on met leurs bases BD, BH , qui sont en même raison, par 1. 6. on aura cette dernière Analogie, $BD, BH :: CDq, HEq$; d'où il suit par la generation, que CD, HE , sont deux Ordonnees à l'Axe BH , & que par consequent le point E , est de la Parabole. C'est pourquoy la ligne CE , qui coupe la Parabole BC , au point C , la coupera encore au point E . Ce qu'il falloit demontrer.

S C O L I E.

COMME cette Proposition se peut demontrer de

la même façon, sans supposer que le Diametre BH, soit un Axe, parce que ses Ordonnées CD, EH, seront toujours parallèles entre elles, & qu'ainsi les deux Triangles CDI, EHI, seront toujours semblables, il est aisé de juger, qu'elle se peut étendre à tout Diametre, pourvu que l'on soit convaincu de la vérité de la *Prop. XI.*

COROLLAIRE.

D'où il est aisé de conclure, que lorsque BH, est un Diametre, dont CD, EH, sont les Ordonnées, les trois parties BD, BI, BH, sont proportionnelles, la ligne CE, étant une ligne droite. Ce qui se peut démontrer par un ordre retrograde, en cette sorte.

Par la generation on a cette Analogie BD, BH :: CDq, EHq, pour le moins lorsque le Diametre BH, sera un Axe, & dans un autre cas, on en verra la demonstration dans la *Prop. XI.* indépendamment de celle-cy : c'est pourquoy en donnant aux deux premiers termes BD, BH, la hauteur commune BH, on aura cette autre Analogie BDBH, BHq :: CDq, EHq; & si entre BD, BH, on trouve une moyenne proportionnelle BL, on aura BDBH ~ BLq, & l'Analogie precedente BDBH, BHq :: CDq, EHq, se changera en celle-cy, BLq, EHq :: CDq, EHq; & par consequent en celle-cy, BL, BH :: CD, EH. Et si à la place des deux derniers termes CD, EH, on met les deux DI, HI, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables CDI, EHI, on aura cette autre Analogie BL, BH :: DI, HI; & si à la place des deux premiers termes BL, BH, on met

10. & 11.
Figures.

les deux BD, BL , qui sont en même raison par la construction, on aura celle-cy, $BD, BL :: DI, HI$; & en permutant on aura celle-cy, $BD, DI :: BL, HI$; & en composant dans la *Fig. 10.* on aura celle-cy, $BD, BI :: BL, HI + BL$; ou en divisant dans la *Fig. 11.* on aura celle-cy, $BD, BI :: BL, HI - BL$. Or il est visible, que chacune de ces deux dernières Analogies se changera en celle-cy, $BD, BL :: BL, BH$, en mettant BL , à la place de BI ; c'est-à-dire, en supposant $BI \propto BL$; & comme cette Analogie s'accorde avec la construction que nous avons faite, qui est que BL , soit moyenne proportionnelle entre les deux BD, BH , cela fait connoître que BL , est effectivement égale à BI , & que par conséquent les trois lignes BD, BI, BH , sont proportionnelles. Ce qu'il falloit démontrer.

PROPOSITION VIII.

Si une ligne droite touche une Parabole, & que par le point d'attouchement on tire en dedans une ligne indéfinie parallèle à l'Axe, & par quelque autre point à la Touchante, une parallèle terminée par la Parabole; cette dernière parallèle sera divisée en deux également par la première.

11. Fig.

SUPPOSONS que la droite CO , touche la Parabole CBE , au point C , & qu'elle coupe l'Axe BH en O . Supposons encore, que la droite GE , qui coupe la Parabole CBE , aux deux points G, E , & l'Axe BH , en I , soit parallèle à la Touchante CO ,
&

& que la droite CM, qui passe par le point d'attouchement C, soit parallèle à l'Axe BH. Cela étant supposé, je dis que la droite CM, coupe la ligne GE, en deux également au point L; c'est-à-dire, que les deux lignes LE, LG, sont égales entre elles. 12. Fig.

Car si par les quatre points C, G, L, E, on tire à l'Axe BH, les perpendiculaires CD, GH, LK, EF, dont EF, soit prolongée jusqu'à ce qu'elle rencontre CM, aussi prolongée en P, on connoîtra par *Prop. IV.* que les deux parties BD, BO, sont égales; & que par la nature des parallèles, le Triangle OCD, est semblable aux Triangles EFI, EPL, GHI, GML, LKI, & qu'il est égal au Triangle LKI, & que par conséquent les lignes OD, IK, sont égales. Démonstration.

Cela étant supposé, on aura dans les Triangles semblables GHI, CDO, cette Analogie, GH, CD :: HI, DO; & en prenant les moitiés des deux derniers termes HI, DO, on aura celle-cy, GH, CD :: $\frac{1}{2}$ HI, BD, & par conséquent celle-cy, GHq, CDq :: $\frac{1}{2}$ HIq, BDq; & si à la place des deux premiers termes GHq, CDq, on met, les deux lignes BH, BD, qui sont en même raison, par la génération, on aura cette autre Analogie, BH, BD :: $\frac{1}{2}$ HIq, BDq; & donnant aux deux premiers termes BH, BD, la hauteur commune BD, on aura celle-cy, BHBD, BDq :: $\frac{1}{2}$ HIq, BDq, où l'on voit que puisque les conséquens sont égaux, les antécédens BHBD, $\frac{1}{2}$ HIq, sont égaux aussi. 1.

Pareillement dans les Triangles semblables EFI, CDO, on aura cette Analogie, EF, CD :: IF, DO; & en prenant les moitiés des deux derniers termes 2.

12. Fig.

IF, DO, on aura celle-cy, EF, CD :: $\frac{1}{2}$ IF, BD, & par conséquent celle-cy, EFq, CDq :: $\frac{1}{2}$ IFq, BDq, & si à la place des deux premiers termes EFq, CDq, on met les deux lignes BF, BD, qui sont en même raison, par la generation, on aura celle-cy, BF, BD :: $\frac{1}{2}$ IFq, BDq; & en donnant aux deux premiers termes BF, BD, la hauteur commune BD, on aura celle-cy, BFB D, BDq :: $\frac{1}{2}$ IFq, BDq, où l'on voit, que puisque les conséquens sont égaux, les antecedens BFB D, $\frac{1}{2}$ IFq, sont égaux aussi.

3.

Puisque donc nous avons BDBH $\propto \frac{1}{2}$ HIq, par l'article premier, & BFB D $\propto \frac{1}{2}$ IFq, par l'article precedent, nous aurons BDBH - BFB D $\propto \frac{1}{2}$ HIq - $\frac{1}{2}$ IFq, & par conséquent cette Analogie, BD, $\frac{1}{2}$ HI $\frac{1}{2}$ FI :: $\frac{1}{2}$ HI - $\frac{1}{2}$ FI, BH - BF, ou BD, $\frac{1}{2}$ FH :: $\frac{1}{2}$ HI - $\frac{1}{2}$ FI, FH, où l'on voit, que puisque le conséquent FH, est double du conséquent $\frac{1}{2}$ FH, aussi l'antecedent $\frac{1}{2}$ HI - $\frac{1}{2}$ FI, est double de l'antecedent BD, & par conséquent égal à DO, ou à KI.

4.

Dans les Triangles semblables EFI, GHI, on a cette Analogie, IH, IF :: GH, EF; & en prenant les moitez des deux premiers termes IH, IF, on aura celle-cy, $\frac{1}{2}$ IH, $\frac{1}{2}$ IF :: GH, EF, & en divisant on aura celle-cy, $\frac{1}{2}$ IH - $\frac{1}{2}$ IF, $\frac{1}{2}$ IF :: GH - EF, EF; & si au lieu du premier terme $\frac{1}{2}$ IH - $\frac{1}{2}$ IF, on met IK, qui luy est égal, par l'article precedent, on aura celle-cy, IK, $\frac{1}{2}$ FI :: GH - EF, EF, & en composant on aura celle-cy, KI $\frac{1}{2}$ FI, $\frac{1}{2}$ FI :: GH, EF; & si à la place des deux derniers termes GH, EF, on met les deux IH, IF, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables EFI, GHI, ou seulement leurs moitez

$\frac{1}{2}IH$, $\frac{1}{2}IF$, qui sont aussi en même raison, on aura *12. Fig.* cette autre Analogie, $KI \div \frac{1}{2}FI$, $\frac{1}{2}FI :: \frac{1}{2}HI$, $\frac{1}{2}FI$, où l'on voit, que puisque les conséquens sont égaux, les antécédens $KI \div \frac{1}{2}FI$, $\frac{1}{2}HI$, sont égaux aussi, & par conséquent leurs doubles $2KI \div FI$, HI ; & comme $2KI \div FI$, vaut autant que $FK \div IK$, il suit que $FK \div IK$, est égal à IH : c'est pourquoy en ôtant IK , de chacun, il restera $FK \propto HK$, ou $LP \propto LM$, & par conséquent $LG \propto LE$, à cause des Triangles semblables LGM , LEP . Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

ON démontrera de la même façon, qu'une autre ligne que GE , parallèle à la même touchante CO , comme QR , sera divisée en deux également au point S , par la même ligne CM , laquelle, par conséquent, sera le Diametre des Ordonnées GE , QR , par *Def. 3.* D'où il est aisé de conclure, que tous les Diametres d'une Parabole, sont parallèles entre eux & à l'Axe.

PROPOSITION IX.

Tirer à un Diametre donné par un point donné sur une Parabole donnée, une Ordonnée.

POUR tirer au Diametre donné BD , par le point *13. Fig.* donné A , sur la Parabole donnée ABC , une Ordonnée, tirez par le point donné A , au Sommet B , la droite AB , & la prolongez en E , en sorte que BE , soit égale à AB . Tirez par le point E , au Diametre BD , la parallèle EC , qui donnera sur la Pa-

13. *Figure.* parabole ABC , le point C , par lequel & par le point donné A , on tirera la ligne AC , qui sera l'Ordonnée qu'on cherche.

Demonstration.

Car dans le Triangle ACE , la ligne BF , se trouvant parallele à la base CE , par la construction, on aura cette Analogie, $AB, BE :: AF, CF$, où l'on voit, que puisque les deux premiers termes AB, BE , sont égaux, par la construction, les deux derniers AF, CF , sont égaux aussi, & que la ligne AC , se trouve divisée en deux également au point F , par le Diametre BD ; c'est pourquoy la ligne AC , sera une Ordonnée au Diametre donné BD , par *Def. 3.* Ce qu'il falloit faire & demontrer.

SCOLIE.

S'IL faloit tirer au Diametre donné BD , une Ordonnée par un autre point que sur la Parabole ABC , comme par le point I , il faudroit tirer par ce point I , à l'Ordonnée AC , la parallele GH , &c.

PROPOSITION X.

Trouver l'Axe d'une Parabole donnée.

13. *Figure.* **P**OUR trouver l'Axe de la Parabole donnée ABC , tirez en dedans deux paralleles quelconques AC, GH , & par leurs points de milieu F, I , tirez la droite BD , qui sera leur Diametre, par *Def. 3.* & qui seroit l'Axe de la Parabole ABC , s'il estoit perpendiculaire à ses Ordonnées AC, GH . Autrement, il faut tirer par quelque point de la Parabole ABC , comme par le point G , au Diametre BD , la perpendiculaire GH , &

par son point de milieu K, tirer au Diametre B D, la *13. Fig.* parallele L K, qui sera l'Axe qu'on cherche.

Car, puisque tous les Diametres d'une Parabole *Dem. on-
strat. en.* sont paralleles, par *Prop. VIII.* & que B D, est un Diametre, il faut que sa parallele L K, soit aussi un Diametre; & comme ce Diametre L K, est perpendiculaire à son Ordonnée G H, il doit être un Axe, par *Def. 4.* Ce qu'il falloit faire & demontrer.

PROPOSITION XI.

Si l'on tire au dedans d'une Parabole deux Ordonnées avec leur Diametre, les Quarréz de ces Ordonnées seront proportionnels aux parties correspondantes de ce Diametre, en les prenant depuis le Sommet.

JE dis, que si L E, S T, sont deux Ordonnées au *14. Fig.* Diametre C M, de la Parabole G B T, leurs Quarréz sont dans la raison des deux parties correspondantes C L, C S, du même Diametre C M.

Pour la Demonstration, tirez l'Axe B H, & par le point C, la Touchante C O, qui rencontre icy l'Axe *Demon-
stration.* B H, en O, & reciproquement par le point B, la Touchante B K, qui rencontre icy le Diametre C M, en K. Prolongez l'Ordonnée E L, jusqu'à ce qu'elle rencontre d'un côté la Parabole B C G, au point G, & le Diametre B H, au point I; & tirez par les quatre points T, E, C, G, au Diametre B H, les Ordonnées T Z, E F, C D, G H, dont les deux premières T Z, E F, seront prolongées jusqu'à ce qu'elles

E iij

14. Fig.

coupent le Diametre CM , aussi prolongé en deux points, comme P, V .


1. Parce que la ligne BO , est égale à la ligne BD , par *Prop. IV.* & que la ligne BD , est égale à la ligne CK , par la nature des paralleles, la ligne BO , sera aussi égale à la ligne CK , & les Triangles semblables CKQ, OBQ , seront par consequent égaux : c'est pourquoy, si à chacun on ajoute le Pentagone $MCQBH$, on aura le Parallelograme $MKBH$, égal au Trapeze $MCOH$; & si à chacun des deux mêmes Triangles égaux CQK, OBQ , on ajoute le Trapeze $CDBQ$, on aura le Parallelograme $CDBK$, égal au Triangle CDO .

2. De plus, parce que les deux Triangles CDO, EFI , sont équiangles, par la nature des paralleles, on aura par 19. 6. cette Analogie, $CDO, EFI :: CDq, EFq$; & si à la place des deux derniers termes CDq, EFq , on met les deux BD, BF , qui sont en même raison, par la generation; ou bien, si à la place de ces deux on met les Parallelogrames $CDBK, PFBK$, qui sont en même raison, par 1. 6. on aura cette autre Analogie, $CDO, EFI :: CDBK, PFBK$; & parce que les deux antecedens $CDO, CDBK$, sont égaux, comme il a été démontré, les deux consequens, sçavoir le Triangle EFI , & le Parallelograme $PFBK$, seront égaux aussi.

3. Enfin, parce que le Triangle CDO , est égal au Parallelograme $CDBK$, par le premier article, si du Triangle CDO , on ôte le Triangle EFI , & le Trapeze $CRFD$, & du Parallelograme $CDBK$, le même Trapeze $CRFD$, & le Parallelograme $PFBK$, égal

au Triangle EFI , par l'article precedent, il restera le Trapeze $REIO$, égal au Triangle CPR ; & si à chacune de ces deux choses égales on ajoute le Trapeze $CLER$, on aura le Parallelograme $CLIO$, égal au Triangle LPE . 14. Fig.

On démontrera de la même façon, que le Parallelograme $CSDO$, est égal au Triangle SVT ; & comme ce Triangle SVT , est semblable au premier LPE , on aura par 19. 6. cette Analogie, $LPE, SVT :: LEq, STq$; & si à la place des deux Triangles LPE, SVT , on met les deux Parallelogrames $CLIO, CSDO$, qui leur sont égaux, on aura cette autre Analogie, $CLIO, CSDO :: LEq, STq$; & si au lieu des deux Parallelogrames $CLIO, CSDO$, on met leurs bases IO, DO , qui sont en même raison, par 1. 6. on aura cette autre Analogie, $IO, DO :: LEq, STq$; & enfin, si à la place des deux premiers termes IO, DO , on met les deux CL, CS , qui leur sont égaux, par la nature des paralleles, on aura cette dernière Analogie, $CL, CS :: LEq, STq$. Ce qu'il falloit démontrer, 4.



PROPOSITION XII.

Si à un Diametre donné d'une Parabole donnée, on tire une Ordonnée, qui soit coupée par un autre Diametre en deux parties inégales: le Rectangle, sous ces parties inégales, sera égal au Rectangle sous ce Diametre & le Parametre du premier Diametre.

15. Fig.

JE dis, que si AC, est une Ordonnée au Diametre BD, de la Parabole ABC, dont le Parametre est BG, & que EF, soit un autre Diametre, le Rectangle AFC, est égal au Rectangle BGEF.

Demonstration.

Car, si l'on tire par le Sommet E, du Diametre EF, au Diametre BD, l'Ordonnée EH, on aura par la Proposition précédente cette Analogie, BH, BD :: EH q, CD q, ou BH, BD :: FD q, CD q, à cause de EH $\propto$ FD; & en divisant on aura celle-cy, BH, DH :: DF q, CD q - DF q, ou BH, EF :: DF q, CD q - DF q, à cause de DH $\propto$ EF; & parce que CD q - DF q, est égal au Rectangle sous la somme CD + DF, & la différence CD - DF, ou sous AD + DF, & CD - DF, à cause de AD $\propto$ CD, ou sous AF, & CF, on aura cette autre Analogie, BH, EF :: DF q, AFC; & donnant aux deux premiers termes BH, EF, la hauteur commune BG, on aura celle-cy BGBH, BGEF :: DF q, AFC, où l'on voit que puisque les antecedens BGBH, DF q, ou EH q, sont égaux, par la generation, les consequens BGEF, AFC, sont égaux aussi. Ce qu'il falloit demontrer.

PRO-

PROPOSITION XIII.

Si l'on coupe un Cone par un Plan, lequel étant perpendiculaire à la base du Triangle de l'Axe, soit parallèle à l'un des deux côtez du même Triangle, la Section sera une Parabole.

IL est évident, que si on coupe un Cone par un ^{16. Fig.} Plan parallèle à sa base, la Section sera un Cercle; & que si on coupe le même Cone par un Plan, qui passe par son Axe, la Section sera un Triangle, que l'on nomme *Triangle de l'Axe*. C'est pourquoy, au lieu de démontrer cela, nous démontrerons, que si on coupe un Cone, dont la base soit le Cercle $AMCD$, & le Triangle de l'Axe soit ABC , par un Plan perpendiculaire à la base AC , & parallèle au côté AB , la Section MLD , sera une Parabole; sçavoir, un Plan terminé par une ligne courbe, où les Quarrez des Ordonnées ME , IH , à l'Axe LE , sont proportionnels aux parties correspondantes LE , LH , du même Axe LE , en les prenant depuis le Sommet L .


Car, si l'on coupe le Cone ABC , par un Plan, qui passant au dessus du Sommet L , soit parallèle à la base ^{Démon-} ADC , de ce Cone, la Section $FIQK$, sera un Cercle, dont le Diametre FG , est la commune Section de ce Plan & du Triangle de l'Axe ABC ; c'est pourquoy ce Diametre FG , sera parallèle au Diametre AC , de la base ADC , du Cone, comme la ligne LE , qui est la Section du Triangle de l'Axe ABC , & du Plan parallèle au côté AB , est parallèle au même côté AB .

19. Fig.

Si par la commune Section H , des deux lignes FG , LE , on tire dans le Plan du Cercle $FKGI$, la ligne IK , parallèle à la ligne MD , laquelle étant la commune Section du Cercle ADC , & du Plan parallèle au côté AB , est perpendiculaire au Diamètre AC , cette ligne IK , sera aussi perpendiculaire au Diamètre FG , qui est parallèle à AC ; c'est pourquoy chacune des deux lignes IK , MD , sera coupée en deux également, & à Angles droits, par la ligne LE , laquelle par conséquent sera un Axe à l'égard des deux Ordonnées HI , EM , ou KH , DE .

Parce que le Rectangle FHG , est égal au Carré HI , & le Rectangle AEC , au Carré EM , par 35. 3. on aura cette Analogie, $FHG, AEC :: HIq, EMq$; & si à la place des deux Rectangles FHG , AEC , dont les hauteurs FH, AE , sont égales, à cause du Parallelogramme $AEHF$, on met leurs bases GH, CE , qui sont en même raison, par 1. 6. on aura cette autre Analogie, $GH, CE :: HIq, EMq$; & encore, si à la place des deux premiers termes GH, CE , on met les deux LH, LE , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables LGH, LCE , on aura cette dernière Analogie, $LH, LE :: HIq, EMq$. D'où il suit par la generation de la Parabole, que la courbe MLD , est une Parabole. Ce qu'il falloit démontrer.





DE L'ELLIPSE.

Generation de l'Ellipse.

S'IL y a sur un Plan un Angle quelconque ABG ,^{17. & 18.} dont les deux lignes AB , BG , soient terminées; je dis, que l'on peut trouver sur le même Plan une infinité de points d'une Ellipse, dont un Diamètre sera AB , & le Parametre de ce Diametre sera BG , en sorte que la raison du Quarré d'une Ordonnée à ce Diametre AB , comme de CD , au Rectangle sous les parties correspondantes AC , BC , du Diametre AB , soit égale à celle du Parametre BG , au même Diametre AB , telle qu'est la propriété de la ligne courbe que nous avons appelée *Ellipse*; sçavoir en cherchant au Diametre AB , à son Parametre BG , & au Rectangle ACB ; un Quarré proportionnel, dont le côté CD , étant placé de côté & d'autre parallèlement au Parametre BG , on aura en D , deux points de l'Ellipse: & pareillement en cherchant au Diametre AB , à son Parametre BG , & au Rectangle AEB , un Quarré proportionnel, dont le côté EF , étant placé parallèlement au Parametre BG , on aura en F , deux autres points de l'Ellipse. Ainsi des autres.

Mais, pour avoir une pratique aisée, supposons que l'Angle ABG , soit droit, en sorte que le Diametre AB , soit un Axe, & que le même Diametre AB ,

17. & 18.
Figures.

ne soit pas égal à son Parametre BG, autrement au lieu d'une Ellipse nous décriirions un Cercle. Décrivez à l'entour de cet Axe AB, le demi-Cercle AIB, au dedans duquel vous tirerez sur le Diametre AB, les perpendiculaires CI, EL, pour y marquer de côté & d'autre autant de points de l'Ellipse par le moyen de la ligne AK, qui doit être moyenne proportionnelle entre l'Axe AB, & son Parametre BG; car si aux trois lignes AB, AK, CI, on trouve une quatrième proportionnelle CD, & pareillement aux trois lignes AB, AK, EL, une quatrième proportionnelle EF, les deux points D, F, seront de l'Ellipse.

Demon-
stration.

Car, puisque par la construction nous avons cette Analogie, $AB, AK :: CI, CD$, & par conséquent celle-cy, $ABq, AKq :: CIq, CDq$; si à la place du Carré AK, on met le Rectangle ABG, qui luy est égal, parce que l'on a fait AK, moyenne proportionnelle entre les deux AB, BG, on aura cette autre Analogie, $ABq, ABG :: CIq, CDq$, & si à la place du Carré CI, on met le Rectangle ACB, qui luy est égal, par 35. 3. on aura celle-cy, $ABq, ABG :: ACB, CDq$; & enfin, si au lieu des deux premiers termes ABq, ABG, on met les deux AB, BG, qui sont en même raison, par 1. 6. on aura cette dernière Analogie, $AB, BG :: ACB, CDq$, qui fait connoître que le point D, est de l'Ellipse. Ce qu'il falloit faire & démontrer.

On démontrera de la même façon, que le point F, est de l'Ellipse; mais on peut trouver un peu autrement les mêmes points D, F, sçavoir en cherchant aux trois lignes AK, BG, CI, une quatrième propor-

tionnelle CD , & pareillement aux trois lignes, AK , $17. \& 18.$
 BG , EL , une quatrième proportionnelle EF ; & *Figures.*
 les deux points D , F , seront de l'Ellipse.

Car, par la construction, nous avons cette Ana- *Demon-*
 logie, $AK, BG :: CI, CD$, & par conséquent celle- *stration.*
 cy, $AKq, BGq :: CIq, CDq$, ou $ABG, BGq ::$
 ACB, CDq , ou $AB, BG :: ACB, CDq$, qui fait
 connoître que le point D , est de l'Ellipse; & l'on dé-
 montrera de la même façon, que le point F , est aussi
 de l'Ellipse, &c.

COROLLAIRE I.

IL suit évidemment de cette construction, que l'El-
 lipse passe par les quatre points A , H , B , M , & que
 par conséquent elle renferme un espace: & de plus, que
 toutes les lignes tirées au dedans de l'Ellipse perpen-
 diculairement à l'Axe AB , comme DD , EF , MH ,
 sont divisées en deux également par le même Axe AB .

COROLLAIRE II.

IL est évident aussi, que de toutes ces perpendicu-
 laires, la plus grande est celle qui passe par le point
 O , milieu de l'Axe AB , comme HM : car, puisque
 par la generation, nous avons cette Analogie, $AOB,$
 $OMq :: ACB :: CDq$, ou $AOq, OMq :: ACB,$
 CDq , & que l'antécédent AOq , est plus grand que
 l'antécédent ACB , par 3. 2. le conséquent OMq ,
 sera aussi plus grand que le conséquent CDq , & le
 côté OM , conséquemment plus grand que le côté
 CD , &c.

COROLLAIRE III.

On voit aussi que cette plus grande perpendicu-
 laire HM , sera plus petite que l'Axe AB , lorsque
 F iij

17. & 18. cet Axe AB, sera plus grand que son Parametre BG, comme dans la Fig. 17. & qu'elle sera plus grande, lorsque l'Axe AB, sera plus petit que son Parametre BG, comme dans la Fig. 18. Dans le premier cas cette plus grande perpendiculaire HM, représente la largeur de l'Ellipse, & dans le second cas elle en représente la longueur. Cette longueur & cette largeur seront appelez *les deux Axes* de l'Ellipse; & le point O, où ces deux Axes s'entrecoupent à Angles droits, & en deux également, se nommera *Centre* de l'Ellipse.

C O R O L L A I R E I V.

CETTE même plus grande perpendiculaire, où l'Axe HM, est moyenne proportionnelle entre l'autre Axe AB, & son Parametre BG; c'est-à-dire, qu'elle est égale à la ligne AK. Car puisque par la génération on a cette Analogie, AB, BG :: AO B, OM q, ou AB, BG :: AO q, OM q, à cause de AO ~ OB; si à la place des deux Quarrez AO, OM, on met leurs quadruples, sçavoir les Quarrez AB, HM, on aura cette autre Analogie, AB, BG :: AB q, HM q; & si aux deux premiers termes AB, BG, on donne la hauteur commune AB, on aura celle-cy, AB q, ABG :: AB q, HM q, où l'on voit, que puisque les antécédens sont égaux, les conséquens ABG, HM q, sont égaux aussi: & comme le Rectanglè ABG, est aussi égal au Quarré AK, par la construction, ce Quarré AK, sera aussi égal au Quarré HM, & par conséquent AK ~ HM. Ce qu'il faut démontrer.

C O R O L L A I R E V.

IL s'ensuit aussi; qu'une perpendiculaire quelconque à l'Axe HM, tirée au dedans de l'Ellipse, comme

DP, est divisée en deux également au point R, par le même Axe HM. Car ayant tiré des deux points D, P, sur l'autre Axe AB, les perpendiculaires CD, LP, on aura par la generation cette Analogie, $ACB, ALB :: CDq, LPq$, dont les deux derniers termes CDq, LPq , étant égaux, par la nature des paralleles, les deux premiers, ou les deux Rectangles ACB, ALB , seront égaux aussi: c'est pourquoy on aura cette Analogie, $AC, AL :: BL, BC$; & en divisant on aura celle-cy, $AL, CL :: BC, CL$, où les deux consequens étant égaux, les deux antecedens AL, BC , seront égaux aussi; & si on les ôte des deux lignes égales AO, OB , il restera les deux égales OL, OC , ou RP, RD . Ce qu'il falloit demontrer. On démontrera de la même façon, que la perpendiculaire FQ, est divisée en deux également au point S, par le même Axe HM.

COROLLAIRE VI.

Il s'en suit de plus, que si au même Axe HM, on tire au dedans de l'Ellipse autant de perpendiculaires que l'on voudra, comme FS, DR, leurs Quarrez seront proportionnels aux Rectangles HSM, HRM, sous les parties correspondantes de cet Axe HM. Car si l'on tire sur l'autre Axe AB, des points D, F, les perpendiculaires CD, EF, on aura par la generation cette Analogie, $AB, BG :: ACB, CDq$; & si au lieu des deux premiers termes AB, BG , on met les deux ABq, HMq , qui sont en même raison, à cause des trois proportionnelles AB, HM, BG , par Coroll. 4. ou si à la place de ces deux ABq, HMq , on met leurs quarts AOq, OMq , & qu'on permute, on aura cette autre Analogie, $AOq, ACB :: OMq, CDq$;

17. & 18.
Figures.

& si à la place du Rectangle ACB , on met la différence $AOq - COq$, qui luy est égale, par 5. 2. & à la place du Quarré CD , le Quarré OR , qui luy est égal, par la nature des paralleles, on aura cette autre Analogie, $AOq, AOq - COq :: OMq, ORq$; & en divisant on aura celle-cy, $AOq, COq :: OMq, OMq - ORq$; & si à la place du Quarré CO , on met le Quarré DR , qui luy est égal, par la nature des paralleles, & à la place de la différence $OMq - ORq$, le Rectangle HRM , qui luy est égal, par 5. 2. & qu'on permute, on aura cette dernière Analogie, $AOq, OMq :: DRq, HRM$. On démontrera de la même façon, que $AOq, OMq :: FSq, HSM$; d'où il est aisé de conclure, que $DRq, FSq :: HRM, HSM$. Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE VII.

ENFIN, il s'ensuit que le Parametre BG , étant perpendiculaire à l'Axe AB , ne rencontre l'Ellipse qu'au point B , parce que s'il la rencontroit encore en quelque autre point, comme en T , la perpendiculaire TV , que l'on tireroit de ce point T , sur l'autre Axe HM , seroit moindre que OB , par la generation, ce qui est impossible, parce que les deux lignes OB, TV , sont égales, à cause du Parallelograme $OBTV$. Il est donc impossible aussi, que le Parametre BG , rencontre l'Ellipse encore au point T . Ce qu'il falloit démontrer. On démontrera de la même façon, que si l'on tire à l'autre Axe HM , par l'une de ses extrémités H, M , une perpendiculaire, cette perpendiculaire ne rencontrera l'Ellipse qu'en la même extrémité.

L'Analyse nous enseignera une construction de l'Ellipse.

l'Ellipse, qui sera beaucoup plus facile que la précédente. Pour découvrir cette construction, supposons que sur le grand Axe AB , on ait décrit l'Ellipse $ADBH$, dont le petit Axe soit HI , le centre soit O , & le Parametre du grand Axe AB , soit BG ; & de plus, que la ligne CD , soit perpendiculaire au grand Axe AB . Supposons encore que sur le même grand Axe AB , on ait déterminé les deux lignes égales OE , OF , en sorte que si par quelque point de l'Ellipse, comme D , on tire des deux points déterminez E , F , les droites DE , DF , leur somme $DE + DF$, soit toujours égale à une même ligne donnée : car ainsi en décrivant de l'un de ces deux points comme de E , à une ouverture du compas un peu plus grande que AE , ou que BF , un arc de Cercle, & un autre de l'autre point F , à une ouverture du compas égale à l'excès de la ligne donnée sur l'ouverture du premier arc, la Section de ces deux arcs donnera un point de l'Ellipse; & l'on en pourra trouver de la même façon autant d'autres que l'on voudra, lorsqu'on aura une fois déterminé la longueur de la ligne donnée, & des deux lignes OE , OF , en sorte que cette longueur soit invariable, & indépendante de la ligne indéterminée AC , ou BC ; autrement cette même longueur ne pourroit pas servir pour trouver autant de points de l'Ellipse qu'on voudroit.

Pour donc déterminer la longueur de cette ligne, qui doit être donnée, & celle des lignes OE , OF , indépendamment de la ligne indéterminée AC , ou BC , & seulement par rapport à l'Axe AB , & à son Parametre BG , & à l'autre Axe HI , qui sont invariables,

19. Fig.

au lieu que AC, ou BC, peut changer en une infinité de manieres differentes dans la même Ellipse; faisons les suppositions suivantes:

$$AB \propto d.$$

$$BG \propto p.$$

$$HI \propto f.$$

$$AC \propto x.$$

$$CD \propto y.$$

$$BF \propto z \propto AE.$$

pour avoir

$$BC \propto d - x.$$

$$CF \propto d - x - z.$$

$$OF \propto \frac{1}{2}d - z \propto OE;$$

$$CE \propto x - z.$$

$$DE \propto \sqrt{xx - 2xz + zz + yy}$$

$$DF \propto \sqrt{dd - 2dx + xx - 2dz + 2xz + zz + yy}.$$

Pour connoître à quel Quarré on doit égaler le Quarré $xx - 2xz + zz + yy$, de la ligne DE, en telle sorte que les lignes égales OE, OF, ou bien AE, BF, soient invariables, & indépendantes de la partie indéterminée $AC \propto x$, il ne faut pas que dans leur valeur, c'est-à-dire, dans la valeur qu'on trouvera de z , il demeure la lettre indéterminée x . Pour cette fin, il faut que dans ce Quarré les termes xx, yy , se rencontrent, afin que par l'antithese ils se détruisent; car ainsi le reste de l'Equation se pourra diviser plus facilement par x ; ce qui se doit faire, afin que cet x s'évanouisse, & qu'ainsi on puisse trouver la valeur de z , indépendamment de la lettre indéterminée x .

On ne peut pas prendre le Quarré $dd - 2dx + xx - 2dz + 2xz + zz + yy$, de la ligne DF, où les Quarrez xx ,

yy, se rencontrent, parce que cette ligne DF, est ^{19. Fig.} plus grande que la ligne DE, excepté dans le cas auquel le point D, convient avec le point H, ou avec le point I, parce qu'alors ces deux lignes DE, DF, seront égales, comme il est aisé de démontrer.

Puisque donc la ligne DF, est trop grande pour pouvoir être égalée à la ligne DE, on la diminuëra de quelque quantité, comme de ω , en sorte que la différence des lignes DE, DF, soit ω ; & cette ligne ainsi diminuée, sçavoir $\sqrt{dd - 2dx + xx - 2dz + 2xz + zz + yy - \omega}$, pourra être égalée à la ligne DE $\sqrt{xx - 2xz + zz + yy}$. Ainsi on aura cette Equation, $\sqrt{dd - 2dx + xx - 2dz + 2xz + zz + yy - \omega} = \sqrt{xx - 2xz + zz + yy}$, où prenant le Quarré de chaque partie, on aura celle-cy, $dd - 2dx + xx - 2dz + 2xz + zz + yy - \omega = xx - 2xz + zz + yy$; & par l'antithese on aura celle-cy, $2\omega\sqrt{dd - 2dx + xx - 2xz + zz + yy} = 4xz - 2dz - 2dx + dd + \omega$. Et pour diminuer le nombre des termes, mettez d à la place de ω , en supposant $\omega = d$, pour avoir cette autre Equation, $2d\sqrt{dd - 2dx + xx - 2xz + zz + yy} = 4xz - 2dz - 2dx + dd$, dont chaque partie étant divisée par 2, on aura celle-cy, $d\sqrt{dd - 2dx + xx - 2xz + zz + yy} = 2xz - dz - dx + dd$, où prenant le Quarré de chaque partie, on aura cette autre Equation $d^4 - 2d^3x + ddxx - 2ddxz + ddzz + ddy = 4xxz - 4dxz + ddz - 4xxz + ddz - 4xxz + ddz - 4xxdz + 6ddxz + ddx - 2d^3z + d^4$, & par l'antithese on aura celle-cy, $4xxz - 4dxz - 4dxz + 4ddz - ddy = 0$; & si à la place de yy , on met $px - \frac{p^2x}{4}$, qui lui est égal, comme l'on connoît par l'Equation constitutive de l'Ellipse, on aura cette autre Equation, $4xxz - 4dxz - 4dxz + 4ddz - ddp + dpx = 0$, laquelle étant divisée par $4xx - 4dx$,

15, Fig.

on aura cette dernière Equation, $zz - dz + \frac{1}{2}dp = 0$, dans laquelle on trouvera $z \propto \frac{1}{2}d - \frac{1}{2}\sqrt{dd - dd}$. Et comme nous avons remarqué que le petit Axe HI, est moyen proportionnel entre le grand Axe AB, & son Parametre BG, on pourra mettre le Carré $\frac{1}{2}d$, à la place du Rectangle dp , & l'on aura $z \propto \frac{1}{2}d - \frac{1}{2}\sqrt{dd - \frac{1}{2}d}$, pour AE, & BF; c'est pourquoy on aura OE, ou OF $\propto \frac{1}{2}\sqrt{dd - \frac{1}{2}d}$.

Ce qui fait connoître que chacune des deux lignes égales OE, OF, est égale à la Racine carrée de la différence des Carrés des deux demi-Axes AO, OH. Ainsi les deux lignes invariables OE, OF, seront connues, après quoy la quantité que nous avons supposée donnée, sera aussi connue, parce qu'elle est égale au grand Axe AB, puisque nous avons égalé la ligne DE, à la différence des lignes DF, & u , ou d , ou AB; ce qui fait que cette ligne AB, est égale à la somme des deux DE, DF.

*Autre
constru-
tion.*

Mais, pour venir à la pratique, décrivez de l'une des deux extrémités H, I, du petit Axe HI, comme de l'extrémité H, à l'ouverture du grand demi-Axe AO, ou BO, une circonférence de Cercle, qui donnera sur le grand Axe AB, les deux points invariables E, F, & déterminera par conséquent la longueur des lignes égales OE, OF. Car à cause de $AB \propto d$, on aura $\frac{1}{2}d$, pour chacune des lignes AO, BO, HE, HF; & à cause de $HI \propto f$, on aura $\frac{1}{2}f$, pour chacune des deux lignes HO, IO. Si du Carré $\frac{1}{2}dd$, de HE $\propto \frac{1}{2}d$, on ôte le Carré $\frac{1}{2}ff$, de HO $\propto \frac{1}{2}f$, il restera $\frac{1}{2}dd - \frac{1}{2}ff$ pour le Carré de la ligne OE, ou OF, laquelle par conséquent vaudra $\sqrt{\frac{1}{2}dd - \frac{1}{2}ff}$, ou $\frac{1}{2}\sqrt{dd - ff}$, telle que nous l'avons trouvée.

Par le moyen de ces deux points invariables E, F, ^{19. Fig.} que nous appellerons *Foyers* de l'Ellipse, on pourra trouver autant de points que l'on voudra de l'Ellipse, comme vous allez voir à l'imitation du point D, qui se peut trouver par une même operation, en quatre lieux également éloignez du petit Axe HI, ou des deux extrémités A, B, du grand Axe AB, en cette sorte.

Ayant décrit de l'un des Foyers E, F, comme du Foyer E, avec une ouverture du Compas un peu plus grande que AE, ou que BF, un arc de Cercle, portez cette même ouverture sur le grand Axe AB, depuis son extrémité A, en K, & avec l'ouverture du reste BK, de l'Axe AB, décrivez de l'autre Foyer F, un autre arc de Cercle, & la rencontre de ces arcs avec le premier, donnera le point D, qui sera de l'Ellipse.

Pour la demonstration, décrivez du point D, par le Foyer E, le demi-Cercle LEQ, qui coupe icy l'Axe ^{Demonstration.} AB, en N, & la ligne DF, prolongée en Q, & en L; ce qui fait que comme par cette construction la somme des lignes DE, DF, est égale au grand Axe AB, aussi la ligne FQ, est égale au même Axe AB, à cause des trois lignes égales DE, DQ, DL; on voit aussi, par 3. 3. que les lignes CE, CN, sont égales entre elles, & que la somme des quatre lignes AO, EO, CO, DK, est égale à la somme des deux DF, CF, parce que si l'on divise FQ, en deux également au point K, la somme des deux AO, DK, ou FK, DK, vaut autant que DF. On connoît aussi que FN, est double de CO, parce que si à EN† NO ~ FO, ou à 2CN†NO ~ FO, on ajoute NO,

20. Fig. on aura $2CN \dagger 2NO \propto FN$, ou $2CO \propto FN$. On connoît encore que FL , est double de DK , parce que si de $KG \propto KF$, ou $DG \dagger DK \propto KF$, ou $DL \dagger DK \propto KF$, on ôte KL , il restera $2DK \propto FL$. Cherchez encore au grand Axe AB , & au petit HI , une troisième proportionnelle BG , qui sera le Parametre du grand Axe AB .

1. Cela étant supposé, on connoîtra premierement, par 5. 2. que AOq est égal à $AEB \dagger EOq$, & à cause de $AOq \propto EIq$, par la generation; & de $EIq \propto EOq \dagger OIq$, par 47. 1. on aura $EOq \dagger OIq \propto AEB \dagger EOq$; & ôtant EOq , il restera $OIq \propto AEB$.

2. On connoîtra aussi, par 36. 3. que le Rectangle QFL , est égal au Rectangle EFN , & que par conséquent on a cette Analogie, $FQ, FE :: FN, FL$; c'est pourquoy en prenant les moitez de tous les termes, on aura cette seconde Analogie, $AO, EO :: CO, DK$; & en composant on aura celle-cy, $AO, AO \dagger EO :: CO, CO \dagger DK$; & en permutant on aura celle-cy, $AO, CO :: AO \dagger EO, CO \dagger DK$; & en composant on aura celle-cy $AO, AO \dagger CO :: AO \dagger EO, AO \dagger EO \dagger CO \dagger DK$; & à cause de $AO \dagger CO$, ou $BO \dagger CO \propto BC$, de $AO \dagger EO$, ou $BO \dagger EO \propto BE$; & de $AO \dagger EO \dagger CO \dagger DK \propto DF \dagger CF$, comme il a été démontré, on aura cette dernière Analogie, $AO, BC :: BE, DF \dagger CF$.

3. Si dans la seconde Analogie, $AO, EO :: CO, DK$, on divise, on aura cette autre Analogie, $AO, AO - EO :: CO, CO - DK$; & en permutant on aura celle-cy, $AO, CO :: AO - EO, CO - DK$; & en divisant on aura celle-cy, $AO, AO - CO :: AO - EO,$

AO-EO-CO†DK; & à cause de AO-CO $\propto$ 20. Fig.
AC, de AO-EO $\propto$ AE, & de AO-EO-CO†
DK, ou FK-FO-CO†DK $\propto$ DF-CF, on aura
cette dernière Analogie, AO, AC::AE, DF-CF.

Si l'on compare cette dernière Analogie avec la 4.
dernière de l'article précédent, en faisant des Re-
ctangles sous les termes homologues correspondans
dans chacune, comme vous voyez icy, on aura cette
autre Analogie,

$$AO, BC::BE, DF†CF.$$

$$AO, AC::AE, DF-CF.$$

$$\frac{AOq, ACB::AEB, DFq-CFq.}{}$$

AOq, ACB::AEB, DFq-CFq; & à cause de AEB $\propto$
OIq, par le premier article, & de DFq-CFq $\propto$ CDq,
à cause du Triangle Rectangle DCF, on aura cette
autre Analogie, AOq, ACB::OIq, CDq; & si à
la place des deux antécédens AOq, OIq, on met les
deux ABq, HIq, qui sont en même raison, & qu'on
permute, on aura cette autre Analogie, ABq, HIq::
ACB, CDq; & enfin, si au lieu des deux premiers
termes, ABq, HIq, on met les deux AB, BG,
qui sont en même raison, à cause des trois propor-
tionnelles AB, HI, BG, par la construction, on au-
ra cette dernière Analogie, AB, BG::ACB, CDq,
qui fait connoître par la propriété générale, que le
point D, est de l'Ellipse. Ce qu'il falloit démontrer.

Lorsque le point C, conviendra avec le Foyer E,
c'est-à-dire, lorsque la perpendiculaire CD, tombera
sur le Foyer E, le demi-Cercle QEL, ne coupera
pas le grand Axe AB, & il ne fera que l'toucher au
même Foyer E. Néanmoins la démonstration sera

20. Fig.

toûjours la même, si l'on met EO , à la place de CO , & le Quarré de la Touchante FE , à la place du Rectangle EFN .

DEFINITIONS.

1. *Grand Axe* d'une Ellipse, c'est une ligne droite, qui en représente la longueur.
2. *Petit Axe* d'une Ellipse, c'est la ligne droite, qui en représente la largeur. Il est évident qu'une Ellipse n'a que deux Axes, & que l'un est perpendiculaire à l'autre.
3. *Centre* d'une Ellipse, c'est le point où les deux Axes de l'Ellipse s'entrecoupent. Il est évident que les deux Axes s'entrecoupent en deux également.
4. *Foyers* d'une Ellipse, ce sont deux points marquez sur le grand Axe de l'Ellipse, & éloignez chacun des extrémités du petit Axe d'une quantité égale à la moitié du grand. Il est évident que les deux Foyers sont également éloignez du centre.
5. *Diametre* d'une Ellipse, c'est une ligne droite tirée par le centre de l'Ellipse, & terminée de côté & d'autre par la même Ellipse. Il est évident qu'une Ellipse a une infinité de Diametres differens, & que les deux Axes sont des Diametres.
6. *Touchante* d'une Ellipse, c'est une ligne droite, qui ne rencontre l'Ellipse qu'en un point. Il est évident que les perpendiculaires aux deux Axes, tirées par les extrémités des mêmes Axes, sont des Touchantes.
7. *Ordonnée* à un Diametre d'une Ellipse, c'est une ligne droite tirée au dedans de l'Ellipse parallèlement à la Touchante, qui passe par l'une des deux extrémités de ce Diametre.

Deux

Deux Diametres conjugués d'une Ellipse, sont deux 8.
Diametres tels, que les Ordonnées de l'un sont re- 19. Fig.
ciproquement paralleles à l'autre Diametre. Il est évi-
dent que les deux Axes sont deux Diametres conju-
gués.

Parametre d'un Diametre d'une Ellipse, c'est une 9.
ligne droite, qui est troisième proportionnelle à ce
Diametre & à son Diametre conjugué, auquel elle
est parallele.

Figure d'un Diametre d'une Ellipse, c'est le Rectan- 10.
gle compris sous ce Diametre & son Parametre.

Perpendiculaire à une Ellipse, c'est une ligne droite, 11.
laquelle coupant l'Ellipse en un point, est perpendicu-
laire à la Touchante, qui passe par ce même point.

PROPOSITION I.

*Un Diametre d'une Ellipse est divisé en deux
également par le centre.*

IL est évident par la generation, que les deux Axes 20. Fig.
AB, HI, sont divisez en deux également par le
centre O. Mais je dis qu'un autre Diametre, comme
MP, est aussi divisé en deux également par le même
centre O.

Car, si les deux parties O'M, O'P, n'étoient pas 21. Fig.
égales, l'une seroit plus grande que l'autre : si c'étoit
OM, on en pourroit retrancher ON, égale à la plus
petite OP. Et ayant tiré des deux Foyers E, F, par les
trois points M, N, P, les droites EN, FN, EP, FP,
EM, FM, on fera la demonstration en cette sorte :

H

21. Fig.

Les deux Triangles EOP , FON , étant égaux, par 4. 1. aussi bien que les deux EON , FOP , les bases EP , FN , seront égales, aussi-bien que les deux EN , FP ; c'est pourquoy la somme des deux EN , FN , sera égale à la somme des deux EP , FP ; c'est-à-dire, par la generation, à la somme des deux EM , FM ; ce qui étant impossible, par 21. 1. il est impossible aussi que les deux parties OM , OP , soient inégales. Ce qu'il falloit demontrer.

PROPOSITION II.

Tirer une Touchante par un point donné sur une Ellipse donnée, dont le grand Axe & les deux Foyers sont aussi donnez.

PREMIEREMENT, si le point donné est en l'une des deux extrémités de l'Axe donné, il n'y a qu'à tirer par ce point à l'Axe donné, une perpendiculaire, qui touchera l'Ellipse donnée en ce même point, comme il a été démontré dans la generation,

22. Fig.

Mais, si l'on donne le point ailleurs, comme en D , tirez de ce point D , aux deux Foyers E , F , les droites DE , DF ; & ayant prolongé l'une de ces deux lignes, comme DE , vers Q , divisez l'Angle FDQ , en deux également par la droite DG , qui touchera l'Ellipse donnée $AIBH$, au point donné D , de sorte qu'elle ne la rencontrera pas ailleurs qu'au point donné D .

*Demon-
stration.*

Car, si on veut qu'elle la rencontre encore en un point, comme P , en sorte que P , soit de l'Ellipse,

tirez de ce point P, aux Foyers E, F, les droites EP, ^{22 Fig.} FP, pour avoir EP + FP ∞ AB, par la generation; & ayant fait DQ ∞ DF, menez les droites PQ, FQ, pour avoir la ligne EQ, égale au grand Axe AB, ou par la generation à la somme des deux DE, DF, & le Triangle FDG, égal au Triangle GDQ, par 4. 1. ce qui fait que la ligne DG, divise la bafe FQ, du Triangle ifofcele FDQ, à Angles droits, & en deux également au point G.

Cela étant fuppofé, on connoît aifément que puifque la somme des lignes PE, PF, eft égale par la generation au grand Axe AB, ou par la construction à la ligne EQ, & que PF, eft égale à PQ, par 4. 1. à caufe de l'égalité des deux Triangles rectangles PGF, PGQ, la somme des lignes PE, PQ, fera égale à la ligne EQ; ce qui étant impoffible, par 20. 1. il eft impoffible aufli que la ligne DG, rencontre l'Ellipfe ADB, ailleurs qu'au point D : c'eft pourquoy par Def. 6. la ligne DG, fera une Touchante. Ce qu'il falloit faire & demontrer.

S C O L I E.

Si l'on divifoit l'Angle EDF, en deux également par la droite DL, cette droite DL, feroit perpendiculaire à l'Ellipfe ADB, par Def. 11. parce qu'elle feroit perpendiculaire à la Touchante DG, puifqu'elle feroit avec elle des Angles égaux LDP, LDG, à caufe des deux égaux EDP, FDG, & des deux égaux LDE, LDF.

C O R O L L A I R E.

On voit aifément que la Touchante que l'on tiroit par cette méthode, par l'une des extrémités H, I,

H ij

22. Fig. du petit Axe HI , seroit perpendiculaire au même Axe HI , ou parallèle au grand Axe AB . Et comme la Touchante que l'on tireroit par quelque autre point, qui ne fût pas l'une des deux extrémités A, B , du grand Axe AB , comme par le point D , rencontreroit nécessairement en dehors celle qui passeroit par le point I , vers les points d'attouchement I, D , elle devroit aussi rencontrer le grand Axe AB , qui est parallèle à la Touchante IM , du point I , & par conséquent l'autre Axe HI , vers l'extrémité la plus proche du point d'attouchement.

Ainsi, vous voyez que les Touchantes, qui rencontrent l'Ellipse en d'autres points qu'aux extrémités A, I, B, H , des deux Axes AB, HI , coupent toujours ces deux Axes en un point, que l'on peut trouver indépendamment de la méthode précédente, en cette sorte:

*Autre
construc-
tion.
23. Fig.*

Ayant tiré du point donné D , à l'Axe sur lequel on veut trouver le point de la Touchante, comme sur le grand Axe AB , la perpendiculaire CD , cherchez aux deux lignes OC, OB , une troisième proportionnelle OR , qui donnera sur le grand Axe AB , prolongé, le point R , qu'on cherche; de sorte que si l'on tire de ce point R , au point donné D , la droite RD , cette droite RD , touchera l'Ellipse ADB , au point donné D , & ne la rencontrera qu'en ce point D .

*Démon-
stration.*

Car, si on veut qu'elle la rencontre encore au point N , que l'on tire par ce point N , à l'Axe AB , la perpendiculaire NL ; & ayant décrit du centre O , à l'entour du même Axe AB , le demi-Cercle AFB , prolongez l'Ordonnée CD , jusques au demi-Cercle en

F, & menez les droites AF, BF, OF, RF. Prolongez encore l'Ordonnée NL, jusqu'à ce qu'elle rencontre la droite RF, en P, & le demi-Cercle AFB, en M.

Puisque par la construction on a cette Analogie, OC, OB :: OB, OR, ou OC, OF :: OF, OR, le Triangle OFR, sera rectangle en F, parce qu'il sera semblable au Triangle OCF, rectangle en C; c'est pourquoy la ligne RF, touchera en F, le demi-Cercle AFB; ce qui fait que les points P, & M, sont differens, & que la ligne LP, est plus grande que la ligne LM.

Puisque par la generation on a cette Analogie AB, HI :: CF, CD, si au lieu des deux premiers termes AB, HI, on met les deux LM, LN, qui sont en même raison, par la generation, & à la place des deux derniers CF, CD, les deux LP, LN, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables RCF, RLP, on aura cette autre Analogie, LM, LN :: LP, LN, où l'on voit, que puisque les deux consequens sont égaux, les deux antecedens LM, LP, sont égaux aussi; ce qui étant impossible, il est impossible aussi, que la droite RD, rencontre l'Ellipse ADB, encore au point N. Ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE.

IL s'ensuit, que si on prolonge la Touchante RD, jusqu'à ce qu'elle coupe l'Axe HI, en quelque point, comme en S, & que du point d'atouchement D, on tire au même Axe HI, l'Ordonnée DT, les trois lignes OT, OI, OS, sont proportionnelles.

Car, puisque les trois lignes OC, OB, OR, sont

*Demon-
stration.
23. Fig.*

proportionnelles, par la construction, on aura cette Analogie, $OCq, OBq :: OC, OR$; & si à la place de OCq , on met DTq , & AOq , à la place de OBq , on aura celle-cy, $DTq, AOq :: OC, OR$; & si à la place des deux premiers termes DTq, AOq , on met les deux HTI, OIq , qui sont en même raison, par la generation; & à la place des deux derniers OC, OR , ou DT, OR , les deux TS, OS , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables, ROS, DTS ; on aura cette autre Analogie, $HTI, OIq :: TS, OS$; & en divisant on aura celle-cy, $OIq-HTI, OIq :: OT, OS$; & si au lieu du premier terme $OIq-HTI$, on met OTq , qui luy est égal, par 5.2. & que l'on donne aux deux derniers termes OT, OS , la hauteur commune OT , on aura cette dernière Analogie, $OTq, OIq :: OTq, OSOT$, où l'on voit, que puisque les antécédens sont égaux, les conséquens $OIq, OSOT$, sont égaux aussi; & que par conséquent les trois lignes OT, OI, OS , sont proportionnelles. Ce qu'il falloit démontrer.

Ainsi, vous voyez que quand les trois lignes OT, OI, OS , ou les trois OC, OB, OR , sont proportionnelles, la ligne RS , est une Touchante; & reciproquement que quand la ligne RS , est une Touchante, les trois lignes OT, OI, OS , aussi-bien que les trois OC, OB, OR , sont proportionnelles. D'où il est aisé de conclure, que l'on ne peut pas tirer deux Touchantes à une Ellipse par un même point, parce que cette seconde Touchante donneroit une autre ligne que OR , qui seroit troisième proportionnelle aux deux OC, OB , ou que OS , qui seroit troisié-

me proportionnelle aux deux OT , OI ; ce qui est impossible. D'où il suit que les propriétés de la Touchante d'une Ellipse sont reciproques.

PROPOSITION III.

Si par l'une des extrémités d'un Diametre d'une Ellipse, on tire une Touchante, à laquelle on tire au dedans de l'Ellipse une parallele quelconque, cette parallele sera divisée en deux également par le Diametre.

CETTE Proposition est évidente par la generation, lorsque la Touchante passe par l'une des extrémités d'un Axe: mais si elle n'y passe pas, en sorte qu'elle rencontre au dehors de l'Ellipse, l'un des deux Axes, comme DR , qui rencontre le grand Axe AB , au point R ; je dis, que si à cette Touchante DR , on tire au dedans de l'Ellipse ADB , une parallele quelconque PQ , en sorte que néanmoins elle ne passe pas par le centre O , autrement la Proposition seroit aussi évidente, par *Prop. I.* cette parallele PQ , sera divisée en deux également au point K , par le Diametre DM , qui passe par le point d'attouchement D . 24. Fig.

Pour la demonstration, prolongez l'Ordonnée PQ , jusqu'à ce qu'elle coupe le même Axe AB , en *Demon-*
 E ; & ayant tiré des trois points P , D , Q , à cet Axe *stration.*
 AB , les Ordonnées PN , DC , QL , tirez par le point B , à la Touchante DR , la parallele BG , & joignez les droites BD , CG . Tirez encore par le point B , la Touchante BF , qui rencontre le Diametre DM , pro-

24. Fig.

longé en F; & ayant prolongé l'Ordonnée QL, jusqu'à ce qu'elle coupe le même Diamètre DM, en T, menez la droite RF.

1. Cette preparation étant faite, on aura dans les Triangles semblables OGB, ODR, cette Analogie, $OG, OD :: OB, OR$; & si à la place des deux derniers termes OB, OR, on met les deux OC, OB, qui sont en même raison, par la Proposition precedente, ou bien à la place de ces deux OC, OB, les deux OD, OF, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables OCD, OBF, on aura cette autre Analogie, $OG, OD :: OD, OF$, qui fait connoître que les trois lignes BD, CG, FR, sont parallèles. D'où il suit, que les deux Triangles BDF, BDR, qui sont sur la même base BD, & entre les mêmes parallèles BD, FR, sont égaux, par 37. 1. c'est pourquoy si à chacun on ajoute le Triangle BCD, on aura le Triangle CDR, égal au Trapeze BCDF.

2. Parce que les deux Triangles OBF, ONS, sont semblables, on aura cette Analogie, $OBq, ONq :: OBF, ONS$, & en divisant on aura celle-cy, $OBq - ONq, OBq :: NBS, OBF$; & si à la place du premier terme $OBq - ONq$, on met le Rectangle ANB, qui luy est égal, par 5. 2. & qu'on permute, on aura cette dernière Analogie, $ANB, NBS :: OBq, OBF$. Pareillement à cause des Triangles semblables OBF, OCD, on a cette Analogie, $OBq, OCq :: OBF, OCD$, & en divisant on aura celle-cy, $OBq - OCq, OBq :: CBF, OBF$; & si à la place du premier terme $OBq - OCq$, on met le Rectangle ACB, qui luy est égal, par 5. 2. & qu'on permute,

on.

on aura cette autre Analogie, $ACB, CBFD :: OBq, OBF$; & si à la place des deux derniers termes, OBq, OBF , on met les deux $ANB, NBFS$, qui sont en même raison, comme vous avez vû dans la dernière Analogie précédente, on aura cette dernière Analogie, $ACB, CBFD :: ANB, NBFS$. Enfin à cause des deux Triangles semblables OBF, OLT , on a cette Analogie, $OBq, OLq :: OBF, OLT$; & en divisant on aura celle-cy, $OBq - OLq, OBq :: LBFT, OBF$; & si au lieu du premier terme $OBq - OLq$, on met le Rectangle ALB , qui luy est égal, par 5. 2. & qu'on permute, on aura cette autre Analogie, $ALB, LBFT :: OBq, OBF$; & si à la place des deux derniers termes OBq, OBF , on met les deux $ACB, CBFD$, qui sont en même raison, comme vous avez vû, on aura cette dernière Analogie, $ALB, LBFT :: ACB, CBFD$.

Dans les Triangles semblables DCR, PNE , on a cette Analogie, $DCR, PNE :: CDq, PNq$; & si à la place des deux derniers termes CDq, PNq , on met les deux ACB, ANB , qui sont en même raison, par la generation, on aura cette autre Analogie, $DCR, PNE :: ACB, ANB$; & encore, si au lieu des deux derniers termes ACB, ANB , on met les deux $CBFD, NBFS$, qui sont en même raison, par l'article précédent, on aura cette dernière Analogie, $DCR, PNE :: CBFD, NBFS$, où l'on voit, que puisque les antecédens $DCR, CBFD$, sont égaux par le premier article, les deux conséquens $PNE, NBFS$, sont égaux aussi. De même dans les Triangles semblables DCR, QLE , on a cette Analogie,

24. Fig.

DCR, QLE :: CDq, QLq; & si à la place des deux derniers termes CDq, QLq, on met les deux ACB, ALB, qui sont en mesme raison, par la generation, ou à la place des deux ACB, ALB, les deux CBFD, LBFT, qui sont en mesme raison par l'article precedent, on aura cette derniere Analogie, DCR, QLE :: CBFD, LBFT, où l'on voit, que puisque les deux antecedens DCR, CBFD, sont egaux, les deux consequens QLE, LBFT, sont egaux aussi.

4.

Puisque le Triangle QLE, est égal au Trapeze LBFT, comme il vient d'être demontre, si on ajoute à chacun le Plan SNLQK, on aura la somme NSKE égale à la somme LBFT + SNLQK; & si on ôte la premiere NSKE, du Triangle PNE, & la seconde LBFT + SNLQK, du Trapeze NBFS, égal au Triangle PNE, par l'article precedent, il restera le Triangle PKS, égal au Triangle TKQ; & comme ces deux Triangles sont semblables, leurs côtez homologues KP, KQ, seront égaux. Ce qu'il faisoit démontrer.

25. Fig.

Si le point S, tombe au delà du centre O, au dessous de l'Axe AB, les trois premiers articles seront les mêmes qu'auparavant, pourvû que l'on change le Plan NBFS, en cette difference OBF-ONS, telle qu'elle vient par la division de raisons, qui a été faite dans le second article. Mettant donc la difference OBF-ONS, à la place du Plan NBFS, au lieu que le Triangle PNE, a été trouvé dans le troisieme article, égal au Trapeze NBFS, on le trouvera égal à la difference OBF-ONS, après quoy le quatrième article se changera en celuy-cy.

Parce que le Triangle QLE , est égal au Trapeze $LBFT$, si on ajoute à chacun la différence $OLQK$ - 4.
 ONS , on aura la somme $OKE - ONS$, égale à la
 somme $LBFT + OLQK - ONS$; & si on ôte la pre- 25. Fig.
 miere $OKE - ONS$, du Triangle PNE , & la se-
 conde $LBFT + OLQK - ONS$, de la différence
 $OB F - ONS$, égale au Triangle PNE , il restera le
 Triangle PKS , égal au Triangle TKQ , comme
 auparavant.

Si le même point S , convient avec le centre O , en 26. Fig.
 sorte que les trois points O, N, S , n'en fassent qu'un,
 auquel cas le Triangle ONS , s'évanouit, la demon-
 stration sera la même, pourvu que l'on change le
 Triangle PNE , au Triangle POE , le Trapeze
 $NBFS$, au Triangle $OB F$, lequel par conséquent
 sera égal au Triangle POE , le Plan $SNLQK$, au
 Plan $OLQK$, & le Triangle PKS , au Triangle
 PKO , lequel on trouvera égal au Triangle KQT ,
 par des raisonnemens semblables aux precedens.

Enfin, si l'Ordonnée PN , coupe le Diametre DM , 27. Fig.
 en son extrémité M , en sorte que le point S , con-
 vienne avec le point M , auquel cas le point E , tom-
 bera au dedans de l'Ellipse, le Triangle ONS , se
 changera au Triangle OMN ; & au lieu que nous
 avions le Triangle PNE , égal à la différence $OB F -$
 ONS , on l'aura égal à la différence $OB F - OMN$,
 après quoy le quatrième article se changera en celui-
 cy.

Parce que le Triangle QLE , est égal au Plan 4.
 $LBFT$; si à chacun on ajoute le Plan $KELT$, on
 aura le Triangle KTQ , égal au Trapeze $KEBF$; &

27. Fig.

parce que le Triangle PNE , est égal à la différence $OBP - OMN$, si de chacun on ôte la différence $OKP - OMN$, on aura le Triangle MKP , égal au même Trapeze $KEBF$. D'où il suit, que les Triangles MKP , KTQ , sont égaux entre eux; & comme ils sont semblables, leurs côtes homologues KP , KQ , seront aussi égaux entre eux. Ce qu'il falloit démontrer.

28. Fig.

Il peut arriver que le point Q , tombe à l'extrémité B , de l'Axe AB , en sorte que les quatre points Q , L , E , B , n'en fassent qu'un, auquel cas le point G , convient avec le point Q , & le Triangle QLE , s'évanouit, aussi-bien que le Trapeze $LBET$, & le Triangle PNE , se change au Triangle PNB , en quelque lieu que tombe le point S ; & s'il tombe entre le centre O , & le point d'attouchement D , le Trapeze $NBFS$, sera toujours égal au Triangle PNB , & le Plan $SNLQK$, se changera au Plan $SNBK$, lequel étant ôté du Triangle PNB , & du Trapeze $NBFS$, qui sont égaux, il restera le Triangle PKS , égal au Triangle BKF ; & par conséquent le côté KP , égal au côté KB . Ce qu'il falloit démontrer.

29. Fig.

Si dans le même cas le point S , convient avec le centre O , en sorte que le Triangle ONS , s'évanouisse, au lieu du Triangle PNB , égal au Trapeze $NBFS$, on aura le Triangle POB , égal au Triangle OPB , ce qui rend égales les deux perpendiculaires OP , BP ; & si de chacun de ces deux Triangles égaux POB , OPB , on ôte le Triangle OKB , il restera le Triangle PKO , égal au Triangle BKF ; & par conséquent le côté KP , égal au côté KB , comme auparavant.

Mais, si dans le même cas, le point S, tombe en- 30. Fig.
tre le centre O, & l'extrémité M, du Diametre DM,
on connoîtra par ce qui a été dit dans la Fig. 25. que
Triangle PNB, est égal à la difference $OB F - ONS$;
c'est pourquoy, si de chacun on oste la difference
 $OB K - ONS$, il restera le Triangle PSK, égal au
Triangle BFK; & par consequent le côté KP, égal
au côté KB, comme auparavant.

COROLLAIRE.

IL est évident, que si à la Touchante DR, qui passe
par l'extrémité D, du Diametre DM, on tire une pa-
rallele MI, par l'autre extrémité M, cette parallele
MI, touchera l'Ellipse ADB, au même point M.
D'où l'on conclut aisément, que les Touchantes tirées
par les deux extrémités d'un Diametre d'une Ellipse,
sont paralleles entre elles.

PROPOSITION IV.

*Le Quarré d'une Ordonnée à un Diametre d'une
Ellipse, est au Rectangle sous les parties cor-
respondantes de ce Diametre, comme le Quarré
d'un autre Diametre parallele à l'Ordonnée,
au Quarré du premier Diametre.*

CETTE Proposition est évidente par la genera- 34. Fig.
tion, lorsque les deux Diametres sont des Axes:
mais dans un autre cas, je dis que le Quarré de l'Or-
donnée PK, ou QK, au Diametre DM, est au re-
ctangle MKD, sous les parties correspondantes KD,
KM, de ce Diametre DM, comme le Quarré du

24. Fig. Diametre HZ, parallele à l'Ordonnée PK, ou à la Touchante DR, au Quarre du premier Diametre DM.

Demonstration.

Pour la Demonstration, faites une preparation comme dans la Proposition precedente; & de plus, tirez par l'extrémité Z, du Diametre HZ, à la Touchante BF, la parallele ZI, qui coupe icy le grand Axe AB, en V, & le Diametre DM, prolongé en I.

1. Parce que les deux Triangles BDF, BDR, sont égaux, par la Proposition precedente, si on ajoute à chacun le Triangle ODB, on aura le Triangle OBF, égal au Triangle ODR.

1. Parce que le Triangle QLE, est égal au Trapeze LBFT, par la Proposition precedente, si on ajoute à chacun le Trapeze OLQK, on aura la somme LBFT + OLQK, égale à la somme QLE + OLQK; & si on oste la premiere LBFT + OLQK, du Triangle OBF, & la seconde QLE + OLQK, du Triangle ODR, égal au Triangle OBF, par l'article precedent, on aura le Triangle KQT, égal au Trapeze KDRE.

3. Parce que les deux Triangles OBF, OVI, sont semblables, on aura cette Analogie, OBq, OVq :: OBF, OVI; & en divisant on aura celle-cy, OBq - OVq, OBq :: VBFI, OBF; & si à la place du premier terme OBq - OVq, on met le Rectangle AVB, qui luy est égal, par 5. 2. & qu'on permute, on aura cette autre Analogie, AVB, VBFI :: OBq, OBF; & si à la place des deux derniers termes, OBq, OBF, on met les deux ACB, CBFD, qui sont en même raison, par la Proposition precedente, & qu'on

permuté, on aura cette autre Analogie, $AVB, ACB :: 24. Fig.$
 $VBFI, CBFD$; & si au lieu des deux premiers termes AVB, ACB , on met les deux ZVq, CDq , qui sont en même raison, par la generation, ou à la place de ces deux Quarrez les deux Triangles OVZ, CDR , qui sont en même raison, parce qu'ils sont semblables, on aura cette dernière Analogie, $OVZ, CDR :: VBFI, CBFD$, où l'on voit, que puisque les deux conséquens $CDR, CBFD$, sont égaux par la Proposition précédente, les deux antécédens $OVZ, VBFI$, sont égaux aussi.

Puisque donc le Triangle OVZ , est égal au Trapeze $VBFI$, si on ajoute à chacun le Triangle OVI , on aura le Triangle OZI , égal au Triangle $OBFI$, & par conséquent au Triangle ODR , qui a été démontré égal au Triangle $OBFI$, dans le premier article. 4.

Dans les Triangles semblables KQT, OZI , on a cette Analogie, $KQT, OZI :: KQq, OZq$; & si à la place du Triangle KQT , on met le Trapeze $KDRE$, qui luy est égal par le second article; & à la place du Triangle OZI , le Triangle ODR , qui luy est égal par l'article précédent, on aura cette autre Analogie, $KDRE, ODR :: QKq, OZq$. 5.

Enfin, dans les Triangles semblables ODR, OKE , on a cette Analogie, $OKE, ODR :: OKq, ODq$; & en divisant on aura celle-cy, $KDRE, ODR :: ODq + OKq, ODq$; & si au lieu du troisième terme $ODq + OKq$, on met le Rectangle MKD , qui luy est égal, par 5. 2. & que l'on permute, on aura cette autre Analogie, $KDRE, MKD :: ODR,$ 6.

24. Fig.

OD q ; & encore si à la place des deux antecédens KDRE, ODR, on met les deux Quarrez QK, OZ, qui sont en même raison, par l'article précédent, on aura celle-cy, QK q , MKD :: OZ q , OD q ; & enfin, si à la place des deux côtéz OZ, OD, on met leurs doubles HZ, DM, on aura cette dernière Analogie, QK q , MKD :: HZ q , DM q . Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

IL suit de cette Proposition, que si l'on tire à un même Diametre d'une Ellipse, plusieurs Ordonnées, leurs Quarrez seront proportionnels aux Rectangles sous les parties correspondantes de ce Diametre, puisque chaque Rectangle est au Carré de l'Ordonnée correspondante, comme le Carré du même Diametre au Carré de l'autre Diametre parallele à l'Ordonnée, lequel est conjugué au premier, comme nous démontrerons dans la Proposition suivante.

PROPOSITION V.

Si à une Ordonnée d'un Diametre d'une Ellipse, on tire un autre Diametre parallele, ces deux Diametres seront conjugués.

31. Fig.

JE dis, que si à l'Ordonnée PQ, du Diametre DM, on tire un autre Diametre parallele HZ, ces deux Diametres DM, HZ, seront conjugués l'un à l'autre; c'est-à-dire, que les Ordonnées du Diametre DM, comme PQ, seront paralleles à l'autre Diametre HZ, comme il est évident par la supposition, & reciproquement

quement les Ordonnées du Diametre H Z , comme 31. Fig.
 NS, seront paralleles au Diametre D M , comme
 nous alloûs demontrer.

Car , puisque l'on suppose que la ligne NS, est *Demon-*
 une Ordonnée au Diametre H Z , elle doit par Def. 7. *stration.*
 être parallele aux Touchantes H E , Z F , qui passent
 par les extrémitez H , Z , & par conséquent au Dia-
 metre D M , qui est aussi parallele aux Touchantes
 H E , Z F , parce qu'il est une Ordonnée au Diametre
 H Z , tirée par le centre O .

Mais , pour demontrer que D M , est une Ordon-
 née au Diametre H Z , ou parallele aux Touchantes
 H E , Z F , il faut demontrer que la ligne NS , que je
 suppose parallele au Diametre D M , est divisée en deux
 également au point T , par l'autre Diametre H Z , pour
 conclure ensuite , comme dans la Prop. III. que les li-
 gnes H E , Z F , paralleles aux deux D M , N S , tou-
 chent l'Ellipse aux points H , Z , & que par consé-
 quent ces deux lignes D M , N S , sont des Ordonnées
 au Diametre H Z .

Ayant tiré des points S , N , au Diametre D M , les
 Ordonnées S L , N G , qui seront égales , on aura par
 le Corollaire de la Proposition precedente , cette Ana-
 logie , $NGq, MGD :: SLq, MLD$, où l'on voit,
 que puisque les antecedens NGq, SLq , sont égaux,
 les deux consequens MGD, MLD , sont égaux
 aussi , & que par conséquent on a cette Analogie ,
 $MG, ML :: DL, DG$; c'est pourquoy en divisant,
 on aura celle-cy , $ML, GL :: DG, GL$, où l'on voit,
 que puisque les consequens sont égaux , les antecede-
 ns ML, DG , sont égaux aussi ; & si on les oste

N. Fig.

des deux lignes égales OM , OD , il restera les deux égales OL , OG , ou TS , TN . Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

SI au Diametre DM , & à son conjugué HZ , on cherche une troisième proportionnelle, elle représentera le Parametre de ce Diametre DM , par *Def. 9.* & il sera aisé de conclure par ce qui a été démontré dans la *Prop. IV.* que le Rectangle MGD , est au Quarré de l'Ordonnée correspondante NG , comme le Diametre DM , à son Parametre : & pareillement, si au Diametre HZ , & à son conjugué DM , on trouve une troisième proportionnelle, elle sera le Parametre de ce Diametre HZ ; & l'on connoitra de la même façon, que le Rectangle HTZ , est au Quarré de l'Ordonnée correspondante ST , comme le Diametre HZ , à son Parametre. Ainsi, vous voyez que dans une Ellipse, le Rectangle, sous les parties d'un Diametre quelconque, est au Quarré de son Ordonnée correspondante, comme le même Diametre à son Parametre; & conséquemment, comme le Quarré de ce Diametre au Quarré de son Diametre conjugué : & que par conséquent les Quarrez des Ordonnées à un même Diametre sont proportionnels aux Rectangles, sous les parties correspondantes de ce Diametre, comme il a été démontré à l'égard des Axes.

PROPOSITION VI.

Le Quarré d'une Ordonnée à un Diametre d'une Ellipse est égal à l'excès du Rectangle sous le Parametre, & la partie du même Diametre comprise entre l'Ordonnée & l'Ellipse, sur un Rectangle semblable, & semblablement posé à la Figure du même Diametre, & ayant pour base la même partie.

SUPPOSONS premierement que le Diametre AB, ^{32. Fig.} soit un Axe, si l'on fait sous l'Axe AB, & son Parametre BG, la figure du même Axe AB, sçavoir le Rectangle ABGN, & qu'on prolonge une Ordonnée quelconque à l'Axe AB, comme CD, jusques en L, & que par le point K, où elle coupe la Diagonale AG, on tire à l'Axe AB, la parallèle KM, laquelle retranchera du Rectangle CBGL, le Rectangle KMG L, semblable & semblablement posé au grand, ou à la Figure ABGN, par 24. 6.

Je dis, que le Quarré de cette Ordonnée CD, est égal à l'excès ou au Rectangle BCKM, du Rectangle CBGL, sous le Parametre BG, & la partie interceptée BC, sur le Rectangle KMG L, semblable & semblablement posé à la Figure ABGN, & ayant pour base la ligne KM, égale à la même partie interceptée BC.

Car, puisque par la generation, on a cette Analogie, AB, BG::ACB, CDq, si à la place des deux ^{Demon-} premiers termes AB, BG, on met les deux AC, CK, ^{stration.}

32. Fig.

qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables ABG , ACK ; on aura cette autre Analogie, $AC, CK :: ACB, CDq$; & si aux deux premiers termes AC, CK , on donne la hauteur commune CB , on aura cette dernière Analogie, $ACB, BCK :: ACB, CDq$, où l'on voit, que puisque les deux antecédens sont égaux, les deux conséquens BCK, CDq , sont égaux aussi. Ce qu'il falloit démontrer.

33. Fig.

La démonstration sera la même, lorsque le Diamètre AB , ne sera pas un Axe, pourvu que l'on change tant soit peu la construction; parce que l'Ordonnée CD , n'étant plus perpendiculaire au Diamètre AB , au lieu de la prolonger, comme il a été fait auparavant, il faut tirer du point C , au Diamètre AB , la perpendiculaire CL , & faire un raisonnement semblable au précédent.

S C O L I E.

Le Carré de l'Ordonnée CD , est égal dans la Parabole au Rectangle $CBGL$; & comme il est moindre dans l'Ellipse, que ce Rectangle $CBGL$, du Rectangle $KMGL$, puisqu'il a été démontré égal au Rectangle $CBMK$, cela a donné le nom d'Ellipse à la Courbe $AIBH$.

32. &

33. 1. fig.

Si l'on suppose $AB \propto d$, $BG \propto p$, $BC \propto x$, & $CD \propto y$, on aura $AC \propto d-x$, $MG \propto \frac{d}{2}$, à cause des Triangles semblables ABG, KMG ; & si l'on ôte $MG \propto \frac{d}{2}$, de $BG \propto p$, il restera $BM \propto p - \frac{d}{2}$, laquelle étant multipliée par $BC \propto x$, on aura $px - \frac{dx}{2}$, pour le Rectangle $CBMK$, ou pour le Carré yy , de l'Ordonnée $CD \propto y$. Ainsi on a cette Equation constitutive, $yy \propto px - \frac{dx}{2}$, telle que nous l'avons trouvée dans la propriété générale.

PROPOSITION VII.

Si l'on tire au dedans d'une Ellipse, à deux Diametres conjugués, deux parallèles, qui se coupent au dedans de la même Ellipse; le Rectangle sous les parties de l'une sera au Rectangle sous les parties de l'autre, comme le Quarré du Diametre parallele à la premiere, au Quarré du Diametre parallele à la deuxieme.

JE dis, que si aux deux Diametres conjugués DM, ^{31. Fig.} HZ, on tire au dedans de l'Ellipse ADB, les deux parallèles NS, PQ, qui se coupent au dedans de la même Ellipse ADE, au point V, le Rectangle QVP, est au Rectangle NVS, comme le Quarré du Diametre HZ, au Quarré du Diametre DM.

Ayant tiré des deux points N, S, au Diametre DM, ^{7. demon-} les Ordonnées NG, SL, elles seront parallèles à ^{stration.} l'autre Diametre HZ, par Def. 8. & les deux lignes OG, OL, seront égales, par Prop. V. & à cause de MKD $\propto$ MOq-OKq, & de MGD $\propto$ MOq-OGq, par 3. 2. on aura MKD-MGD $\propto$ OGq-OKq; & encore à cause de OGq-OKq $\propto$ GKL, par 3. 2. on aura MKD-MGD $\propto$ GKL.

Puisque par Prop. V. on a cette Analogie, GNq, KQq::MGD, MKD, ou KVq, KQq::MGD, MKD; en divisant on aura celle-cy, QKq-KVq, QKq::MKD-MGD, MKD; & si au lieu du premier terme QKq-KVq, on met le Rectangle QVP,

31. Fig.

qui luy est égal, par 5. 2. & à la place du troisième MKD-MGD, le Rectangle GKL, ou NVS, qui luy a esté démontré égal, on aura cette autre Analogie, QVP, QKq:: NVS, MKD, & en permutant on aura celle-cy, QVP, NVS:: QKq, MKD; & si au lieu des deux derniers termes QKq, MKD, on met les deux HZq, DMq, qui sont en même raison, par Prop V. on aura cette dernière Analogie, QVP, NVS:: HZq, DMq. Ce qu'il falloit démontrer.

PROPOSITION VIII.

Si l'on tire au dedans d'une Ellipse à deux Diametres conjugués, deux lignes paralleles, qui se coupent au dehors de la même Ellipse, le Rectangle sous toute une ligne & sa partie extérieure, sera au Rectangle sous toute l'autre ligne & sa partie extérieure, comme le Quarré du Diametre parallele à la première ligne, au Quarré du Diametre parallele à la seconde.

34. Fig.

JE dis, que si aux deux Diametres conjugués DM, HZ, on tire au dedans de l'Ellipse MHD, les deux paralleles NS, PQ, qui se coupent au dehors de la même Ellipse MHD, au point V, le Rectangle QVP, est au Rectangle NVS, comme le Quarré du Diametre HZ, au Quarré du Diametre DM.

Démonstration.

Ayant tiré des deux points N, S, au Diametre DM, les Ordonnées NG, SL, elles seront paralleles à l'autre Diametre HZ, par Def. 8. & les deux lignes OG, OL, seront égales, par Prop. V. & à cause de

MKD $\propto$ MOKq-OKq, & de MGD $\propto$ MOq-OGq, 34. Fig. par 5. 2. on aura MKD-MKD $\propto$ OKq-OGq; & encore à cause de OKq-OGq $\propto$ GKL, par 6. 2. on aura MGD-MKD $\propto$ GKL.

Puisque par *Prop. V.* on a cette Analogie, GNq, QKq::MGD, MKD, ou KVq, QKq::MGD, MKD, en divisant on aura celle-cy, KVq-QKq, QKq::MGD-MKD, MKD; & si au lieu du premier terme KVq-QKq, on met son égal QVP, par 6. 2. & au lieu du troisième MGD-MKD, son égal GKL, ou NVS, on aura cette autre Analogie, QVP, QKq::NVS, MKD; & en permutant on aura celle-cy, QVP, NVS::QKq, MKD; & si à la place des deux derniers termes QKq, MKD, on met les deux HZq, DMq, qui sont en même raison, par *Prop. V.* on aura cette dernière Analogie, QVP, NVS::HZq, DMq. Ce qu'il falloit démontrer.

PROPOSITION IX.

Si on coupe un Cone par un Plan, lequel étant perpendiculaire à la base du Triangle del' Axe, retranche de ce même Triangle un autre Triangle dissemblable; la Section sera une Ellipse.

JE dis, que si on coupe le Cone ABCD, dont la 31. Fig. base est le Cercle ADC, & le Triangle del'Axe est ABC, par un Plan, qui soit perpendiculaire à la base AC, du Triangle del'Axe ABC, en sorte que coupant les deux côtez AB, BC, du Triangle del'Axe ABC, au dedans du Cone ABCD, aux deux points L, N,

35. Fig.

il retranche du même Triangle de l'Axe ABC , le petit Triangle dissemblable BLN , dont la base LN , est la commune Section de ce Plan, & du Triangle de l'Axe ABC ; la Section $LPNQ$, de ce même Plan & du Cone $ABCD$, est une Ellipse, sçavoir une Figure, où les Quarrez des Ordonnées à un Diametre, sont proportionnels aux Rectangles sous les parties correspondantes de ce même Diametre.

*Demon-
stration.*

Pour la demonstration, que l'on coupe le Cone $ABCD$, par un Plan, qui passant entre les extrémités L, N , de la ligne LN , que l'on nomme *Diametre de Section*, soit parallele à la base ADC , du Cone $ABCD$, pour avoir par cette Section le Cercle $RPSQ$, dont le Diametre RS , étant la commune Section de ce Plan & du Triangle de l'Axe ABC , sera parallele au Diametre AC , de la base ADC , du Cone $ABCD$.

Que l'on coupe encore le Cone $ABCD$, par un Plan, qui passant par les mêmes extrémités L, N , du Diametre LN , soit parallele à la même base ADC , du Cone $ABCD$, pour avoir par cette seconde Section le Cercle $FIGK$, dont le Diametre FG , étant la commune Section de ce Plan & du Triangle de l'Axe ABC , sera parallele au Diametre AC , de la base ADC , du Cone $ABCD$; & par consequent au Diametre RS .

Enfin, tirez par les points opposés I, K , où la Section $LPNK$, se trouve coupée par le Cercle $FIGK$, la droite IK , qui sera divisée à Angles droits, & en deux également, par la droite LN , au point H , qui est la Section des deux lignes FG, LN , & pareillement par les points opposés P, Q , où la même Section

ction $LBNQ$, se trouve coupée par le Cercle $RPSQ$, 35. Fig. la droite PQ , qui sera aussi coupée à Angles droits, & en deux également, par le Diametre LN , au point O , où les deux Diametres RS , LN , s'entrecoupent. D'où il suit, que les deux lignes HI , OP , sont des Ordonnées au Diametre LN , qui sera un Axe.

Cela étant supposé, on aura dans les Triangles semblables FHN , RON , cette Analogie, FH , $RO :: NH$, NO ; & dans les semblables GHL , SOL , on aura celle-cy, GH , $OS :: LH$, LO ; & si des termes homologues de ces deux Analogies, on en forme des Rectangles, comme vous voyez icy,

$$FH, RO :: NH, NO.$$

$$GH, OS :: LH, LO.$$

$$\overline{FHG, ROS} :: \overline{LHN, LON}.$$

on aura cette troisième Analogie, FHG , $ROS :: LHN$, LON ; & si au lieu des deux premiers termes FHG , ROS , on met les deux Quarrez HI , OP , qui leur sont égaux, par 35. 3. on aura cette dernière Analogie, HIq , $OPq :: LHN$, LON , qui fait connoître que la Section $LPNQ$, est une Ellipse. Ce qu'il falloit démontrer.

Nous avons dit, que les deux lignes IK , PQ , sont coupées également, & à Angles droits, aux points H , O , par l'Axe LN ; ce qui est évident, parce que si on prolongeait le Plan $LPNQ$, jusqu'à ce qu'il rencontrât la base ADC , aussi prolongée, il la couperoit par une ligne perpendiculaire au Diametre AC , puisque le Plan $LPNQ$, est supposé perpendiculaire à ce Diametre: c'est pourquoy les deux lignes IK , PQ , étant parallèles à cette même

35. Fig.

ligne, puisque ces trois lignes sont les Sections du Plan $LPNQ$, par les trois Plans paralleles ADC , RQS , FKG , ces deux mêmes lignes IK , PQ , seront aussi perpendiculaires au Diametre AC , & par consequent aux deux FG , RS , qui les diviseront en deux également aux points H , O , par 3. 3. & parce que cette même ligne est aussi perpendiculaire à l'Axe LN , ses paralleles IK , PQ , seront aussi perpendiculaires au même Axe LN , &c.



DE L'HYPERBOLE.

Generation de l'Hyperbole.

S'IL y a sur un Plan un Angle quelconque ABG , 36. Fig. dont les deux lignes AB , BG , soient déterminées, je dis que l'on peut trouver sur le même Plan une infinité de points d'une Hyperbole, dont un Diametre déterminé sera AB , & le Parametre de ce Diametre sera BG , en sorte que la raison du Quarré d'une Ordonnée à ce Diametre AB , prolongé, comme de CD , au Rectangle correspondant ACB , soit égale à celle du Parametre BG , au même Diametre AB , telle qu'est la propriété de la courbe que nous avons appelée *Hyperbole*; sçavoir en cherchant au Diametre AB , à son Parametre BG , & au Rectangle ACB , un Quarré proportionnel, dont le côté CD , étant placé de côté & d'autre parallèlement au Parametre BG , on aura en D , deux points de l'Hyperbole: & pareillement en cherchant au Diametre AB , à son Parametre BG , & au Rectangle AEB , un Quarré proportionnel, dont le côté EF , étant placé de part & d'autre parallèlement au Parametre BG , on aura en F , deux autres points de l'Hyperbole; & ainsi ensuite.

Mais, pour avoir une pratique aisée, & pour dé-

96 Fg.

crire en même-temps deux Hyperboles, que nous appellerons *Opposées*, lesquelles seront égales, supposons que l'Angle ABG , soit droit, en sorte que le Diametre AB , soit un Axe déterminé. Trouvez le point O , milieu de cet Axe AB , & entre le même Axe AB , & son Parametre BG , une moyenne proportionnelle OK , que nous appellerons *Second Axe*. Tirez à l'Axe AB , prolongé de côté & d'autre, autant de perpendiculaires que vous voudrez trouver de points de l'Hyperbole, comme CD , EF , &c. en distances égales des deux extrémités A , B , de l'Axe déterminé AB . Décrivez du point O , que nous appellerons *Centre* de l'Hyperbole, ou des Hyperboles opposées, par les points C , E , &c. les demi-Cercles CHC , EIE , &c. qui donneront sur le Parametre BG , prolongé quand il en sera besoin, les points H , I , &c. Après cela cherchez aux trois lignes AB , OK , BH , une quatrième proportionnelle CD , & pareillement aux trois lignes AB , OK , BI , une quatrième proportionnelle EF , & ainsi ensuite, & les points D , F , seront de l'Hyperbole.

Démonstration.

Car, puisque par la construction nous avons cette Analogie, $AB, OK :: BH, CD$, & par conséquent celle-cy, $ABq, OKq :: BHq, CDq$; si à la place du Carré OK , on met le Rectangle ABG , qui luy est égal, parce que l'on a fait OK , moyenne proportionnelle entre AB , BG ; & à la place du Carré BH , le Rectangle sous la petite ligne AC , & la grande AC , c'est-à-dire, le Rectangle ACB , qui luy est égal, par la nature du Cercle, on aura cette autre Analogie, $ABq, ABG :: ACB, CDq$; & si au lieu des deux premiers termes

AB *q*, ABG, on met les deux AB, BG, qui sont *3^e. Fig.* en même raison, par 1. 6. on aura cette dernière Analogie, AB, BG :: ACB, CD *q*, qui fait connoître que le point D, est de l'Hyperbole.

On démontrera de la même façon que le point E, est de l'Hyperbole : mais on peut trouver un peu autrement les mêmes points D, E, sçavoir en cherchant aux trois lignes OK, BG, BH, une quatrième proportionnelle CD, & pareillement aux trois lignes OK, BG, BI, une quatrième proportionnelle EF, & les deux points D, E, seront de l'Hyperbole.

Car, puisque par la construction nous avons cette Analogie, OK, BG :: BH, CD ; si à la place des deux premiers termes OK, BG, on met les deux AB, OK, qui sont en même raison, à cause des trois proportionnelles AB, OK, BG, on aura celle-cy, AB, OK :: BH, CD, de laquelle on a conclu auparavant, que le point D, étoit de l'Hyperbole, &c. *Démonstration.*

COROLLAIRE I.

IL suit évidemment de cette construction, que les Hyperboles opposées ADF, BDF, doivent passer par les extrémités A, B, de leur Axe commun AB, & qu'elles sont égales, & que par conséquent le Parametre BG, de l'Hyperbole BDF, est égal à celui de l'Hyperbole opposée ADF, à l'égard du même Axe déterminé AB.

COROLLAIRE II.

IL s'ensuit aussi, que les Quarrez des Ordonnées CD, EF, sont proportionnels aux Rectangles correspondans ACB, AEF, puisque le Carré de cha-

Fig. 36.

que Ordonnée est à son Rectangle correspondant, comme le Diametre AB , à son Parametre BG , par la generation. Et comme ces Rectangles vont toujours croissant à mesure que les Ordonnées CD, EF , s'éloignent plus des Sommets A, B , ces mêmes Ordonnées CD, EF , iront toujours croissant. D'où il est aisé de conclure, que chaque Hyperbole va toujours s'élargissant, & s'éloignant de plus en plus de l'Axis indéterminé AE , ou BE , & aussi du Parametre BG , & par conséquent de toutes les paralleles au même Parametre BG , telle qu'est la ligne LM , qui passe par le centre O , & que nous appellerons *Axe conjugué*, lequel divise en deux également toutes les lignes paralleles à l'Axis AB , & terminées par les deux Hyperboles opposées ADF, BDF , comme DD, FF , &c. à cause des deux lignes égales OA, OB , des deux égales AC, BC , & des deux égales AE, BE , en les prenant chacune dans son Hyperbole. Cela est trop évident par la construction, sans qu'il soit besoin d'une plus longue demonstration. D'où l'on conclut aussi aisément, que le Parametre BG , ne rencontre l'Hyperbole BDF , qu'au Sommet B , sans la couper, & que l'Axis indéterminé BE , divise toutes ses Ordonnées à Angles droits & en deux également.

COROLLAIRE III.

ENFIN il s'ensuit, que le Carré d'une Ordonnée à l'Axis BE , comme de CD , sera égal au Rectangle correspondant ACB , lorsque l'Axis AB , sera égal à son Parametre BG , auquel cas l'Hyperbole BDF , & son opposée ADF , se nommera *Equilateres*; & que ce même Carré CD , sera moindre

que le Rectangle correspondant ACB , quand l'Axe AB , sera plus grand que son Parametre BG ; & enfin que le même Carré CD , sera plus grand que le Rectangle correspondant ACB , lorsque l'Axe AB , sera moindre que son Parametre BG .

L'Analyse nous enseignera une construction de l'Hyperbole, qui sera beaucoup plus facile que la précédente. Pour découvrir cette construction, supposons que par les extrémités A, B , de l'Axe déterminé AB , on ait décrit les deux Hyperboles opposées & égales AD, BD , dont l'Axe commun soit AB , le centre commun soit O , & le Parametre commun soit BG , & de plus, que la ligne CD , soit perpendiculaire au même Axe AB . Supposons encore que sur le même Axe AB , prolongé vers A , & vers B , on ait déterminé les deux lignes égales OE, OF , en sorte que si par quelque point de l'une des Hyperboles AD, BD , comme D , de l'Hyperbole BD , on tire des deux points déterminez E, F , les droites DE, DF , leur différence $DE - DF$, soit toujours égale à une même ligne donnée: car ainsi en décrivant de l'un de ces deux points, comme du point E , le plus éloigné de B , avec une ouverture du compas un peu plus grande que AE , ou que BF , un arc de Cercle, & un autre de l'autre point F , le plus proche de B , avec une ouverture du compas égale à la somme de la ligne donnée, & de l'ouverture du premier arc, la Section de ces deux arcs donnera un point de l'Hyperbole AD ; & l'on en pourra trouver de la même façon autant d'autres points que l'on voudra, & décrire aussi de la même façon l'Hyperbole opposée

27. Fig.

BD, lorsqu'on aura une fois déterminé la longueur de la ligne donnée, & des deux lignes OE, OF, en sorte que cette longueur soit invariable, & indépendante de la ligne indéterminée AC, ou BC; autrement cette même longueur ne pourroit pas servir pour trouver autant de points de l'Hyperbole qu'on voudroit.

Pour donc déterminer la longueur de cette ligne, qui doit être donnée, & celle des lignes OE, OF, indépendamment de la ligne indéterminée AC, ou BC, & seulement par rapport à l'Axe AB, à son Paramètre BG, & au second Axe OK, qui sont invariables, au lieu que AC, ou BC, peut changer en une infinité de manières différentes; faisons les suppositions suivantes:

$$AB \propto d.$$

$$BG \propto p.$$

$$OK \propto f.$$

$$\text{Hyp. A D. } AC \propto x \propto BC. \quad \text{Hyp. B D.}$$

$$CD \propto y.$$

$$BF \propto z \propto AE.$$

pour avoir dans l'Hyperbole BD,

$$AC \propto x + d.$$

$$CF \propto x - z.$$

$$OF \propto \frac{1}{2}d + z \propto OE.$$

$$CE \propto x + d + z.$$

$$DE \propto \sqrt{xx + 2dx + dd + 2zx + 2dz + 2xz + yy}.$$

$$DF \propto \sqrt{xx - 2zx + zz + yy}.$$

Pour connoître à quel Quarté il faut évaluer le Quarté $xx - 2zx + zz + yy$, de la ligne DF, en telle sorte que les lignes égales OE, OF, ou bien les lignes AE, BF, soient invariables, & indépendantes de la partie

partie indéterminée $BC \propto x$, il ne faut pas que dans leur valeur, c'est-à-dire, dans la valeur qu'on trouvera de z , il demeure la lettre indéterminée x . Pour cette fin, il faut que dans ce Quarré les termes xx, yy , se rencontrent, afin que par l'antithese ils se détruisent, car ainsi le reste de l'Equation se pourra diviser plus facilement par x ; ce qui se doit faire, afin que cet x , s'évanouisse, & qu'ainsi on puisse trouver z , indépendamment de la lettre indéterminée x .

On ne peut pas prendre le Quarré $xx + zdx + dd + xxz + zdz + zz + yy$, de la ligne DE , où les Quarrez xx, yy , se rencontrent, parce que cette ligne DE , est plus grande que la ligne DF . C'est pourquoy on diminuera cette ligne trop grande DE , de quelque quantité, comme de ω ; & cette ligne ainsi diminuée, sçavoir $\sqrt{xx + zdx + dd + xxz + zdz + zz + yy} - \omega$, pourra être égale à la ligne $DF \propto \sqrt{xx - 2xz + zz + yy}$, en faisant cette Equation, $\sqrt{xx + zdx + dd + xxz + zdz + zz + yy} - \omega \propto \sqrt{xx - 2xz + zz + yy}$, où prenant le Quarré de chaque partie, on aura celle-cy, $-2\omega\sqrt{xx + zdx + dd + xxz + zdz + zz + yy} + xx + zdx + dd + 2xz + zdz + zz + yy + \omega\omega \propto xx - 2xz + zz + yy$; & par l'antithese on aura celle-cy, $dd + zdx + 4xz + zdz + \omega\omega \propto 2\omega\sqrt{xx + zdx + dd + xxz + zdz + zz + yy}$; & pour diminuer le nombre des termes, mettez d , à la place de ω , en supposant $d \propto \omega$, pour avoir cette autre Equation, $zdd + zdx + 4xz + zdz \propto 2d\sqrt{xx + zdx + dd + xxz + zdz + zz + yy}$, dont chaque partie étant divisée par 2, on aura celle-cy, $dd + dx + 2xz + dz \propto d\sqrt{xx + zdx + dd + xxz + zdz + zz + yy}$, où prenant le Quarré de chaque partie, on aura cette autre Equation, $d^4 + 2d^3x + ddxx + 6ddxz + 4dxxz + 4xxzz + 2d^3z + 4dxzz + ddzz \propto$

37. Fig.

$ddxx + zd^2x + d^4 + zddxz + zd^2z + ddzz + ddy$; & par l'antithése on aura celle-cy, $4xxzz + 4dzxz + 4dzxx + 4ddzx - ddy \propto 0$; & si à la place de yy , on met $px + \frac{y^2}{4}$, qui luy est égal, comme l'on connoît par l'Equation constitutive de l'Hyperbole, on aura cette autre Equation, $4xxzz + 4dxzz + 4dxxz + 4ddxz - ddpz - dpzx \propto 0$, laquelle étant divisée par $4xx + 4dx$, on aura cette dernière Equation, $zz + dz - \frac{1}{4}dp \propto 0$, dans laquelle on trouvera $z \propto \frac{1}{4}\sqrt{dd + dp} - \frac{1}{4}d$. Et parce que le second Axe $OK \propto f$, est moyen proportionnel entre l'Axe déterminé AB , & son Parametre BG , son Quarré ff , sera égal au Rectangle dp . Si donc on met ff , à la place de dp , on aura $z \propto \frac{1}{4}\sqrt{dd + ff} - \frac{1}{4}d$, pour AE , & BF ; c'est pourquoy on aura OE , ou $OF \propto \frac{1}{4}\sqrt{dd + ff}$.

Ce qui fait connoître que chacune des deux lignes égales OE , OF , est égale à la Racine quarrée de la somme des Quarrés des moitiés de l'Axe déterminé AB , & du second Axe OK . Ainsi, les deux lignes invariables OE , OF , seront connues, après quoy la quantité que nous avons supposé donnée, sera aussi connue, parce qu'elle est égale à l'Axe déterminé AB , puisque nous avons égalé la ligne DF ; à la différence des lignes DE , & ω , ou d , ou AB ; ce qui fait que cette ligne AB , est égale à la différence des deux DE , DF .

*Autre
Constru-
ction.*

Mais, pour venir à la pratique, prenez sur le Parametre BG , que je suppose perpendiculaire à l'Axe déterminé AB , la ligne BI , égale à la moitié du second Axe OK , & faites les lignes OE , OF , égales chacune à la ligne OI , pour avoir sur l'Axe prolongé AB , les points invariables E , F : de sorte que la lon-

gueur des lignes égales OE , OF , sera déterminée. 37. Fig.
 Car à cause de $AB \propto d$, on aura $\frac{1}{2}d$, pour chacune
 des deux lignes égales OA , OB ; & à cause de $OK \propto f$,
 on aura sa moitié $BI \propto \frac{1}{2}f$, dont le Quarré $\frac{1}{4}ff$, étant
 ajoûté au Quarré $\frac{1}{4}dd$, de $OB \propto \frac{1}{2}d$, on aura $\frac{1}{4}dd + \frac{1}{4}ff$,
 pour le Quarré de la ligne OI , ou OE , ou OF ,
 laquelle par conséquent vaudra $\sqrt{\frac{1}{4}dd + \frac{1}{4}ff}$, ou $\frac{1}{2}\sqrt{dd + ff}$,
 telle que nous l'avons trouvée.

Par le moyen de ces deux points invariables E , F ,
 que nous appellerons *Foyers* des deux Hyperboles op-
 posées AD , BD , on pourra trouver autant de points
 que l'on voudra de chaque Hyperbole, comme vous
 allez voir à l'imitation du point D , qui se peut trouver
 par une même operation en quatre lieux également
 éloignez de l'Axe conjugué LM , & par conséquent
 des deux extrémités A , B , de l'Axe déterminé AB ,
 en cette sorte.

Ayant décrit de l'un des deux Foyers E , F , comme
 de F , avec une ouverture du compas un peu plus grande
 que AE , ou que BF , un arc de Cercle, portez cette
 même ouverture sur l'Axe AB , prolongé, depuis son
 extrémité B , en H ; & avec l'ouverture de toute la li-
 gne AH , décrivez de l'autre Foyer E , un autre arc de
 Cercle; & la rencontre de cet arc avec le premier,
 donnera le point D , qui sera de l'Hyperbole.

Pour la démonstration, décrivez du point D , par *Démon-*
 le Foyer F , le demi-Cercle PFQ , qui coupe icy l'Axe *stration.*
 AB , prolongé en H , & la ligne DE , aussi prolongé. 38. Fig.
 gée aux points P , Q : ce qui fait que comme par cette
 construction, la différence des lignes DE , DF , est
 égale à l'Axe déterminé AB ; aussi la ligne EP , est

39. Fig.

égale au même Axe AB, à cause des deux lignes égales DF, DP. C'est pourquoy, si l'on divise EP, en deux également au point R, les quatre lignes ER, PR, AO, BO, seront égales. On voit aussi par 3. 3. que si l'on tire du point D, à l'Axe indéterminé BH, la perpendiculaire CD, les deux lignes CF, CH, seront égales.

1. Cela étant supposé, on connoitra premièrement par 6. 2. que OFq , ou OIq , ou $BOq \dagger BIq$, est égal à $AFB \dagger BOq$; c'est pourquoy en ôtant BOq , il restera le seul Carré BI, égal au seul Rectangle AFB.

2. Puisque par 36. 3. le Rectangle QEP, est égal au Rectangle HEF, on aura cette Analogie, EP, EF :: EH, EQ; & en prenant les moitez de tous les termes, on aura cette seconde Analogie, BO, EO :: OC, DR; & en composant, on aura celle-cy, BO, $BO \dagger EO :: OC, OC \dagger DR$; & en permutant, on aura celle-cy, BO, OC :: $BO \dagger EO, OC \dagger DR$; & en composant, on aura celle-cy, BO, $BO \dagger OC :: BO \dagger EO, BO \dagger EO \dagger OC \dagger DR$; & à cause de $BO \dagger OC$, ou de $AO \dagger OC \propto AC$, de $BO \dagger EO \propto BE \propto AF$, & de $BO \dagger EO \dagger OC \dagger DR$, ou de $ER \dagger CE \dagger DR \propto DE \dagger CE$, on aura cette dernière Analogie, BO, AC :: AF, $DE \dagger CE$.

3. Si dans la seconde Analogie, BO, EO :: OC, DR, on divise, on aura celle-cy, BO, $EO - BO :: OC, DR - OC$; & en permutant, on aura celle-cy, BO, OC :: $EO - BO, DR - OC$; & en divisant, on aura celle-cy, BO, OC - BO :: $EO - BO, DR - OC - EO \dagger BO$; & à cause de $OC - BO \propto BC$, de $EO - BO$,

ou de $EO - AO \propto AE \propto BF$, & de $DR - OC - EO$ † 31. Fig.
 BO , ou de $DR - CE \dagger ER \propto DE - CE$, on aura
 cette dernière Analogie, $BO, BC :: BF, DE - CE$.

Si l'on compare cette dernière Analogie avec la dernière de l'article second, en faisant des Rectangles sous les termes homologues correspondans dans chacune, comme vous voyez icy, on aura cette troisième

$$BO, AC :: AF, DE \dagger CE.$$

$$BO, BC :: BF, DE - CE.$$

$$BOq, ABC :: AFB, DEq - CEq.$$

Analogie, $BOq, ABC :: AFB, DEq - CEq$; & si au lieu du Rectangle AFB , on met le Carré BI , qui luy est égal, par le premier article, & à la place de la différence $DEq - CEq$, le Carré CD , qui luy est égal, par 47. 1. on aura cette autre Analogie, $BOq, ACB :: BIq, CDq$; & si à la place des deux antécédens BOq, BIq , on met leurs quadruples ABq, OKq , & qu'on permute, on aura cette autre Analogie, $ABq, OKq :: ACB, CDq$; & enfin, si au lieu des deux premiers termes ABq, OKq , on met les deux AB, BG , qui sont en même raison, à cause des trois proportionnelles AB, OK, BG , par la construction, on aura cette dernière Analogie, $AB, BG :: ACB, CDq$, qui fait connoître que le point D , est de l'Hyperbole. Ce qu'il falloit démontrer.

Lorsque le point C , conviendra avec le Foyer F , c'est-à-dire, lorsque la perpendiculaire CD , tombera sur le Foyer F , le demi-Cercle PFQ , ne coupera pas l'Axe BH , & il ne fera que le toucher au même Foyer F ; neantmoins la démonstration sera toujours la même, si l'on met OF , à la place de OC , & le Carré

de la Touchante EF, à la place du Rectangle HEF.

39. Fig.

On peut trouver par l'Analyse une construction encore plus facile que la précédente. Pour cette fin, prolongez de l'autre côté la ligne BI, en L, & tirez indefiniment du centre O, par les points I, L, les deux *Asymptotes* OI, OL, ainsi appellées, parce qu'elles ne sçauroient jamais couper l'Hyperbole BC, si loin qu'on les prolonge, comme vous verrez dans la suite.

Pour trouver une troisième construction de l'Hyperbole, par le moyen de ces deux *Asymptotes* OI, OL, tirons par l'extrémité B, de l'Axe AB, une ligne quelconque NQ, qui coupe ici les deux *Asymptotes* OI, OL, aux points N, Q, & l'Hyperbole BD, au point C. Tirez des trois points C, N, Q, à l'Axe AB, les perpendiculaires CD, NP, QR, & du point C, à l'Axe indéterminé BR, la parallèle CS. Après quoy on supposera

$$AB \propto d.$$

$$BG \propto p.$$

$$OK \propto f.$$

$$BD \propto x \propto RS.$$

$$CD \propto y.$$

$$OR \propto z.$$

$$OP \propto \omega.$$

$$BC \propto u.$$

pour avoir

$$OB \propto \frac{1}{2}d \propto OA.$$

$$BI \propto \frac{1}{2}f \propto BL.$$

$$BP \propto \frac{1}{2}d - \omega.$$

$$BR \propto z - \frac{1}{2}d.$$

$$DR \propto z - \frac{1}{2}d - x \propto CS.$$

Dans les Triangles semblables OBI, OPN, on trouvera $PN \propto \frac{1}{d}$, & dans les deux semblables BPN, BDC, on trouvera la même $PN \propto \frac{dy - \frac{1}{2}p}{\frac{1}{2}x}$. Ainsi on aura cette Equation, $\frac{f}{d} \propto \frac{dy - \frac{1}{2}p}{\frac{1}{2}x}$, dans laquelle on trouvera $\omega \propto \frac{df}{\frac{1}{2}dy + \frac{1}{2}x}$, & au lieu de BP $\propto \frac{1}{2}d - \omega$, on aura BP $\propto \frac{df}{\frac{1}{2}dy + \frac{1}{2}x}$, par le moyen de laquelle on trouvera dans les deux Triangles semblables BPN, BDC, l'Hypotenuse BN $\propto \frac{df}{\frac{1}{2}dy + \frac{1}{2}x}$.

Dans les Triangles semblables OBL, ORQ, on trouvera RQ $\propto \frac{1}{d}$, & dans les deux semblables BDC, BRQ, on trouvera la même RQ $\propto \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}p$; c'est pourquoy on aura cette Equation, $\frac{f}{d} \propto \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}p$, dans laquelle on trouvera $z \propto \frac{ddy}{\frac{1}{2}dy - \frac{1}{2}x}$; & au lieu de CS $\propto z - \frac{1}{2}d - x$, on aura CS $\propto \frac{df}{\frac{1}{2}dy - \frac{1}{2}x} - \frac{1}{2}d - x$, par le moyen de laquelle on trouvera dans les deux Triangles semblables OBL, CSQ, l'Hypotenuse CQ $\propto \frac{df}{\frac{1}{2}dy - \frac{1}{2}x}$.

Puisque donc nous avons trouvé BN $\propto \frac{df}{\frac{1}{2}dy + \frac{1}{2}x}$, & CQ $\propto \frac{df}{\frac{1}{2}dy - \frac{1}{2}x}$, nous sçavons que ces deux lignes BN, CQ, sont dans la raison de ces deux fractions, $\frac{df}{\frac{1}{2}dy + \frac{1}{2}x} : \frac{df}{\frac{1}{2}dy - \frac{1}{2}x}$; & si on les divise chacune par $\frac{1}{2}u$, on aura ces deux autres fractions, $\frac{df}{dy + x} : \frac{df}{dy - x}$, pour la raison des deux lignes BN, CQ; & si on réduit ces deux dernières fractions en même denomination, on aura en entiers ces deux autres termes, $ddfy - dffx$, $ddfy + dffx + 2ffxx - 2ddy$, pour la raison des deux mêmes lignes BN, CQ.

Parce que l'on a $ff \propto dp$, puisque le second Axe OK $\propto f$, est moyen proportionnel entre l'Axe déterminé AB $\propto d$, & son Parametre BG $\propto p$, on aura $p \propto \frac{d}{f}$; & au lieu de l'Equation constitutive de l'Hyperbole, $yy \propto px + \frac{p^2}{d}$, on aura celle-cy, $yy \propto \frac{dx}{f} + \frac{p^2}{d}$. C'est

39. Fig.

pourquoy si l'on met $\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}$, à la place de yy , les deux termes precedens, $ddy - dffx$, $ddy + dffx + 2ffxx - 2ddy$, se changeront en ces deux autres, $ddy - dffx$, $ddy - dffx$, lesquels étant égaux, font connoître que les deux lignes BN , CQ , sont aussi égales, d'où l'on tire cette troisième construction.

Troisième
constru-
ction.

Ayant tiré par le point B , une ligne quelconque NQ , qui coupe les deux Asymptotes OI , OL , portez sur cette ligne NQ , la ligne BN , de l'autre côté, depuis Q , en C , & le point C , sera de l'Hyperbole.

Demon-
stration.

Pour la demonstration, prolongez la ligne CD , jusqu'à ce qu'elle coupe les Asymptotes OT , OV , aux deux points V , T . Tirez par le point B , à l'Asymptote OT , la parallele BM , & par les points B, C , à l'autre Asymptote OV , les paralleles BE , CF . Il est evident par la construction, que les lignes TV, CZ , sont divisées en deux également au point D , par l'Axe BR , & que les lignes OE, BE , sont égales, aussi bien que les deux OE, FQ , & que les deux MN, CF , & que par consequent le Parallelograme $BEOM$, est un Rombe. Tout cela est trop aisé à demontrer, pour en parler davantage.

1.

Dans les Triangles semblables OQN , FQC , on a cette Analogie, $FQ, OQ :: CF, ON$; & en divisant on a celle-cy, $FQ, FO :: CF, ON - CF$; & si à la place de FQ , on met son égale OE , & qu'à la place de $ON - CF$, ou $ON - MN$, on mette son égale OM , ou BE , on aura cette dernière Analogie, $OE, OF :: CF, BE$, où l'on voit que le Rectangle OFC , est égal au Rectangle OEB , qui vaut autant que le Carré OE , à cause des deux lignes égales OE, BE .

Puisque

Puisque donc nous avons cette Analogie, $OE, OF :: CF, BE$, si à la place des deux derniers termes CF, BE , on met les deux CT, BL , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables FCT, EBL ; & à la place des deux premiers OE, OF , les deux BN, CN , qui sont en même raison, à cause des parallèles BE, CF ; ou si à la place de ces deux BN, CN , on met les deux BI, CV , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables BIN, CVN ; on aura cette autre Analogie, $BI, CV :: CT, BL$, où l'on voit que le Rectangle VCT , est égal au Rectangle IBL , c'est-à-dire, au Carré BL , à cause des deux lignes égales BI, BL .

C'est pourquoy le Carré BL , étant égal au Rectangle VCT , on pourra faire cette Analogie, $OBq, BLq :: OBq, VCT$; & si au lieu des deux premiers termes OBq, BLq , on met les deux ODq, DTq , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables OBL, ODT ; & à la place du dernier VCT , la différence $DTq - CDq$, qui luy est égale, par 5. 2. on aura cette autre Analogie, $ODq, DTq :: OBq, DTq - CDq$; & en permutant, on aura celle-cy, $ODq, OBq :: DTq, DTq - CDq$; & en divisant, on aura celle-cy, $ODq, ODq - OBq :: DTq, CDq$; & en permutant, on aura celle-cy, $ODq, OTq :: ODq - OBq, CDq$. Et si au lieu des deux premiers termes, ODq, DTq , on met les deux OBq, BLq , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables OBL, ODT ; & au lieu du troisième $ODq - OBq$, son égal ADB , par 6. 2. on aura cette autre Analogie, $OBq, BLq :: ADB, CDq$; & si à la place des

Fig. 32.

deux premiers termes OBq , BLq , on met leurs quadruples ABq , OKq ; ou si à la place de ces deux, on met les deux AB , BG , qui sont en même raison, à cause des trois proportionnelles AB , OK , BG , par la construction, on aura cette dernière Analogie, AB , $BG :: ADB$, CDq , qui fait connoître que le point C , est de l'Hyperbole. Ce qu'il falloit faire & démontrer.

COROLLAIRE I.

On démontrera de la même façon, que si l'on tire au dedans des Asymptotes OT , OV , par le même point B , plusieurs autres lignes, pour y trouver d'autres points de l'Hyperbole, tous les Rectangles OFc , seront égaux au même Carré OE , & que par conséquent ils seront égaux entre eux. D'où il est aisé de conclure, qu'à mesure que les longueurs OF , de ces Rectangles égaux croîtront, leurs largeurs CF , décroîtront; & qu'ainsi l'Asymptote OT , s'approche de plus en plus de l'Hyperbole BC , sans jamais la rencontrer.

Cela se peut aussi conclure, de ce que le Rectangle VCT , est égal au carré BL , parce que l'Hyperbole ZBC , s'élargissant toujours, comme vous avez vu dans la première construction, le Rectangle VCT , aura sa longueur VC , toujours plus grande, à mesure qu'elle s'éloignera davantage du point B , & par conséquent sa largeur CT , plus petite, puisque tous les Rectangles infinis VCT , étant égaux au même Carré BL , sont égaux entre eux. Ce qui fait voir que l'Asymptote OQ , s'approche toujours de plus en plus de l'Hyperbole BC , sans jamais la rencontrer.

IL s'ensuit aussi, que si des deux extrémités N, Q, de la ligne NQ, on tire à l'Axe AB, les perpendiculaires PN, QR, la ligne OR, se trouvera coupée aux deux points P, B, dans une raison que le R. P. Gregoire de S. Vincent appelle *Moyenne & extrême raison proportionnelle*, & que Monsieur De la Hire nomme *Proportion Harmonique*; c'est-à-dire, que le Rectangle sous toute la ligne OR, & la partie du milieu BP, est égal au Rectangle sous les deux autres parties OP, BR; ce que nous démontrerons en cette sorte.

Dans les Triangles semblables OBL, ORQ, on a cette Analogie, OB, BL :: OR, QR; & dans les deux semblables BDC, BRQ, on a celle-cy, BD, CD :: BR, QR; & si l'on fait des Rectangles sous les termes homologues correspondans

$$OB, BL :: OR, QR.$$

$$BD, CD :: BR, QR.$$

$$\overline{OBD, BLCD} :: \overline{ORB, QRq}.$$

dans ces deux Analogies, on aura cette troisième Analogie, OBD, BLCD :: ORB, QRq.

Dans les Triangles semblables OBL, OPN, on a cette Analogie, OB, BL :: OP, PN; & dans les deux semblables BDC, BPN, on a celle-cy, BD, CD :: BP, PN; & si l'on fait des Rectangles sous les termes homologues correspondans

$$OB, BL :: OP, PN.$$

$$BD, CD :: BP, PN.$$

$$\overline{OBD, BLCD} :: \overline{OPB, PNq}.$$

dans chaque Analogie, on aura cette troisième Analogie, OBD, BLCD :: OPB, PNq; & si à la place N ij

39 Fig.

des deux premiers termes, $OBD, BLCD$, on met les deux ORB, QRq , qui sont en même raison, par la troisième Analogie précédente, on aura cette autre Analogie $ORB, QRq::OPB, PNq$; & si à la place des deux conséquens QRq, PNq , on met les deux BRq, BPq , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables BRQ, BPN , on aura cette autre Analogie, $ORB, BRq::OPB, BPq$; & enfin, si à la place des deux Rectangles ORB, BRq , dont la hauteur commune est BR , on met leurs bases OR, BR , qui sont en même raison, par 1. 6. & que pareillement à la place des deux Rectangles OPB, BPq , dont la hauteur commune est BP , on mette leurs bases OP, BP , on aura cette dernière Analogie, $OR, BR::OP, BP$, qui fait connoître que le Rectangle $ORBP$, est égal au Rectangle $BROP$, Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE III.

40. Fig.

Si par le point de milieu S , de la ligne NQ , on tire au centre O , la droite OS , & que par le point E , où elle coupe l'Hyperbole BC , on tire à la même ligne NQ , la parallèle MR , cette parallèle MR , ne rencontrera l'Hyperbole BC , qu'au point E .

Démon-
stration.

Car, si on veut qu'elle la rencontre encore en un point, comme en F , quel'on tire par les deux points E, F , à l'Asymptote OI , les parallèles EK, FL , pour avoir les deux Triangles semblables RFL, REK , & les deux lignes égales KO, KR , à cause des deux égales SN, SQ , par la construction, lesquelles rendent égales les deux EM, ER , à cause des Triangles semblables ONQ, OMR , dont chacun est di-

visé en deux également par la droite OS.

Fig. 40.

Cela étant supposé, on aura dans les Triangles semblables REK , RFL , cette Analogie, $RK, RL :: EK, FL$; & en divisant, on aura celle-cy, $RK, KL :: EK, EK-FL$, ou $OK, KL :: EK, EK-FL$.

Puisque par *Coroll. 1.* le Rectangle OKE , est égal au Rectangle OLF , on aura cette Analogie, $OK, OL :: FL, EK$; & en divisant on aura celle-cy, $OK, KL :: FL, EK-FL$; & si au lieu des deux premiers termes OK, KL , on met les deux $EK, EK-FL$, qui sont en même raison, par l'article precedent, on aura cette autre Analogie, $EK, EK-FL :: FL, EK-FL$, où l'on voit, que puisque les consequens sont égaux, les antecedens EK, FL , sont égaux aussi: ce qui étant impossible, il est impossible aussi que la ligne MR , rencontre l'Hyperbole BC , ailleurs qu'au point E . Ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE IV.

C'EST pourquoy si l'on donnoit le point E , sur l'Hyperbole BC , pour en tirer une Touchante, il faudroit tirer par ce point E , à l'Asymptote opposée OI , la parallele EK , & faire KR , égale à KO , pour avoir le point R , par lequel & par le point donné E , il faudroit tirer la Touchante ER .

DEFINITIONS.

AXE *indeterminé* d'une Hyperbole, c'est une ligne droite, qui divise à Angles droits, & en deux également, une infinité de certaines lignes droites paralleles entre elles, tirées au dedans de l'Hyperbole, & terminées de côté & d'autre par la même Hyperbole.

Hyperboles opposées, ce sont deux Hyperboles égales,

40. Fig.

& placées à une certaine distance d'un sens contraire, l'une à l'égard de l'autre, sur un même Axe indéterminé prolongé autant qu'il en est besoin.

3. *Axe déterminé* d'une Hyperbole, c'est la partie de l'Axe indéterminé, comprise entre les deux Hyperboles opposées. Il est évident que l'Axe déterminé est commun aux deux Hyperboles opposées, & qu'il en marque la distance.

4. *Centre* d'une Hyperbole, c'est le point du milieu de l'Axe déterminé. Il est évident que le centre est aussi commun aux deux Hyperboles opposées.

5. *Diamètre déterminé* d'une Hyperbole, c'est une ligne droite tirée par le centre, & terminée par les deux Hyperboles opposées. Il est évident qu'une Hyperbole a une infinité de Diamètres déterminés, qui sont tous communs aux deux Hyperboles opposées, & que l'Axe déterminé est le plus court de tous ces Diamètres.

6. *Diamètre indéterminé* d'une Hyperbole, c'est la continuation indéterminée d'un Diamètre déterminé au dedans de l'Hyperbole. Il est évident que l'Axe indéterminé est un Diamètre indéterminé.

7. *Diamètre indéfini* d'une Hyperbole, c'est une ligne droite, laquelle étant tirée par le centre de l'Hyperbole ne la rencontre jamais, si loin qu'on la prolonge. Il est évident qu'une Hyperbole a aussi une infinité de Diamètres indéfinis, & qu'ils sont tous communs aux deux Hyperboles opposées.

8. *Axe conjugué* d'une Hyperbole, c'est un Diamètre indéfini perpendiculaire à l'Axe déterminé. Il est aussi évident, qu'un Axe conjugué est commun aux deux Hyperboles opposées.

Sommet d'une Hyperbole à l'égard d'un Diametre indeterminé, c'est le point où elle se trouve coupée par ce Diametre. Il est évident qu'une Hyperbole a une infinité de Sommets, puisqu'elle a une infinité de Diametres indeterminez. 9.

Touchante d'une Hyperbole, c'est une ligne droite, qui ne rencontre l'Hyperbole qu'en un point, sans la couper, c'est-à-dire, sans entrer au dedans. 10.

Ordonnée à un Diametre indeterminé d'une Hyperbole, c'est une ligne droite tirée au dedans de l'Hyperbole, parallelement à la Touchante qui passe par le Sommet de ce Diametre, & terminée de côté & d'autre par la même Hyperbole. Il est évident que toutes les Ordonnées à un même Diametre indeterminé, sont paralleles entre elles, puisqu'elles sont paralleles à une même Touchante, & que toutes les perpendiculaires à l'Axe indeterminé, tirées au dedans de l'Hyperbole, sont des Ordonnées à cet Axe. 11.

Ordonnée à un Axe conjugué d'une Hyperbole, c'est une ligne droite perpendiculaire à cet Axe conjugué, ou parallele à l'Axe determiné de l'Hyperbole, & terminée par les deux Hyperboles opposées. Il est évident que toutes les Ordonnées à l'Axe conjugué d'une Hyperbole, sont paralleles entre elles, & qu'elles sont divisées en deux également par l'Axe conjugué. 12.

Diametre conjugué à un Diametre indeterminé d'une Hyperbole, c'est un Diametre indéfini parallele à la Touchante, qui passe par le Sommet du Diametre indeterminé. 13.

Ordonnée au Diametre conjugué d'un Diametre in- 14.

40. *Fig.* déterminé d'une Hyperbole, c'est une ligne droite terminée par les deux Hyperboles opposées, & parallèles au Diametre indéterminé. Il est évident que toutes les Ordonnées d'un Diametre conjugué d'une Hyperbole, sont parallèles entre elles.

15. *Parametre* du Diametre déterminé d'une Hyperbole, c'est une ligne droite, laquelle touchant l'Hyperbole au Sommet du Diametre correspondant indéterminé, est quatrième proportionnelle au Rectangle sous une partie du même Diametre indéterminé, en la prenant depuis le Sommet, & la somme de cette même partie & du Diametre déterminé, au Carré de l'Ordonnée correspondante terminée par cette partie & par l'Hyperbole, & au Diametre déterminé. Il est évident que le Parametre est parallèle aux Ordonnées de son Diametre.

16. *Second Axe* d'une Hyperbole, c'est une ligne droite moyenne proportionnelle entre l'Axe déterminé & son Parametre. Il est évident que ce second Axe est commun aux deux Hyperboles opposées.

17. *Asymptotes* d'une Hyperbole, ce sont deux Diametres indéfinis, qui passent par les extrémités de deux lignes droites tirées de côté & d'autre par l'une des deux extrémités de l'Axe déterminé, perpendiculairement au même Axe, & égales chacune à la moitié du second Axe. Il est évident que deux Hyperboles opposées ont les mêmes Asymptotes, & que l'Angle des deux Asymptotes est divisée en deux également par l'Axe.

18. *Foyer* d'une Hyperbole, c'est un point de l'Axe indéterminé, éloigné du centre de l'Hyperbole d'une quantité

quantité égale à la partie de l'une des Asymptotes, comprise entre le centre & la Touchante au Sommet de l'Axe indéterminé.

Figure d'un Diamètre déterminé d'une Hyperbole, c'est le Rectangle sous ce Diamètre déterminé & son Paramètre. 19.

Second Diamètre à l'égard d'un Diamètre déterminé d'une Hyperbole, c'est une ligne droite moyenne proportionnelle entre ce Diamètre déterminé & son Paramètre. Il est évident que le Carré de ce second Diamètre est égal à la Figure du Diamètre déterminé. 20.

PROPOSITION I.

Tirer une Touchante par un point donné sur une Hyperbole donnée, dont les Asymptotes sont aussi données.

POUR tirer une Touchante par un point donné 40. Fig. sur l'Hyperbole donnée BEC, dont les Asymptotes sont OI, OR, & par conséquent le centre est O; divisez en deux également l'Angle IOR, des deux Asymptotes OI, OR, par la droite OB; laquelle étant le demi-Axe déterminé de l'Hyperbole, donnera sur la même Hyperbole BEC, le Sommet B, de l'Axe indéterminé BD.

Premièrement, si le point donné est le Sommet B, il est évident par la génération, que la ligne BI, perpendiculaire à l'Axe indéterminé BD, touchera l'Hyperbole donnée BEC, au point donné B.

Mais, si le point est donné ailleurs, comme en E,

O

40. Fig. on tirera par ce point donné E, une Touchante, comme il a esté enseigné au Coroll. 3. de la troisieme construction de l'Hyperbole, ou bien en cette sorte.

Seconde
constru-
ction.

Tirez par le point donné E, au centre O, le Diametre indeterminé OES, & au Sommet B, la droite BE, que vous prolongerez au delà de E, jusques en P, en sorte que EP, soit égale à EB, pour tirer par le point P, au Diametre ES, la parallele PC, qui donnera sur l'Hyperbole BEC, le point C. Tirez par ce point C, au Sommet B, del' Axe indeterminé BD, la droite BC; & à cette ligne BC, par le point donné E, la parallele MR, qui touchera l'Hyperbole proposée BEC, au point donné E.

Demon-
stration.

Pour la démonstration, prolongez la droite BC, jusqu'à ce qu'elle coupe les Asymptotes OI, OR, en deux points, comme N, Q, qui sera toujours possible, par la troisieme construction de l'Hyperbole, où nous avons vû que les lignes BN, CQ, sont égales; ce qui fait que comme les deux SB, SC, sont égales, à cause des deux égales EB, EP, & des deux paralleles ES, PC, les deux SN, SQ, sont aussi égales; & dans ce cas il a esté démontré au Coroll. 3. de la troisieme construction de l'Hyperbole, que la droite MR, touche l'Hyperbole BEC, au point E. Ce qu'il falloit faire & démontrer.

Troisieme
constru-
ction.

41. Fig.

Si l'on porte la distance OI, de côté & d'autre depuis le centre O, sur l'Axe prolongé AB, en E, & en F, ces points E, F, seront les Foyers des deux Hyperboles opposées, comme vous avez vû dans la seconde construction de l'Hyperbole. C'est pourquoy, si le point

donné est D, en tirant de ce point donné D, aux deux Foyers E, F, les droites DE, DF; & en divisant l'Angle EDF, en deux également par la droite DR, cette droite DR, touchera l'Hyperbole proposée BDM, au point donné D. 41. Fig.

Car, si on veut qu'elle la rencontre encore en un point, comme en M, que l'on tire de ce point M, aux deux Foyers E, F, les droites ME, MF; & ayant pris sur DE, la partie DP, égale à DF, que l'on tire les droites FP, MP. Démon-
stration.

Cette preparation étant faite, on considerera que la droite FP, est divisée à Angles droits, & en deux également au point N, par la droite DN, qui divise en deux également l'Angle D, du Triangle isoscele FDP; ce qui rend aussi isoscele le Triangle FMP, & par conséquent la ligne MP, égale à la ligne MF. Et parce que par la deuxième construction de l'Hyperbole, la difference des lignes ME, MF, est égale à la difference des lignes DE, DF, c'est-à-dire à EP, puisque chacune est égale à l'Axe déterminé AB, il faut que la difference des deux côtes ME, MP, du Triangle EPM, soit égale aussi au troisième côté PE: ce qui étant impossible, par 20. 1. il est impossible aussi que la droite DR, rencontre l'Hyperbole BDM, ailleurs qu'au point D; c'est pourquoy elle la touchera en ce même point D, par Def. 10. Ce qu'il falloit faire & démontrer.

Ou bien, ayant tiré du point donné D, à l'Axe indéterminé BC, la perpendiculaire CD, cherchez aux deux lignes OC, OB, une troisième proportionnelle OR, pour avoir le point R, par lequel, & par le Quatri-
me con-
struction.
42. Fig.

42. Fig.

point donné D, vous tirerez la droite DR, qui touchera l'Hyperbole BND, au point donné D.

*Demon-
stration.*

Car, si on veut qu'elle la rencontre encore en un point, comme en N; que l'on tire par ce point N, à la ligne CD, la parallèle MN; & ayant décrit du centre O, de l'Hyperbole, à l'entour de l'Axe déterminé AB, le demi-cercle AEB, tirez du point R, au même Axe AB, la perpendiculaire RE, qui sera terminée en E, par le demi-cercle AEB, & menez les droites OE, CE. Tirez encore du point M, la droite PM, qui touche le demi-cercle AEB, au point P, & la droite MS, parallèle à la ligne CE.

Cette preparation étant faite, on considerera que puisque les trois lignes OC, OB, OR, ou OC, OE, OR, sont proportionnelles, par la construction, le Triangle OEC, est Rectangle en E, & que par conséquent la droite CE, touche le demi-cercle AEC, au même point E, & le Rectangle ACB, sera égal au Quarré CE, & pareillement le Rectangle AMB, au Quarré MP, par 36. 3.

On considerera aussi que les deux Triangles REC, RSM, étant semblables, la raison des lignes RC, RM, est égale à celle des lignes CE, MS; & que par conséquent cette raison ne peut pas être égale à celle des lignes CE, MP, parce que les lignes MP, MS, son inégales.

Parce que par la generation, on a cette Analogie, ACB, AMB::CDq, MNq; si à la place des deux Rectangles ACB, AMB, on met les Quarrés des Touchantes CE, MP, qui leur sont égaux, par 36. 3. & à la place des deux Quarrés CD, MN, les deux

RC, RM, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables RCD, RMN, on aura cette autre Analogie, CEq, PMq::RCq, RMq; & par conséquent celle-cy, CE, PM::RC, RM: laquelle étant impossible, par l'article precedent, il est impossible aussi que la ligne DR, rencontre l'Hyperbole BND, ailleurs qu'au point D. Ce qu'il falloit démontrer.

S C O L I E.

COMME nous venons de démontrer, que quand les trois lignes OR, OB, OC, sont proportionnelles, la droite DR, touche l'Hyperbole BND, au point D, les trois lignes OR, OB, OC, sont proportionnelles.

Car, si ces trois lignes OR, OB, OC, ne sont pas proportionnelles, que ce soit les trois OR, OB, OH, & que l'on tire par le point H, à l'axe indéterminé BC, la perpendiculaire HF, qui donnera sur l'Hyperbole BND, le point F, par lequel & par le point R, on tirera la droite RF: On démontrera, comme auparavant, que cette ligne RF, touche l'Hyperbole BND, au point D; & comme l'on suppose que la droite RD, touche aussi l'Hyperbole, ces deux Touchantes RF, RD, doivent nécessairement se rencontrer au dehors de l'Hyperbole vers les points d'atouchement F, D, si on les prolonge, c'est pourquoy elles comprendront un espace; ce qui étant impossible, il est impossible aussi que les trois lignes, OR, OB, OH, soient proportionnelles. Il faut donc que les trois OR, OB, OC, soient proportionnelles. Ce qu'il falloit démontrer.

IL suit évidemment de cette démonstration & de la précédente, que l'on ne peut tirer par un même point d'une Hyperbole, qu'une Touchante, & que par conséquent les propriétés de la Touchante d'une Hyperbole, sont reciproques.

IL s'ensuit aussi que la Touchante d'une Hyperbole, comme DR, ne sçauroit passer par le centre O, de l'Hyperbole BND, & qu'elle coupe l'Axe déterminé AB, au point R, entre le centre O, & le Sommet B; & de plus, que ce point R, s'approchera d'autant plus du centre O, que le point d'attouchement D, sera plus éloigné du Sommet B, de l'Axe indéterminé BC.

D'où il est aisé de conclure, que le Diamètre d'une Hyperbole ne la sçauroit toucher, bien qu'il ne la puisse rencontrer qu'en un point, quand il est indéterminé, comme nous allons démontrer dans la Proposition suivante.

PROPOSITION II.

Le Diamètre indéterminé d'une Hyperbole, ne la coupe qu'en un point.

CETTE Proposition est évidente, parce que l'Hyperbole s'approchant de plus en plus de ses Asymptotes, & un Diamètre indéterminé s'éloignant de plus en plus des mêmes Asymptotes, il doit s'é-

loigner aussi de l'Hyperbole, quand il a commencé à la couper, & conséquemment ne la couper qu'en un point. Néanmoins nous en donnerons une démonstration plus scientifique.

Je dis donc que le Diamètre indéterminé TV , de l'Hyperbole TBD , dont l'Axe déterminé est AB , & l'indéterminé est BC , ne coupe l'Hyperbole qu'au point T .

Car, si l'on veut que ce Diamètre TV , coupe l'Hyperbole TBD , encore au point I ; que l'on tire des deux points I, T , à l'Axe BC , les perpendiculaires IK, TL , & qu'on prolonge le Diamètre indéterminé TV , au-delà de T , jusqu'à ce qu'il rencontre l'Axe déterminé AB , en quelque point, comme en O , qui sera le centre de l'Hyperbole, par *Def. 5. 6.*

Puisque par la generation, on a cette Analogie, $ALB, AKB :: TLq, IKq$; si au lieu des deux premiers termes ALB, AKB , on met les différences $OLq - OBq, OKq - OBq$, qui leur sont égales, par 6. 2. & à la place des deux derniers TLq, IKq , les deux OLq, OKq , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables OLT, OKI , on aura cette autre Analogie, $OLq - OBq, OKq - OBq :: OLq, OKq$; & en divisant, on aura cette dernière Analogie, $OLq - OBq, OLq - OKq :: OLq, OLq - OKq$: où l'on voit, que puisque les deux conséquens sont égaux, les deux antécédens $OLq - OBq, OLq$, sont égaux aussi; ce qui étant impossible, il est impossible aussi que le Diamètre indéterminé TV , coupe l'Hyperbole TBD , ailleurs qu'au point T . Ce qu'il falloit démontrer.

42. Fig.

Je ne m'arrêteray pas icy à démontrer, que si on prolonge au-delà du centre O , le Diamètre indéterminé TV , qui rencontre l'Hyperbole TBD , au point T , il rencontrera aussi l'Hyperbole opposée, & que le Diamètre déterminé sera divisé en deux également par le centre O , parce que ces deux choses sont évidentes par la génération de l'Hyperbole.

PROPOSITION III.

Si on prolonge une Ordonnée à l'Axe d'une Hyperbole, jusqu'à ce qu'elle coupe les deux Asymptotes, le Rectangle sous les parties de toute la ligne, comprises entre une partie de l'Hyperbole & les Asymptotes, sera égal au Carré de la moitié du second Axe.

43. Fig.

Je dis, que si on prolonge l'Ordonnée EC , à l'Axe BD , de l'Hyperbole ECB , dont le centre est O , l'Axe déterminé est AB , le Paramètre est BG , le second Axe est OK , sa moitié est BI , perpendiculaire à l'Axe indéterminé BD , & les Asymptotes sont OF , OL , jusqu'à ce qu'elle coupe les mêmes Asymptotes OF , OL , en deux points, comme F , L ; le Rectangle FCL , est égal au Carré BI .

Démonstration.

Car dans les Triangles semblables OBI , ODL , on a cette Analogie, $OBq, BIq :: ODq, DLq$; & si au lieu des deux premiers termes OBq, BIq , on met leurs quadruples ABq, OKq ; ou si à la place de ces deux Carrés on met les deux lignes AB, BG , qui sont en même raison, à cause des trois proportionnelles

tionnelles AB, OK, BG, par *Def. 16.* ou bien encore *43. Fig.* si à la place de ces deux lignes AB, BG, on met les deux Rectangles ADB, CDq, qui sont en même raison, par la generation, on aura cette autre Analogie, ADB, CDq :: ODq, DLq; & si au lieu du troisième terme ODq, on met la somme ADB + OBq, qui luy est égale, par 6. 2. & à la place du quatrième DLq, la somme FCL + CDq, qui luy est égale, par 5. 2. & qu'on permute, on aura cette autre Analogie, ADB, ADB + OBq :: CDq, FCL + CDq; & en divisant, on aura celle-cy, ADB, OBq :: CDq, FCL; & si au lieu des deux antecedens ADB, CDq, on met les deux OBq, BIq, qui sont en même raison, comme vous avez vû, on aura cette dernière Analogie, OBq, OBq :: BIq, FCL, qui fait connoître que le Rectangle FCL, est égal au Quarré BI. Ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE.

IL suit évidemment de cette Proposition, que tous les Rectangles infinis FCL, que l'on peut avoir en tirant une infinité d'Ordonnées à l'Axe indéterminé BD, sont égaux entre eux, & que chacun est égal au quart de la Figure de l'Axe déterminé AB. Et comme les largeurs FC, de ces Rectangles infinis deviennent toujours plus grandes, à mesure que les Ordonnées à l'Axe BD, s'éloignent du Sommet B; il est de nécessité que la largeur CL, se diminue à proportion. Ainsi vous voyez ce que nous avons déjà remarqué ailleurs, sçavoir que l'Hyperbole s'approche toujours de ses Asymptotes, sans jamais les rencontrer. D'où il est aisé de conclure, que la largeur CL,

43. Fig.

peut devenir plus petite que quelque ligne donnée que ce soit, parce que le Rectangle $FC L$, étant égal au Carré BI , on peut réduire ce Carré BI , en un Rectangle, dont la largeur soit moindre que la ligne donnée, sçavoir en cherchant à cette ligne plus petite, & à la ligne BI , une troisième proportionnelle, qui donnera la longueur FC , qu'il sera facile d'appliquer entre la partie de l'Hyperbole BC , & l'Asymptote opposée OF , en sorte qu'elle soit perpendiculaire à l'axe BD .

PROPOSITION IV.

Si par un point d'une Hyperbole on tire parallèlement à l'axe déterminé, une ligne droite, qui coupe les deux Asymptotes, le Rectangle sous toute la ligne, & sa plus petite partie entre l'Hyperbole & l'Asymptote, sera égal au Carré de la moitié de l'axe déterminé.

43. Fig.

JE dis, que si par le point C , de l'Hyperbole EBC , dont le centre est O , l'axe déterminé est AB , l'indéterminé est BD , le conjugué est MN , le second est OK , sa moitié est BI , le Paramètre est BG , & les Asymptotes sont OF , OL ; on tire à l'axe déterminé AB , la parallèle CP , qui coupe les deux Asymptotes OF , OL , aux points P , Q ; le Rectangle $P C Q$, est égal au Carré $O B$.

Démonstration.

Car, si l'on tire par le point C , à l'axe BD , la perpendiculaire FL , on aura dans les Triangles semblables ODL , ONQ , cette Analogie, DLq , ONq ;

ODq , QNq ; & si à la place de DLq , on met la ^{41. Fig.} somme $FCL \dagger CDq$, qui luy est égale, par 5. 2. à la place de ODq , ou de CNq , la somme $PCQ \dagger QNq$, qui luy est égale, par 6. 2. & à la place du *Quarré* ON , le *Quarré* CD , qui luy est égal, à cause du parallélograme $ODCN$; on aura cette autre Analogie, $FCL \dagger CDq, CDq :: PCQ \dagger QNq, QNq$; & en divisant, on aura celle-cy, $FCL, CDq :: PCQ, QNq$; & si à la place des deux conséquens CDq, QNq , ou ONq, QNq , on met les deux BIq, OBq , qui sont en même raison, à cause des *Triangles* semblables OBI, ONQ , on aura cette dernière Analogie, $FCL, BIq :: PCQ, OBq$: où l'on voit, que puisque les deux premiers termes FCL, BIq , sont égaux, par la Proposition précédente, les deux derniers PCQ, OBq , sont égaux aussi. Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

Il suit de cette Proposition, que l'Axé déterminé AB , est à son Parametre BG , comme le *Rectangle* PCQ , au *Rectangle* FCL . Car, puisqu'il a esté ^{Démon-}stré dans cette Proposition, que le *Rectangle* PCQ , est égal au *Quarré* OB , & dans la précédente, que le *Rectangle* FCL , est égal au *Quarré* BI , on pourra faire cette Analogie, $OBq, BIq :: PCQ, FCL$; & si au lieu des deux premiers termes OBq, BIq , on met leurs quadruples ABq, OKq ; ou si à la place de ces deux *Quarrez*, on met les deux lignes AB, BG , qui sont en même raison, à cause des trois proportionnelles AB, OK, BG , par *Def. 16.* on aura cette autre Analogie, $AB, BG :: PCQ, FCL$. Ce qu'il falloit démontrer.

PROPOSITION V.

Si par un point d'une Hyperbole, on tire deux lignes quelconques terminées par les deux Asymptotes; & par un autre point de la même Hyperbole deux autres lignes terminées aussi par les deux Asymptotes, & parallèles aux deux précédentes; le Rectangle sous les deux premières sera égal au Rectangle sous les deux dernières.

44. Fig.

J'edis, que si par le point C, de l'Hyperbole BCF, on tire deux lignes quelconques CD, CE, terminées par les deux Asymptotes OM, ON, & par le point F, de la même Hyperbole BCF, deux autres lignes FG, FH, parallèles aux deux premières CD, CE, & terminées aussi par les deux Asymptotes OM, ON, le Rectangle DCE, sera égal au Rectangle GFH.

Démon-
stration.

Car, si l'on tire par les deux points C, F, à l'Axe indéterminé BR, les perpendiculaires KL, MN, on aura dans les Triangles semblables CLE, FNH, cette Analogie, CE, CL :: FH, FN; & dans les deux semblables DCK, GFM, on aura celle-cy, CD, CK :: FG, FM; & si on fait des Rectangles sous

$$\begin{array}{l} \text{CE, CL :: FH, FN,} \\ \text{CD, CK :: FG, FM,} \end{array}$$

$$\text{DCE, KCL :: GFH, MFN,}$$

les termes homologues correspondans dans chaque Analogie, on aura cette troisième Analogie, DCE,

KCL::GFH, MFN: où l'on voit que puisque *44. Fig.*
les conséquens KCL, MFN, sont égaux, par *Prop. I II.*
les antecédens DCE, GFH, sont aussi égaux. Ce
qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

COMME la démonstration sera toujours la même, quelque Angle que fassent les deux lignes CD, CE, ou FG, FH, il est évident que les Rectangles DCE, GFH, seront aussi égaux, lorsque les deux lignes CD, CE, feront une ligne droite, aussi-bien que les deux FG, FH.

PROPOSITION VI.

Si l'on tire comme l'on voudra, au dedans d'une Hyperbole, une ligne droite terminée par les deux Asymptotes, la partie de cette ligne droite, comprise entre une Asymptote & la partie de l'Hyperbole la plus proche, est égale à l'autre partie de la même ligne droite, comprise entre l'autre Asymptote, & l'autre partie de l'Hyperbole la plus proche.

CETTE Proposition est évidente par la troisième construction de l'Hyperbole, lorsque la ligne droite est perpendiculaire à l'Axe indéterminé, ou quand elle passe par le Sommet de cet Axe. Dans un autre cas la démonstration se fera en cette sorte.

Je dis donc, que si au dedans de l'Hyperbole CBF, *45. Fig.*
on tire une ligne droite quelconque EH, qui coupe
les deux Asymptotes OM, ON, aux points E, H, &

45. Fig.

l'Hyperbole CBF, aux points C, F; la partie CE, est égale à la partie FH.

*Demon-
stration.*

Car, si l'on tire par les deux points C, F, à l'Axe indéterminé BR, les perpendiculaires KL, MN, on aura dans les Triangles semblables ECK, EFM, cette Analogie, CE, CK :: FE, FM; & dans les deux semblables HFN, HCL, celle-cy, CH, CL :: FH, FN; & si on fait des Rectangles sous les termes

$$CE, CK :: FE, FM,$$

$$CH, CL :: FH, FN,$$

$$ECH KCL :: EFN, MFN,$$

homologues correspondans dans ces deux Analogies, on aura cette troisième Analogie, ECH, KCL :: EFH, MFN: où l'on voit, que puisque les conséquens KCL, MFN, sont égaux par *Prop. III.* les antécédens ECH, EFH, sont égaux aussi. C'est pourquoy on aura cette Analogie, EC, EF :: FH, CH; & en divisant, on aura celle-cy, EC, CF :: FH, CF, dont les antécédens EC, FH, sont égaux, à cause des deux conséquens égaux. Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE I.

Il suit de cette Proposition, que si on tire à la ligne EH, une parallèle, qui rencontre l'Hyperbole CBF, & les Asymptotes OM, ON, la partie de cette parallèle comprise entre une Asymptote & la partie de l'Hyperbole la plus proche, sera égale à l'autre partie de la même parallèle, comprise entre l'autre Asymptote & l'autre partie de l'Hyperbole la plus proche. D'où il est aisé de conclure, que quand cette parallèle comme QS, touchera l'Hyperbole, elle sera divisée en deux également au point d'attouchement P, étant terminée par les Asymptotes OM, ON.

ON tire de ce Theoreme une description aisée de l'Hyperbole par un point donné entre deux Asymptotes données. Comme si on donne le point C, entre les Asymptotes données OM, ON, en tirant comme l'on voudra, par le point donné C, la droite EH, & en faisant HF, égale à CE, le point F, sera de l'Hyperbole.

COROLLAIRE III.

ENFIN, il s'ensuit que le Rectangle EFH, ou HCE, est égal au Quarré de la Touchante PQ, qui est parallele à l'Ordonnée CF: car, comme nous avons remarqué au Coroll. 1. que la Touchante QS, est divisée en deux également par le point touchant P, il faut par la Proposition precedente, que le Rectangle EFH, soit égal au Rectangle QPS, c'est à dire, au Quarré PQ.

PROPOSITION VII.

Si par un point pris à discretion dans chacune de deux Hyperboles opposées, on tire à volonté deux lignes paralleles entre elles & terminées par l'une des deux Asymptotes, & deux autres lignes quelconques paralleles aussi entre elles, & terminées par l'autre Asymptote; le Rectangle sous les deux lignes d'une Hyperbole sera égal au Rectangle sous les deux lignes de l'autre Hyperbole opposée.

JE dis, que si par les points C, F, pris dans chacune 46. Fig. des deux Hyperboles opposées BC, AF, on tire

46. Fig.

les deux paralleles CD, FH, terminées par l'Asymptote HK, & les deux paralleles CE, FG, terminées par l'autre Asymptote LM, le Rectangle DCE, sera égal au Rectangle GFH.

*Demon-
stration.*

Car, si l'on tire des deux points C, F, à l'Axe AB, les perpendiculaires KL, MN, on aura dans les Triangles semblables DCK, FHN, cette Analogie, CD, CK :: FH, FN; & dans les deux semblables CLE, FGM, celle-cy, CE, CL :: FG, FM; & si on fait des Rectangles sous les termes homologues correspondans dans chaque Analogie,

$$CD, CK :: FH, FN,$$

$$CE, CL :: FG, FM,$$

$$\underline{DCE, KCL :: GFH, MFN},$$

on aura cette troisième Analogie, DCE, KCL :: GFH, MFN: où l'on voit, que puisque les consequens KCL, MFN, sont égaux, chacun étant égal au Carré BI, de la moitié du second Axe, par *Prop. III.* les antecedens DCE, GFH, sont égaux aussi. Ce qu'il falloit démontrer.

*Autre
demon-
stration.*

Ou bien, si l'on tire par les deux points C, F, à l'Axe AB, les paralleles CP, FS, ou aura dans les Triangles semblables DCP, FTH, cette Analogie, CD, CP :: FH, FT; & dans les deux semblables GFS, CEQ, celle-cy, CE, CQ :: FG, FS; & si on fait des Rectangles sous les termes homologues

$$CD, CP :: FH, FT,$$

$$CE, CQ :: FG, FS,$$

$$\underline{DCE, PCQ :: GFH, SFT}.$$

correspondans dans chaque Analogie, on aura cette troisième Analogie, DCE, PCQ :: GFH, SFT: où l'on

l'on voit que puisque les conséquens PCQ , SFT , ^{46. Fig.} sont égaux, chacun étant égal au Carré OB , de la moitié de l'Axe déterminé AB , par *Prop. IV*, les antécédens DCE , GFH , sont égaux aussi. Ce qu'il falloit démontrer.

S C O L I E.

IL peut arriver que le point G , conviendra avec le point E , en sorte que les deux lignes CE , FG , ne feront qu'une seule ligne, sçavoir la ligne CF ; & alors on démontrera de la même façon, que le Rectangle DCE , est égal au Rectangle EFH , pourvu que les lignes CD , FH , demeurent toujours parallèles entre elles, & qu'elles coupent l'Asymptote OD .

C O R O L L A I R E I.

DANS ce cas il peut arriver que le point D , conviendra avec le point T , auquel cas le point H , conviendra aussi avec le même point T ; alors le Rectangle DCE , se changera au Rectangle TCE , & le Rectangle EFH , au Rectangle EFT : & il sera permis de conclure, que le Rectangle TCE , sera égal au Rectangle EFT , & que par conséquent la partie CE , est égale à la partie TF . Car à cause des deux Rectangles égaux TCE , EFT , on aura cette Analogie, $CE, EF::FT, CT$; & en composant, on aura celle-cy, $CE, CF::TF, CF$; & par conséquent $CE \sim TF$. Ainsi vous voyez, que si on tire une ligne droite quelconque CF , qui coupe les deux Hyperboles opposées BC , AF , aux points C , F , & par conséquent les deux Asymptotes OD , OE , aux points T , E , la partie CE , sera égale à la partie TF .

46. Fig.

IL peut aussi arriver, que les deux lignes CD , CE , ne feroient qu'une même ligne droite, auquel cas les deux FH , FG , qui leur sont parallèles, ne feroient aussi qu'une ligne droite, & le Rectangle DCE , sera toujours égal au Rectangle GFH . Ainsi, vous voyez, que si au dedans des deux Hyperboles opposées BC , AF , on tire deux lignes quelconques parallèles entre elles, & terminées par les deux Asymptotes OD , OE , comme DE , GH , le Rectangle DCE , sera égal au Rectangle GFH .

49. Fig.

DANS ce cas, il peut arriver que les deux points D , E , conviendront avec le centre O , de l'Hyperbole, auquel cas le Rectangle DCE , se changera au Carré du demi-Diamètre OC , lequel par conséquent sera égal au Rectangle GFH . Ainsi vous voyez, que si à un demi-Diamètre déterminé de l'Hyperbole BCI , comme OC , on tire une parallèle quelconque FG , qui coupe les deux Asymptotes OG , OH , aux points G , H , & l'Hyperbole opposée AF , au point F , le Rectangle GFH , sera égal au Carré du demi-Diamètre déterminé OC .



PROPOSITION VIII.

Tirer par un point donné sur une Hyperbole donnée, à un Diametre indéterminé donné, une Ordonnée, & trouver le Diametre conjugué au Diametre donné.

POUR tirer par le point donné I , de l'Hyperbole donnée KCI , une Ordonnée au Diametre donné CN , tirez par le Sommet C , du Diametre donné CN , la Touchante EG , par *Prop. I.* & à cette Touchante EG , par le point donné I , la parallèle KI , qui sera une Ordonnée au Diametre donné CN , par *Def. 11.*

Pour tirer un Diametre conjugué au même Diametre donné CN , tirez par le centre O , de l'Hyperbole KCI , parallèlement à la Touchante EG , le Diametre indéfini PQ , qui sera conjugué au Diametre donné CN , par *Def. 13.*

SCOLIE.

IL est évident que l'Ordonnée KI , est divisée en deux également au point N , par son Diametre CN , à cause des deux lignes égales CE , CG , par *Coroll. 1. Prop. VI.* & par conséquent des deux égales LN , MN , & des deux égales KL , IM , par *Prop. VI.*

Il est aussi évident, que l'Axe conjugué PQ , divise son Ordonnée IF , qui doit être parallèle au Diametre correspondant CN , par *Def. 14.* en deux également au point Q , à cause des deux lignes égales IG , FH , par le *Coroll. 1.* de la Proposition précédente,


Qij

49. Fig.

& des deux égales GQ , HQ , chacune étant égale au demi-Diametre déterminé OC , parce que ce demi diametre OC , divisant en deux également la base EG , du Triangle EOG , par *Prop VI.* le côté GH , du Triangle GEH , est double du côté OC , du Triangle semblable CEO ; ce qui fait que ce côté étant égal au côté QG , du Parallelograme $OCGQ$, ce même côté QG , est aussi égal à la ligne QH .

COROLLAIRE.

AINSY vous voyez, que le Diametre d'une Hyperbole divise ses Ordonnées en deux également, comme dans la Parabole & dans l'Ellipse. D'où l'on tire une methode aisée, pour trouver le centre & l'Axe d'une Hyperbole donnée, sçavoir en tirant au dedans de cette Hyperbole deux paralleles quelconques, & en joignant leurs points de milieu par une ligne droite, qui sera leur Diametre: & pareillement en tirant d'un autre côté, toujours au dedans de l'Hyperbole, deux autres paralleles, & en tirant par leurs points de milieu une ligne droite, qui sera leur Diametre, & rencontrera le premier au centre de l'Hyperbole; par le moyen duquel on trouvera l'Axe, en décrivant du centre de l'Hyperbole un arc de cercle au dedans de la même Hyperbole, & en divisant cec arc en deux également par une ligne droite tirée du centre, laquelle sera l'Axe qu'on cherche.



PROPOSITION IX.

Si par un point d'une Hyperbole on tire jusqu'à ses Asymptotes, deux parallèles aux mêmes Asymptotes, & par un autre point aussi jusqu'aux Asymptotes; deux parallèles aux mêmes Asymptotes; le Parallelograme qui se formera par les deux premières parallèles, sera égal à celui qui se formera par les deux dernières,

JE dis, que si par les deux points C, D, de l'Hyperbole CBD, on tire aux deux Asymptotes OF, OG, les parallèles CE, CF, DG, DH, terminées par les mêmes Asymptotes OF, OG, le Parallelograme OECF, sera égal au Parallelograme OGDH. 59. Fig.

Car, si l'on tire les deux Diagonales OC, OD, on connoîtra aisément que les deux Triangles ODG, OCF, sont égaux, à cause de l'Angle G, égal à l'Angle F, parce que les deux lignes, OG, DG, sont parallèles aux deux CF, OF, & des deux côtes OG, DG, reciproquement proportionnels aux deux CF, OF, parce que le Rectangle OFC, est égal au Rectangle OGD, par Prop. V. C'est pourquoy les doubles de ces Triangles égaux OCF, ODG, savoir les Parallelogrames OECF, OGDH, seront égaux aussi. Ce qu'il falloit démontrer. Démonstration.

COROLLAIRE.

IL suit de cette Proposition, que si par les mêmes points C, D, on tire les deux Touchantes IK, LM,

Q iij

50. Fig. les deux Triangles OLM, OIK, seront aussi égaux, parce qu'ils sont égaux aux Parallelogrames égaux OGDH, OECF, à cause de la base OL, double de la base OG, & de la base OI, double de la base OF, les deux Touchantes IK, LM, étant divisées en deux également aux points d'attouchement C, D, par Prop. I. ou par Prop. VI.

PROPOSITION X.

Le Carré d'une Ordonnée à un Diamètre indéterminé, terminée par ce Diamètre & par l'Hyperbole, est au Rectangle sous la partie du même Diamètre, entre son Sommet & l'Ordonnée, & la somme de cette partie & du Diamètre déterminé correspondant, comme le Carré de la Touchante terminée par le Sommet & l'Asymptote, au Carré du demi-Diamètre déterminé.

51. Fig. JE dis, que le Carré de l'Ordonnée CD, au Diamètre indéterminé EK, dont HE, est le Diamètre déterminé, est au Rectangle HDE, comme le Carré de la Touchante EF, terminée par le Sommet E, & l'Asymptote OG, au Carré du demi-Diamètre déterminé OE.

Démonstration. Car, si on prolonge l'Ordonnée CD, jusqu'à ce qu'elle coupe les Asymptotes OG, OI, aux points G, I, & l'Hyperbole LBH, encore au point H, les deux lignes DC, DH, seront égales, par Prop. VIII. & parce que les deux CG, HI, sont aussi égales, par

Coroll. 1. Prop. VI. les deux DG , DI , seront aussi *11. Fig.* égales; & parce que le Rectangle GHI , ou ICG , ou HGC , est égal au Quarré EF , par *Coroll. 3. Prop. VI.* & que le Quarré DG , est égal à $CDq + HGC$, par 6. 2. on aura $DGq - EFq \sim CDq$.

Dans les Triangles semblables OEF , ODG , on a cette Analogie, $DGq, EFq :: ODq, OEq$; c'est pourquoy en divisant on aura celle-cy, $DGq - EFq, EFq :: ODq - OEq, OEq$; & si au lieu du premier terme $DGq - EFq$, on met le Quarré DC , qui luy a été démontré égal, & à la place du troisiéme $ODq - OEq$, le Rectangle HDE , qui luy est égal, par 6. 2. & qu'on permute, on aura cette autre Analogie, $CDq, HDE :: EFq, OEq$. Ce qu'il falloit démontrer,

COROLLAIRE.

ON démontrera de la même façon, que le Quarré d'une autre Ordonnée au même Diametre indéterminé EK , comme KL , est au Rectangle HKE , comme le Quarré de la même Touchante EF , au Quarré du même demi-Diametre OE . D'où il est aisé de conclure, que le Quarré de l'Ordonnée KL , est au Quarré de l'Ordonnée CD , comme le Rectangle HKE , au Rectangle HDE .



PROPOSITION XI.

Trouver le Parametre d'un Diametre indeterminé donné d'une Hyperbole donnée, dont le Diametre déterminé correspondant est aussi donné.

43. Fig.

POUR trouver le Parametre du Diametre indeterminé BD , de l'Hyperbole EBG , dont le Diametre déterminé correspondant est AB , tirez par le Sommet B , la Touchante indéfinie BG , par *Prop. I.* & ayant tiré au dedans de l'Hyperbole EBG , à la Touchante BG , une parallele quelconque CD , cherchez aux deux lignes AD , CD , une troisième proportionnelle DR , & tirez par le point A , à la ligne BR , la parallele AG , qui donnera sur la Touchante BG , le Parametre BG , qu'on cherche.

Demonstration.

Car, dans les Triangles semblables ABG , BDR , on a cette Analogie, $BD, DR :: AB, BG$; & en donnant aux deux premiers termes BD, DR , la hauteur commune AD , on aura celle-cy, $ADB, ADR :: AB, BG$; & si à la place du second terme ADR , on met le Carré CD , qui luy est égal, à cause de trois proportionnelles AD, CD, DR , par la construction, on aura cette autre Analogie, $ADB, CDq :: AB, BG$. D'où il suit par *Def 15.* que la ligne BG , est le Parametre qu'on cherche. Ce qu'il falloit faire & démontrer.

La raison pour laquelle nous avons tiré à volonté au Diametre indeterminé BD , l'Ordonnée CD , est parce

parce que par la Proposition precedente, les Quarrez ^{43. Fig.} de toutes les Ordonnées CD, sont proportionnels à leurs Rectangles correspondans ADB.

Nous pourrions icy demontrer que le Parametre BG, est le plus petit de tous, quand il appartient à un Axe; mais comme cette consideration n'est pas de grande consequence, nous n'en parlerons pas davantage.

S C O L I E.

Parce que nous avons cette Analogie, AB, BG :: *st. Eg.* ADB, CDq, si OK, est le second Diametre de AB, sçavoir une ligne moyenne proportionnelle entre le Diametre AB, & son Parametre BG, on pourra mettre à la place des deux premiers termes AB, BG, les deux ABq, OKq; & alors on aura cette autre Analogie, ABq, OKq :: ADB, CDq; & si à la place des deux derniers termes ADB, CDq, on met le Quarré du demi-Diametre OB, & le Quarré de la Touchante BI, qui sont en même raison, par la Proposition precedente, on aura cette autre Analogie, ABq, OKq :: OBq, BIq, & par consequent celle-cy, AB, OK :: OB, BI: où l'on voit, que puisque l'antecedent OB, est la moitié de l'antecedent AB, aussi le consequent BI, est la moitié du consequent OK, ou du second Diametre.

C O R O L L A I R E I.

A I N S I, vous voyez que toute la Touchante SI, terminée par les deux Asymptotes OF, OL, est égale au second Diametre du Diametre déterminé AB, c'est-à-dire, moyenne proportionnelle entre le Diametre déterminé AB, & son Parametre BG; c'est pourquoy,

R

51. Fig.

si au Diametre déterminé AB , & à la Touchante correspondante SI , terminée par les deux Asymptotes OF , OL , on trouve une troisième proportionnelle, on aura le Parametre BG , qu'on cherche.

COROLLAIRE II.

Tout au contraire, quand on aura le Parametre BG , du Diametre déterminé AB , on pourra trouver les Asymptotes OF , OL , en tirant par le Sommet B , la Touchante indéfinie SI , par *Prop. I.* & en prenant sur cette Touchante SI , les deux lignes BI , BS , égales chacune à la moitié du second Diametre OK , ou d'une moyenne proportionnelle entre le Diametre déterminé AB , & son Parametre BG , pour tirer par les deux points S , I , du centre O , de l'Hyperbole EBG , les deux Asymptotes OF , OL , lesquelles feront au même centre O , un Angle droit, lorsque le Diametre AB , sera égal à son Parametre BG , & par conséquent à son second Diametre OK , parce que dans ce cas les trois lignes OB , BI , BS , seront égales entre elles; ce qui rend l'Angle SOI , égal à la somme des deux S , I , & par conséquent droit,



PROPOSITION XII.

Le Carré d'une Ordonnée à un Diametre indéterminé d'une Hyperbole, est égal à la somme du Rectangle sous le Parametre & la partie du même Diametre, comprise entre l'Ordonnée & l'Hyperbole, & d'un Rectangle semblable & semblablement posé à la Figure du Diametre déterminé correspondant, & ayant pour base la même partie.

SUPPOSONS premierement, que le Diametre ^{52. Fig.} indéterminé BC, soit un Axe, en sorte que AB, soit l'Axe déterminé de l'Hyperbole BD; si l'on fait de l'Axe AB, & de son Parametre BG, le Rectangle ABGN, qui sera la Figure de l'Axe AB, & qu'on prolonge une Ordonnée quelconque à l'Axe BC, comme CD, jusqu'à ce qu'elle coupe la Diagonale AG, en quelque point, comme en K, & le côté GN, en L, & que par le point K, on tire à l'Axe BC, la parallèle KM, qui rencontre le Parametre BG, prolongé en M, pour avoir le Rectangle KML, semblable & semblablement posé au Rectangle, ou à la Figure ABGN, par 24. 6.

Je dis, que le Carré de cette Ordonnée CD, est égal au Rectangle BCKM, ou à la somme du Rectangle CBGL, sous le Parametre BG, & la partie interceptée BC, & du Rectangle KML, semblable & semblablement posé à la Figure ABGN, & ayant pour base la ligne KM, égale à la même partie BC.

52. Fig.
Démon-
stration.

Car, puisque par la generation, on a cette Analogie, $AB, BG :: ACB, CDq$; si au lieu des deux premiers termes AB, BG , on met les deux AC, CK , qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables ABG, ACK , on aura cette autre Analogie, $AC, CK :: ACB, CDq$; & si aux deux premiers termes AC, CK , on donne la hauteur commune BC , on aura cette dernière Analogie, $ACB, BCK :: ACB, CDq$: où l'on voit, que puisque les antecédens sont égaux, les conséquens BCK, CDq , sont égaux aussi. Ce qu'il falloit démontrer.

53. Fig.

La démonstration sera la même, bien que le Diamètre BC , ne soit pas un Axe, pourvu que l'on change un peu la construction, parce que l'Ordonnée CD , n'étant plus perpendiculaire à son Diamètre BC , au lieu de la prolonger, comme il a été fait auparavant, il faut tirer du point C , au Diamètre BC , la perpendiculaire CD , & faire un raisonnement semblable au précédent.

SCOLIE.

LE Carré de l'Ordonnée CD , est égal dans la Parabole au Rectangle $CBGL$; & comme il est plus grand dans l'Hyperbole, puisqu'il a été démontré égal au Rectangle $CBMK$, cela a donné le nom d'Hyperbole à la courbe BD .

Si l'on suppose $AB \propto d$, $BG \propto p$, $BC \propto x$, & $CD \propto y$, on aura $AC \propto d + x$, $MG \propto \frac{p}{x}$, à cause des Triangles semblables ABG, KMG ; & si l'on ajoute $MG \propto \frac{p}{x}$, à $BG \propto p$, on aura $BM \propto p + \frac{p}{x}$, laquelle étant multipliée par $BC \propto x$, on aura $px + p$, pour le Rectangle $CBMK$, ou pour le Carré yy , de l'Ordonnée

CD $\propto y$; ainsi on a cette Equation constitutive, 53. Fig.
 $yy \propto px + \frac{p^2}{4}$, telle que nous l'avons trouvée dans la
 propriété generale.

PROPOSITION XIII.

Si par un point d'un Diametre indeterminé d'une Hyperbole, on tire au dedans de la même Hyperbole, une ligne parallele au Diametre conjugué du Diametre déterminé correspondant, & par un point de cette parallele pris au dedans de l'Hyperbole, au même Diametre, une autre parallele, qui rencontre les deux Hyperboles opposées ; le Rectangle sous les parties de la premiere parallele, terminées par l'Hyperbole & la seconde parallele, sera au Rectangle sous la seconde parallele & sa partie terminée par la même Hyperbole & la premiere parallele, comme le Parametre au Diametre déterminé.

JE dis, que si par le point C, du Diametre indeterminé BC, del'Hyperbole EBD, dont le centre 54. Fig.
 est O, on tire la droite ED, parallele au Diametre LM, qui est conjugué au Diametre indeterminé BC, dont le Diametre déterminé correspondant est AB, & par le point F, de cette parallele DE, pris au dedans de l'Hyperbole EBD, au Diametre AB, une autre parallele FH, qui rencontre les deux Hyperboles opposées AH, BI, aux points H, I ; le Rectangle EFD, sera au Rectangle HFI, comme le Parametre BG, à son Diametre déterminé AB.

R. iij

34. Fig.
Démon-
stration.

Car, si l'on tire des deux points H, I, à l'Ordonnée DE, les paralleles HP, QI, elles seront aussi paralleles au Diametre conjugué LM, par les *Def. 11. 13.* & les deux lignes AP, BQ, seront égales, à cause des deux égales OP, OQ, & des deux égales OA, OB; & à cause de $ACB \sim OCq - OBq$, & de $AQB \sim OQq - OBq$, par 6. 2. on aura $ACB - AQB \sim OCq - OQq$; & encore à cause de $OCq - OQq \sim PCQ$, par 6. 2. on aura $ACB - AQB \sim PCQ$.

Puisque par *Prop. X.* on a cette Analogie, $CDq, QIq :: ACB, AQB$, ou $CDq, CFq :: ACB, AQB$, en divisant, on aura celle-cy, $CDq - CFq, CDq :: ACB - AQB, ACB$; & si au lieu du premier terme $CDq - CFq$, on met le Rectangle EFD, quiluy est égal, par 5. 2. & à la place du troisiéme $ACB - AQB$, le Rectangle PCQ, ou HFI, quiluy a été démontré égal, & qu'on permute, on aura cette autre Analogie, $EFD, HFI :: CDq, ACB$; & si au lieu des deux derniers termes CDq, ACB , on met les deux BG, AB, qui sont en même raison, par *Prop. XI.* on aura cette dernière Analogie, $EFD, HFI :: BG, AB$. Ce qu'il falloit démontrer.

35. Fig.

Si au lieu de prendre le point F, au dedans de l'Hyperbole EBD, on la prend au dehors, néanmoins toujours sur l'Ordonnée ED, prolongée, le Theoreme sera encore veritable: c'est-à-dire, que le Rectangle EFD, sera au Rectangle HFI, comme le Parametre BG, à son Diametre déterminé AB, dont la démonstration est si peu différente de la précédente, que ce seroit dire deux fois la même chose que d'en parler davantage.

PROPOSITION XIV.

Si on coupe un Cone par un Plan, qui étant perpendiculaire à la base du Triangle de l'Axe, coupe en dedans un côté du même Triangle, & en dehors l'autre côté prolongé au dessus de la pointe du Cone, la Section sera une Hyperbole.


JE dis, que si le Cone $ABCD$, est coupé par un ^{16. Fig.} Plan, lequel étant perpendiculaire à la base AC , du Triangle de l'Axe ABC , en sorte que la Section LE , du Plan & du Triangle de l'Axe, coupe en dedans un côté BC , en L , & en dehors l'autre côté AB , prolongé au dessus de la pointe du Cone en N , la Section MLD , du Cone & du Plan, sera une Hyperbole, sçavoir une figure où les Quarréz des Ordonnées à un Diametre indéterminé, sont proportionnels aux Rectangles sous les parties correspondantes de ce Diametre, comprises entre le Sommet & les Ordonnées, & la somme de ces mêmes parties, & du Diametre déterminé correspondant.

Pour la demonstration, coupez le Cone $ABCD$, ^{Demon-} par un Plan, qui passant entre les extrémités L , E , ^{stration.} du Diametre de Section LE , soit parallèle à la base ABC , du Cone $ABCD$, pour avoir par cette Section le Cercle $FIGK$, dont le Diametre FG , étant la commune Section de ce Plan & du Triangle de l'Axe ABC , sera parallèle au Diametre AC , de la base ADC , du Cone $ABCD$. Tirez encore par les points opposez I , K , ou la Section MLD , se trouve coupée

36. Fig. par le Cercle FIGK, la droite IK, qui sera divisée à Angles droits & en deux également par le Diametre LE, au point H, qui est la Section des deux lignes FG, LE. D'où il suit que la ligne HK, est une Ordonnée au Diametre indéterminé LE, qui sera un Axe; & parce que la ligne DM, est aussi divisée à Angles droits & en deux également au point E, par le même Axe LE, il suit que la ligne DE, est aussi une Ordonnée à l'Axe LE.

Puisque les Quarrez des Ordonnées DE, KH, sont dans la raison des Rectangles AEC, FHG, puisqu'ils leur sont égaux, par 35. 3. & que la raison des mêmes Rectangles AEC, FHG, est composée de celle de leurs bases CE, GH, & de celle de leurs hauteurs AE, FH, par 23. 6. il suit que la raison des mêmes Quarrez DE, KH, est aussi composée de celle des lignes CE, GH, ou des lignes LE, LH, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables LCE, LGH, & de celle des lignes AE, FH, ou des lignes NE, NH, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables NAE, NFH, & que par conséquent la raison des mêmes Quarrez DE, KH, est égale à celle des Rectangles correspondans NEL, NHL, qui sont aussi dans la raison composée de celle des lignes LE, LH, & de celle des lignes NE, NH, par 23. 6. Ce qu'il falloit démontrer.

La ligne LN, est l'Axe déterminé de l'Hyperbole MLD, à l'égard du Diametre indéterminé LE, parce qu'il se trouve terminé en N, par l'Hyperbole opposée qui se forme par la Section du Cone opposé, & du même Plan qui a formé l'Hyperbole MLN, &c.



PROBLEME I.

Trouver par le calcul les Racines d'une
Equation de deux & de trois
dimensions.

LA Methode dont je me sers pour trouver en Nombres les Racines d'une Equation de deux & de trois dimensions, est fondée sur ce Theoreme general, qui nous apprend que la difference de deux Puissances quelconques regulieres & homogenes, est divisible par la difference de leurs côtez.

Cela estant suppose, proposons en premier lieu cette Equation quarrée $xx + ax \approx bb$, dont les deux Racines sont representées par la lettre x . Il est evident que ces deux Racines pourront estre facilement connues, si on reduit l'Equation proposée $xx + ax \approx bb$, à une d'une seule dimension. Pour cette fin, divisons-la par la quantité inconnue x , pour avoir cette autre Equation $x + a \approx \frac{bb}{x}$, laquelle seroit effectivement d'une seule dimension, si la quantité inconnue x pouvoit diviser le dernier terme bb ; & afin que cette division soit possible, mettons à la place de ce dernier terme bb , la difference de deux quarrés indeterminez, comme $yy - zz$, & pour la quantité inconnue x , la difference $y - z$, des côtez de ces deux quarrés, & au lieu de l'Equation precedente, $x + a \approx \frac{bb}{x}$, on aura celle-ci, $y - z + a \approx y + z$, &c.

Comme toutes les autres Equations de deux dimen-

sions se peuvent reduire à une de mesme forme que la proposée $xx \mp ax \sim bb$; on voit aisément que la Methode precedente est generale, & que le seul Theoreme precedent suffit pour tous les cas qui peuvent arriver. Neantmoins on peut se servir plus facilement pour les autres Equations de cet autre Theoreme, par lequel Nous aprenons que la difference de deux Puissances quelconques regulieres & homogenes, est divisible par la somme de leurs côtez, lorsque l'exposant commun à ces deux Puissances est un Nombre pair : Ou bien de celui cy, par lequel nous sçavons que la somme de deux Puissances quelconques regulieres & homogenes est divisible par la somme de leurs côtez, lorsque l'exposant commun à ces deux Puissances est un Nombre impair, &c.

Proposons en second lieu cette Equation cubique $xxx \mp aax \sim bbb$, dont chacune des trois Racines est exprimée par la lettre x . Il est evident que ces trois Racines se pourroient aisément connoître, si l'Equation proposée $xxx \mp aax \sim bbb$, n'avoit que deux dimensions. Et afin que cela arrive, divisons-la par la quantité inconnüe x , pour avoir cette autre Equation, $xx \mp aa \sim \frac{bbb}{x}$, qui seroit effectivement de deux dimensions, si le dernier terme $\frac{bbb}{x}$ estoit divisible par x . C'est pourquoy en se servant du premier Theoreme, on mettra $yyy - zzz$ à la place de bbb , & $y - z$ à la place de x , pour avoir cette autre Equation, $yy - zyz \mp zzz \mp aa \sim yy \mp yz \mp zz$, &c.

Ceux qui entendront la nature des Equations, n'auront pas de peine à trouver la demonstration des trois Theoremes precedens.

PROBLEME II.

Nouvelle Methode pour ce qu'on appelle
communément *Les Plus Grands &*
Les Plus Petits.

POUR résoudre un Probleme touchant Les Plus Grands & Les Plus Petits, on égalera la quantité qu'on veut rendre la plus grande ou la plus petite de toutes, à quelque autre quantité homogene indeterminée. Après quoy on trouvera par le calcul une des Racines de l'Equation, & dans la valeur de cette Racine on fera évanouir l'Asymmetrie qui s'y rencontrera, en l'égalant à 0, pour trouver dans cette dernière Equation la valeur de la quantité indeterminée, & par consequent celle de la Racine precedente, qui résoudra le cas du Plus Grand ou du Plus Petit.

Si l'on ne peut pas supputer une des Racines de l'Equation, pour avoir trop de dimensions, on la reduira en deux Lieux, & supposant que ces deux Lieux ou Lignes Locales se touchent, comme si on vouloit faire la determination du Probleme, on trouvera aisément la valeur de la quantité inconnue, qui résoudra le cas du Plus Grand, ou du Plus Petit.

Nous pourrions expliquer cette Methode plus au long par quelques exemples ; mais ce n'est pas icy le lieu d'en dire davantage.

PROBLEME III.

Connoître les Cas infinis, auxquels un Probleme solide peut estre Plan.

Si on divise l'Equation constitutive du Probleme solide par un Binome composé de la quantité inconnue & d'une partie de l'Homogene de comparaison, & qu'il ne reste rien, ou que s'il reste quelque chose, on égale ce reste à 0, pour le faire évanouir, afin que la division soit possible; on aura le cas du Probleme plan. Et comme l'on peut choisir une infinité de Diviseurs, on voit que par cette Methode on peut découvrir generalement parlant, une infinité de cas du Probleme plan.

L'Equation suivante, $xxx - 3aax + 2aaa - abb \approx 0$, appartient à un Probleme solide, & il est proposé de trouver les cas infinis auxquels il peut estre plan. On voit déjà que si on égale à 0, l'Homogene de comparaison $2aaa - abb \approx 0$, on trouvera $bb \approx 2aa$, auquel cas le Probleme doit estre plan. Mais pour venir à nostre Methode generale, divisez l'Equation proposée $xxx - 3aax + 2aaa - abb \approx 0$, par $x - a$. Et comme il reste $-abb$, égalez ce reste à 0, en supposant que la quantité b soit de nulle valeur, & non pas la quantité a , parce que cette quantité a se rencontrant dans les autres termes de l'Equation, elle les feroit tous évanouir, & donneroit un cas impossible. Ainsi lorsque la quantité b n'aura aucune valeur, on conclura que dans ce cas le Probleme sera plan.

Pareillement si on divise la mesme Equation, $xxx - 3aax + 2aaa - abb \approx 0$, par $x - \frac{1}{2}a$, & qu'on égale à

o, le reste $\frac{1}{4}$ aaa-abb, on trouvera bb $\propto \frac{1}{4}$ aa, pour un troisieme cas du Probleme plan.

On peut aussi connoistre par la resolution Geometrique d'un Probleme solide, les cas ausquels il peut estre plan; mais ce n'est pas icy le lieu d'en parler davantage. Cette Methode est expliquée par plusieurs exemples dans nostre grand Traité d'Algebre.

PROBLEME IV.

Trouver quatre Nombres, tels que leur somme soit égale à un Nombre donné, & que la difference de deux quelconques soit un Nombre quarré.

BIEN que ce Probleme ne soit pas difficile, neanmoins parce qu'il a esté proposé à Messieurs de l'Academie Royale des Sciences, & qu'ils ont bien voulu prendre la peine d'y travailler; j'ay bien voulu aussi expliquer icy les Methodes differentes, dont je me sers pour le résoudre.

On propose de trouver quatre Nombres,

lx

ly

lz

lw

dont la somme $lx+ly+lz+lw$, soit égale au Nombre donné lc $\propto 5$, & tels que leurs six differences,

ly...lx

lz...lx

lw...lx

lz...ly

$l\omega \dots ly$
 $l\omega \dots lz$

soient des Nombres quarréz.

Si on égale la premiere difference $ly \dots lx$, au quarré pp , la deuxiême $lz \dots lx$, au quarré qq , & la troisiême $l\omega \dots lx$, au quarré rr ; on aura $ly \propto lx + pp$, $lz \propto lx + qq$, & $l\omega \propto lx + rr$. Ainsi les quatre Nombres qu'on cherche, seront

 lx
 $lx + pp$
 $lx + qq$
 $lx + rr$

dont la somme $4lx + pp + qq + rr$ estant égalee au Nombre donné lc , on trouvera $lx \propto lc - \frac{pp+qq+rr}{4}$, & les quatre Nombres seront

$$\frac{1}{4}lc - \frac{pp+qq+rr}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc + \frac{pp-qq-rr}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc - \frac{pp+qq-rr}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc - \frac{pp+qq+rr}{4}$$

& les trois dernieres differences se changeront en ces trois autres

 $pp-qq$
 $pp-rr$
 $qq-rr$

qui font connoistre que les trois quarréz pp , qq , rr , doivent estre tels, que la difference de deux quelconques soit un Nombre quarré; ce qui arrivera, si les costez p , q , r , sont tels, que la somme & la difference de deux quelconques soit un Nombre quarré. Il s'agit donc icy de trouver trois Nombres, tels que la somme & la difference de deux

quelconques, soit un Nombre quarré, pour les trois costez p, q, r . Nous avons autrefois publié la solution de ce Probleme, & nous avons donné ces trois Nombres indefinis,

$$a^{10} + 21a^6b^4 - ba^{11}b^8 - 6a^8b^{11} + 21a^4b^{16} + b^{10}.$$

$$10a^2b^{18} - 24a^6b^4 + 60a^{10}b^{10} - 24a^{14}b^4 + 10a^{18}bb.$$

$$6a^2b^{18} + 24a^6b^{14} - 92a^{10}b^{10} + 24a^{14}b^6 + 6a^{18}bb.$$

C'est-pourquoy si l'on met ces trois Nombres indefinis à la place des trois costez p, q, r , la Question sera resoluë indefiniment. Mais pour éviter un long calcul, supposez $a \propto 2$, & $b \propto 1$, ou $a \propto 1$, & $b \propto 2$, & vous aurez

$$\begin{array}{r} 2599057 \\ 2288168 \\ 1873432 \end{array}$$

pour les trois costez p, q, r . Si donc on suppose

$$\begin{array}{r} p = 2599057 \\ q = 2288168 \\ r = 1873432 \end{array}$$

& par consequent

$$\begin{array}{r} pp = 5755474489249 \\ qq = 5235712796224 \\ rr = 3509747458624 \end{array}$$

les quatre Nombres qu'on cherche, seront

$$\begin{array}{r} \frac{1}{4}lc - 14500914744097 \\ \frac{1}{4}lc + 8120961212899 \\ \frac{1}{4}lc + 6441216440799 \\ \frac{1}{4}lc - 461344909601 \end{array}$$

Mais parce que le Nombre donné lc ou s , est trop petit, changeons ces quatre Nombres trouvez, en ces quatre autres,

$$\begin{array}{r}
 \frac{1}{4}lc - \frac{14500934744097}{4 \text{ m m}} \\
 \frac{1}{4}lc + \frac{8520963212899}{4 \text{ m m}} \\
 \frac{1}{4}lc + \frac{6441916440799}{4 \text{ m m}} \\
 \frac{1}{4}lc - \frac{461944909601}{4 \text{ m m}}
 \end{array}$$

dont le premier montre que le quarré indéterminé $m m$ doit estre plus grand que $\frac{14500934744097}{lc}$, ou bien que $\frac{14700934744097}{5}$, à cause du Nombre donné lc ∞ 5. Si donc on suppose par exemple $m \infty$ 5000000, les quatre Nombres qu'on cherche, seront exprimez par quatre fractions, dont le Denominateur commun sera 100000000000000, & les Numerateurs seront

$$\begin{array}{r}
 110499065255903 \\
 133520963212899 \\
 131441916440799 \\
 124538055090399 \\
 \hline
 500000000000000
 \end{array}$$

Il est évident que leur somme est égale au Nombre donné 5, & que leurs six différences

$$\begin{array}{r}
 23021897956996 - 4798114 \\
 20942851184896 - 4576336 \\
 14038989834496 - 3746864 \\
 2079046772100 - 1441890 \\
 8982908122500 - 2997150 \\
 6903861350400 - 2627520
 \end{array}$$

ont leurs Racines quarrées, telles que vous les voyez marquées à la droite.

Je ne m'arrestera pas icy à vous enseigner la maniere de trouver les trois Nombres precedens indefinis, parce que Nous l'avons déjà publiée depuis environ neuf ou dix années, & que vous la pourrez trouver dans nostre Diophante, lorsqu'il aura le bonheur de paroistre. Mais on peut autrement & plus facilement rendre quarrées les trois dernieres différences,

$$\begin{array}{r}
 PP - 99 \\
 PP - 11 \\
 99 - 11
 \end{array}$$

en cette sorte:

Formez

Formez de ax , & de by ce triangle rectangle,

$$2abxy, aaxx-bbyy, aaxx+bbxy.$$

& reciproquement de bx , & de ay , ce triangle rectangle,

$$2abxy, aayy-bbxx, aayy+bbxx.$$

& mettez la hauteur commune $2abxy$, pour le costé r ,
& les deux hypoténuses $aaxx+bbxy, aayy+bbxx$,
pour les deux costez p, q , car ainsi les deux dernières dif-
ferences $pp-rr, qq-rr$, deviendront quarrées par la natu-
re du Triangle rectangle, & la première $pp-qq$, se chan-
gera en cellecy, $a^4x^4+b^4y^4-a^4y^4-b^4x^4$, qu'il faut
égaler au quarré, pour le costé duquel prenant $aaxx-bbyy$,
on trouvera $x \propto \frac{a^2}{b}$; & comme cette valeur ne se trouve pas
icy propre, supposez $x \propto z+\frac{a^2}{b}$, & vous aurez en entiers
cette autre difference à égaler au quarré,

$$\begin{array}{ccccccc} b^4 & \} & 4a^2b^2 & \} & 6a^4bb^2 & \} & 4a^4b^4 \\ -2a^4b^4 & \} & -4a^2b^2 & \} & -6a^2b^2 & \} & -4ab^2 \\ -a^4 & \} & & \} & & \} & \end{array} \begin{array}{l} y^4 \\ y^2z \\ yz \\ z^2 \end{array}$$

pour le costé duquel prenant

$$\begin{array}{l} a^4 \\ b^4 \end{array} \} yy+2a^2byz \frac{a^4bbzz-3aab^2xz}{a^4-b^4}$$

on trouvera en entiers

$$y \propto b^2+6a^4b^2-3a^2b$$

$$z \propto 4a^2-4ab^2$$

& par consequent $x \propto a^2+6a^4b^2-3ab^2$;

& au lieu des trois costez p, q, r , on aura ces trois autres

$$a^{20}+21a^{16}b^4-4a^{12}b^8-4a^8b^{12}+21a^4b^{16}+b^{20}.$$

$$10a^2b^{18}-24a^2b^{14}+64a^{10}b^{10}-24a^{14}b^6+10a^{18}bb.$$

$$92a^{10}b^{10}-24a^{14}b^6-24a^6b^{14}-6a^{18}bb-6aab^{18},$$

dont les quarez sont tels, que la difference de deux quel-
conques, est un nombre quarré. C'est pourquoy si l'on met
ces trois nombres indefinis à la place des trois costez p, q, r ,

on aura une seconde solution indefinie : & pour éviter un long calcul, on pourra pareillement reduire ces trois costez en nombres, en donnant aux deux lettres a, b telle valeur que l'on voudra. Comme si l'on suppose a = 2, & b = 1, on aura ces trois costez

$$2399057.$$

$$6288168$$

$$1873452$$

lesquels se rencontrant ici les mesmes qu'auparavant, on aura une solution en nombres tout-à-fait semblable à la precedente, en donnant 5000000 à la quantité indeterminée m.

On peut resoudre autrement & tres-facilement cette Question, en égalant la premiere difference ly...lx au carré aa, la quatrième lz...ly au carré bb, & la sixième lw...lz au carré dd, pour avoir ly = lx - aa, lz = ly - bb, ou lz = lx - aa - bb, & lw = lz - dd, ou lw = lx - aa - bb - dd. Ainsi les quatre nombres qu'on cherche, seront

$$lx$$

$$lx - aa$$

$$lx - aa - bb$$

$$lx - aa - bb - dd,$$

dont la somme 4lx - 3aa - 2bb - dd estant égalée au nombre donné lc, on trouvera $lx = \frac{1}{4}lc + \frac{aa + bb + dd}{4}$, & les quatre nombres seront

$$\frac{1}{4}lc + \frac{aa + bb + dd}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc - \frac{aa + bb + dd}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc - \frac{aa - bb + dd}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc - \frac{aa - bb - dd}{4}$$

& la seconde, la troisième, & la cinquième difference se changeront en ces trois autres,

$$aa + bb$$

$$aa + bb + dd$$

$$aa + dd$$

que l'on rendra quarrées, en cette sorte.

Formez de pq & de rs ce triangle rectangle

$$2pqrs, ppqq-rsrs, ppqq+rsrs,$$

& réciproquement de pr & de qs , ce triangle rectangle;

$$2pqrs, pprr-qqss, pprr+qqss.$$

& mettez la hauteur commune $2pqrs$ pour la lettre b , & les deux costez $ppqq-rsrs$, $pprr-qqss$, pour les deux autres lettres a , c ; car ainsi les deux différences $aa + bb$, $aa + dd$, deviendront quarrées par la nature du triangle rectangle; & il n'y aura plus qu'à éгалer au quarré l'autre différence $aa + bb + dd$, ou $p^2q^2 + r^2s^2 + 2p^2r^2 + q^2s^2$, pour le costé duquel prenant $ppqq + rsrs$, on trouvera $s \propto \frac{r}{q}$; & comme cette valeur ne se rencontre pas propre, supposez $s \propto y \frac{r}{q}$, & vous aurez en entiers cette autre puissance à éгалer au quarré, $p^2q^2 + 2p^2r^2 + p^2r^2 + 4p^2q^2r^2y^2 + 4p^2qr^2y^2 + 6ppqqr^2yy + 6ppq^2r^2yy + 4pq^2ry^2 + 4pq^2r^2y^2 + q^2y^2 + q^2r^2y^2$, pour le costé duquel prenant $ppq^2 + ppr^2 + 2pq^2r^2 + q^2r^2yy + 4p^2qr^2y^2$, on trouvera $y \propto \frac{4p^2r^2 + p^2q^2}{6q^2r^2 + 4pq^2r^2 - q^2}$; & au lieu de $s \propto y \frac{r}{q}$, on aura $s \propto \frac{6pq^2r^2 + p^2q^2 - p^2r^2}{6q^2r^2 + 4pq^2r^2 - q^2}$; & au lieu des quatre costez pq, rs, pr, qs , des quatre quarré-quarrez, dont la différence $p^2q^2 + r^2s^2 + 2p^2r^2 + q^2s^2$, est composée, on aura en entiers & en moindres termes ces quatre autres,

$$6q^2r^2 + 3qqr^2 - q^{10}$$

$$6q^2r^2 + 3q^2rr - r^{10}$$

$$6q^2r^2 + 3qr^2 - q^2r$$

$$6q^2r^2 + 3q^2r - qr^2.$$

& au lieu des quatre quarréz $ppqq, rsrs, pprr,$

qqff, on aura ces quatre

$$36q^{12}r^{12} + 36q^8r^{12} + 9q^4r^{16} - 12q^{16}r^4 - 6q^{12}r^8 + q^{10}$$

$$36q^8r^{12} + 36q^{12}r^8 + 9q^{16}r^4 - 12q^4r^{16} - 6q^8r^{12} + r^{10}$$

$$30q^{10}r^{10} + 36q^6r^{14} + 9qqrr^{18} - 12q^{14}r^6 + q^{18}rr$$

$$30q^{10}r^{10} + 36q^{14}r^6 + 9q^{12}rr - 12q^6r^{14} + qqqr^{18}$$

Et enfin au lieu des trois costez ppqq-rrff, pprf-

qqff, 2pqrf, on aura ces trois autres,

$$21q^4r^{16} - 21q^{16}r^4 - 6q^{12}r^8 + 6q^8r^{12} + q^{10} - r^{10}$$

$$48q^4r^{14} - 48q^{14}r^6 + 8qqrr^{18} - 8q^{12}rr$$

$$92q^{10}r^{10} + 24q^6r^{14} + 24q^{14}r^6 - 6q^{18}rr - 6qqrr^{18}$$

pour les trois quantitez a, d, b. Ainsi on pourra donner

une solution indefinie. Mais pour éviter un long calcul,

supposons $q \approx 2$, & $r \approx 1$, pour avoir

pq = 618	ppqq = 394384	a = 350385
pr = 314	pprr = 98196	b = 1083918
qr = 1726	qqff = 2979076	d = 1880480
rr = 863	rrff = 744769	
		ag = 122769648225
		bb = 1174899909184
		dd = 8297165030400

Et les quatre Nombres qu'on cherche, seront

$$\frac{1}{4}lc + \frac{11015273793443}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc + \frac{10524195200543}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc + \frac{5824595563807}{4}$$

$$\frac{1}{4}lc - \frac{27364064117793}{4}$$

Et si au lieu de 4, on met le quarré indeterminé 4mm,

Et au lieu de lc, le nombre donné s, les quatre nombres

seront tels

$$\frac{1}{4} + \frac{11015273793443}{4mm}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{10524195200543}{4mm}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{5824595563807}{4mm}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{27364064117793}{4mm}$$

dont le dernier montre que le quarré indeterminé mm, doit

PROBLEMES.

estre plus grand que $\frac{17364064517791}{10000000}$. Ainsi supposant $m = 10000000$, les quatre Nombres qu'on cherche, seront exprimez par quatre fractions, dont le Denominateur commun sera 4000000000000000, & les Numerateurs seront

[illegible]

il est évident que leur somme est égale au Nombre donné
5, & que leurs six différences

491078591900—700770
 5190678129636—1778306
 38379338351236—6195106
 4699599636736—1167856
 37888159758336—6155344
 33188660121600—760966

ont leurs racines quarrées, telles que vous les voyez icy
marquées à la droite.

Vous voyez par ces solutions différentes, que ce Probleme est aisé à celui qui sçait trouver quatre Nombres, tels que la difference de deux quelconques soit un Nombre quarré; ce que nous avons enseigné en plusieurs manieres dans nostre Diophante.

Si l'on se sert de ces quatre Nombres

2 3 9 9 0 5 7
2 1 8 8 1 6 8
7 8 7 3 4 3 2
6 5 6 0 6 5 7

dont les six différences

3	1	0	3	8	9	—	3	3	3
4	1	4	7	3	6	—	6	4	4
4	6	8	7	1	2	5	—	2	1
5	2	5	6	1	5	—	7	1	5
4	1	6	1	6	0	0	—	1	0
4	2	7	1	4	8	9	—	2	0

ont leurs Racines quarrées, telles que vous les voyez mar-
quées à la droite ; on mettra

$$\frac{1}{4}x - \frac{1199017}{mm}$$

$$\frac{1}{4}x - \frac{1189168}{mm}$$

$$\frac{1}{4}x - \frac{1171412}{mm}$$

$$\frac{1}{4}x - \frac{1160617}{mm}$$

pour les quatre Nombres qu'on cherche ; car ainsi la différence de deux quelconques sera un Nombre carré, & il n'y aura plus qu'à éгалer leur somme $x - \frac{11111114}{mm}$ au Nombre donné 5, pour avoir $x = \frac{11111114}{mm} + 5$, & par consequent $\frac{1}{4}x = \frac{11111114}{4mm} + \frac{1}{4}$, & les quatre Nombres qu'on cherche, seront tels,

$$\frac{1}{4} + \frac{11111016}{4mm}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{11011642}{4mm}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1081126}{4mm}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{11111114}{4mm}$$

dont le dernier montre que le carré mm doit estre plus grand que $\frac{11111114}{4}$. Si donc on suppose $m = 5000$, les quatre Nombres qu'on cherche, seront quatre fractions, dont le Denominateur commun sera 100000000, & les Numerateurs seront

$$\begin{array}{r} 118525086 \\ 118968642 \\ 110627586 \\ 111878686 \\ \hline 5.00000000 \end{array}$$

Il est évident que leur somme est égale au Nombre donné 5, & que leurs six différences

$$\begin{array}{r} 443556 - 666 \\ 2102700 - 1450 \\ 16646400 - 4080 \\ 1658944 - 1280 \\ 17089956 - 4134 \\ 18748900 - 4330 \end{array}$$

sont leurs Racines carrées, telles que vous les voyez icy marquées à la droite.

Si vous voulez une solution plus generale & plus scien-

PROBLEMES.

131

estisque ; servez-vous de ces quatre Nombres indefinis ,

$$a^{20} + 21a^{16}b^4 - 6a^{12}b^8 - 6a^8b^{12} + 21a^4b^{16} + b^{20}.$$

$$80a^8b^{12} - 24a^6b^{14} + 60a^{10}b^{10} - 24a^{14}b^6 + 10a^{18}bb.$$

$$6a^8b^{12} + 24a^4b^{14} - 92a^{10}b^{10} + 24a^{14}b^6 + 6a^{18}bb.$$

$$a^{10} + 16a^8b^{12} + 21a^{16}b^4 - 6a^{12}b^8 - 32a^{10}b^{10} - 6a^8b^{14}$$

$$+ 21a^4b^{16} + 16a^{18}bb + b^{20},$$

dont les six differences

$$a^{20} - 6a^{18}bb + 21a^{16}b^4 - 24a^{14}b^6 - 6a^{12}b^8 + 92a^{10}b^{10}$$

$$- 6a^8b^{12} - 24a^6b^{14} + 21a^4b^{16} - 6a^2b^{18} + b^{20}.$$

$$a^{10} - 10a^8bb + 21a^{16}b^4 + 24a^{14}b^6 - 6a^{12}b^8 - 60a^{10}b^{10}$$

$$- 6a^8b^{12} + 24a^6b^{14} + 21a^4b^{16} - 10a^2b^{18} + b^{20}.$$

$$4a^8b^{12} - 48a^6b^{14} + 152a^{10}b^{10} - 48a^{14}b^6 + 4a^{18}bb.$$

$$16a^{18}bb - 32a^{10}b^{10} + 16a^2b^{18}.$$

$$a^{10} + 6a^{18}bb + 21a^{16}b^4 + 24a^{14}b^6 - 6a^{12}b^8 - 92a^{10}b^{10}$$

$$- 6a^8b^{12} + 24a^6b^{14} + 21a^4b^{16} + 6a^2b^{18} + b^{20}.$$

$$a^{20} + 10a^{18}bb + 21a^{16}b^4 - 24a^{14}b^6 - 6a^{12}b^8 + 60a^{10}b^{10}$$

$$- 6a^8b^{12} - 24a^6b^{14} + 21a^4b^{16} + 10a^2b^{18} + b^{20},$$

ont leurs Racines quarrées

$$a^{10} - 3a^8bb + 6a^6b^4 + 6a^4b^6 - 3a^2b^8 + b^{10}.$$

$$a^{10} - 5a^8bb - 2a^6b^4 + 2a^4b^6 + 5a^2b^8 - b^{10}.$$

$$2ab^9 - 12a^3b^7 + 2a^5b^5.$$

$$4a^2 - 4ab^9.$$

$$a^{10} + 3a^8bb + 6a^6b^4 - 6a^4b^6 - 3a^2b^8 - b^{10}.$$

$$a^{10} + 5a^8bb - 2a^6b^4 - 2a^4b^6 + 5a^2b^8 + b^{10}.$$




$$O$$

achevez le reste comme auparavant.





FIN.









1. 1880-1881
 2. 1881-1882
 3. 1882-1883
 4. 1883-1884
 5. 1884-1885
 6. 1885-1886
 7. 1886-1887
 8. 1887-1888
 9. 1888-1889
 10. 1889-1890
 11. 1890-1891
 12. 1891-1892
 13. 1892-1893
 14. 1893-1894
 15. 1894-1895
 16. 1895-1896
 17. 1896-1897
 18. 1897-1898
 19. 1898-1899
 20. 1899-1900
 21. 1900-1901
 22. 1901-1902
 23. 1902-1903
 24. 1903-1904
 25. 1904-1905
 26. 1905-1906
 27. 1906-1907
 28. 1907-1908
 29. 1908-1909
 30. 1909-1910
 31. 1910-1911
 32. 1911-1912
 33. 1912-1913
 34. 1913-1914
 35. 1914-1915
 36. 1915-1916
 37. 1916-1917
 38. 1917-1918
 39. 1918-1919
 40. 1919-1920
 41. 1920-1921
 42. 1921-1922
 43. 1922-1923
 44. 1923-1924
 45. 1924-1925
 46. 1925-1926
 47. 1926-1927
 48. 1927-1928
 49. 1928-1929
 50. 1929-1930
 51. 1930-1931
 52. 1931-1932
 53. 1932-1933
 54. 1933-1934
 55. 1934-1935
 56. 1935-1936
 57. 1936-1937
 58. 1937-1938
 59. 1938-1939
 60. 1939-1940
 61. 1940-1941
 62. 1941-1942
 63. 1942-1943
 64. 1943-1944
 65. 1944-1945
 66. 1945-1946
 67. 1946-1947
 68. 1947-1948
 69. 1948-1949
 70. 1949-1950
 71. 1950-1951
 72. 1951-1952
 73. 1952-1953
 74. 1953-1954
 75. 1954-1955
 76. 1955-1956
 77. 1956-1957
 78. 1957-1958
 79. 1958-1959
 80. 1959-1960
 81. 1960-1961
 82. 1961-1962
 83. 1962-1963
 84. 1963-1964
 85. 1964-1965
 86. 1965-1966
 87. 1966-1967
 88. 1967-1968
 89. 1968-1969
 90. 1969-1970
 91. 1970-1971
 92. 1971-1972
 93. 1972-1973
 94. 1973-1974
 95. 1974-1975
 96. 1975-1976
 97. 1976-1977
 98. 1977-1978
 99. 1978-1979
 100. 1979-1980
 101. 1980-1981
 102. 1981-1982
 103. 1982-1983
 104. 1983-1984
 105. 1984-1985
 106. 1985-1986
 107. 1986-1987
 108. 1987-1988
 109. 1988-1989
 110. 1989-1990
 111. 1990-1991
 112. 1991-1992
 113. 1992-1993
 114. 1993-1994
 115. 1994-1995
 116. 1995-1996
 117. 1996-1997
 118. 1997-1998
 119. 1998-1999
 120. 1999-2000
 121. 2000-2001
 122. 2001-2002
 123. 2002-2003
 124. 2003-2004
 125. 2004-2005
 126. 2005-2006
 127. 2006-2007
 128. 2007-2008
 129. 2008-2009
 130. 2009-2010
 131. 2010-2011
 132. 2011-2012
 133. 2012-2013
 134. 2013-2014
 135. 2014-2015
 136. 2015-2016
 137. 2016-2017
 138. 2017-2018
 139. 2018-2019
 140. 2019-2020
 141. 2020-2021
 142. 2021-2022
 143. 2022-2023
 144. 2023-2024
 145. 2024-2025
 146. 2025-2026
 147. 2026-2027
 148. 2027-2028
 149. 2028-2029
 150. 2029-2030
 151. 2030-2031
 152. 2031-2032
 153. 2032-2033
 154. 2033-2034
 155. 2034-2035
 156. 2035-2036
 157. 2036-2037
 158. 2037-2038
 159. 2038-2039
 160. 2039-2040
 161. 2040-2041
 162. 2041-2042
 163. 2042-2043
 164. 2043-2044
 165. 2044-2045
 166. 2045-2046
 167. 2046-2047
 168. 2047-2048
 169. 2048-2049
 170. 2049-2050
 171. 2050-2051
 172. 2051-2052
 173. 2052-2053
 174. 2053-2054
 175. 2054-2055
 176. 2055-2056
 177. 2056-2057
 178. 2057-2058
 179. 2058-2059
 180. 2059-2060
 181. 2060-2061
 182. 2061-2062
 183. 2062-2063
 184. 2063-2064
 185. 2064-2065
 186. 2065-2066
 187. 2066-2067
 188. 2067-2068
 189. 2068-2069
 190. 2069-2070
 191. 2070-2071
 192. 2071-2072
 193. 2072-2073
 194. 2073-2074
 195. 2074-2075
 196. 2075-2076
 197. 2076-2077
 198. 2077-2078
 199. 2078-2079
 200. 2079-2080
 201. 2080-2081
 202. 2081-2082
 203. 2082-2083
 204. 2083-2084
 205. 2084-2085
 206. 2085-2086
 207. 2086-2087
 208. 2087-2088
 209. 2088-2089
 210. 2089-2090
 211. 2090-2091
 212. 2091-2092
 213. 2092-2093
 214. 2093-2094
 215. 2094-2095
 216. 2095-2096
 217. 2096-2097
 218. 2097-2098
 219. 2098-2099
 220. 2099-2100
 221. 2100-2101
 222. 2101-2102
 223. 2102-2103
 224. 2103-2104
 225. 2104-2105
 226. 2105-2106
 227. 2106-2107
 228. 2107-2108
 229. 2108-2109
 230. 2109-2110
 231. 2110-2111
 232. 2111-2112
 233. 2112-2113
 234. 2113-2114
 235. 2114-2115
 236. 2115-2116
 237. 2116-2117
 238. 2117-2118
 239. 2118-2119
 240. 2119-2120
 241. 2120-2121
 242. 2121-2122
 243. 2122-2123
 244. 2123-2124
 245. 2124-2125
 246. 2125-2126
 247. 2126-2127
 248. 2127-2128
 249. 2128-2129
 250. 2129-2130
 251. 2130-2131
 252. 2131-2132
 253. 2132-2133
 254. 2133-2134
 255. 2134-2135
 256. 2135-2136
 257. 2136-2137
 258. 2137-2138
 259. 2138-2139
 260. 2139-2140
 261. 2140-2141
 262. 2141-2142
 263. 2142-2143
 264. 2143-2144
 265. 2144-2145
 266. 2145-2146
 267. 2146-2147
 268. 2147-2148
 269. 2148-2149
 270. 2149-2150
 271. 2150-2151
 272. 2151-2152
 273. 2152-2153
 274. 2153-2154
 275. 2154-2155
 276. 2155-2156
 277. 2156-2157
 278. 2157-2158
 279. 2158-2159
 280. 2159-2160
 281. 2160-2161
 282. 2161-2162
 283. 2162-2163
 284. 2163-2164
 285. 2164-2165
 286. 2165-2166
 287. 2166-2167
 288. 2167-2168
 289. 2168-2169
 290. 2169-2170
 291. 2170-2171
 292. 2171-2172
 293. 2172-2173
 294. 2173-2174
 295. 2174-2175
 296. 2175-2176
 297. 2176-2177
 298. 2177-2178
 299. 2178-2179
 300. 2179-2180
 301. 2180-2181
 302. 2181-2182
 303. 2182-2183
 304. 2183-2184
 305. 2184-2185
 306. 2185-2186
 307. 2186-2187
 308. 2187-2188
 309. 2188-2189
 310. 2189-2190
 311. 2190-2191
 312. 2191-2192
 313. 2192-2193
 314. 2193-2194
 315. 2194-2195
 316. 2195-2196
 317. 2196-2197
 318. 2197-2198
 319. 2198-2199
 320. 2199-2200
 321. 2200-2201
 322. 2201-2202
 323. 2202-2203
 324. 2203-2204
 325. 2204-2205
 326. 2205-2206
 327. 2206-2207
 328. 2207-2208
 329. 2208-2209
 330. 2209-2210
 331. 2210-2211
 332. 2211-2212
 333. 2212-2213
 334. 2213-2214
 335. 2214-2215
 336. 2215-2216
 337. 2216-2217
 338. 2217-2218
 339. 2218-2219
 340. 2219-2220
 341. 2220-2221
 342. 2221-2222
 343. 2222-2223
 344. 2223-2224
 345. 2224-2225
 346. 2225-2226
 347. 2226-2227
 348. 2227-2228
 349. 2228-2229
 350. 2229-2230
 351. 2230-2231
 352. 2231-2232
 353. 2232-2233
 354. 2233-2234
 355. 2234-2235
 356. 2235-2236
 357. 2236-2237
 358. 2237-2238
 359. 2238-2239
 360. 2239-2240
 361. 2240-2241
 362. 2241-2242
 363. 2242-2243
 364. 2243-2244
 365. 2244-2245
 366. 2245-2246
 367. 2246-2247
 368. 2247-2248
 369. 2248-2249
 370. 2249-2250
 371. 2250-2251
 372. 2251-2252
 373. 2252-2253
 374. 2253-2254
 375. 2254-2255
 376. 2255-2256
 377. 2256-2257
 378. 2257-2258
 379. 2258-2259
 380. 2259-2260
 381. 2260-2261
 382. 2261-2262
 383. 2262-2263
 384. 2263-2264
 385. 2264-2265
 386. 2265-2266
 387. 2266-2267
 388. 2267-2268
 389. 2268-2269
 390. 2269-2270
 391. 2270-2271
 392. 2271-2272
 393. 2272-2273
 394. 2273-2274
 395. 2274-2275
 396. 2275-2276
 397. 2276-2277
 398. 2277-2278
 399. 2278-2279
 400. 2279-2280
 401. 2280-2281
 402. 2281-2282
 403. 2282-2283
 404. 2283-2284
 405. 2284-2285
 406. 2285-2286
 407. 2286-2287
 408. 2287-2288
 409. 2288-2289
 410. 2289-2290
 411. 2290-2291
 412. 2291-2292
 413. 2292-2293
 414. 2293-2294
 415. 2294-2295
 416. 2295-2296
 417. 2296-2297
 418. 2297-2298
 419. 2298-2299
 420. 2299-2300
 421. 2300-2301
 422. 2301-2302
 423. 2302-2303
 424. 2303-2304
 425. 2304-2305
 426. 2305-2306
 427. 2306-2307
 428. 2307-2308
 429. 2308-2309
 430. 2309-2310
 431. 2310-2311
 432. 2311-2312
 433. 2312-2313
 434. 2313-2314
 435. 2314-2315
 436. 2315-2316
 437. 2316-2317
 438. 2317-2318
 439. 2318-2319
 440. 2319-2320
 441. 2320-2321
 442. 2321-2322
 443. 2322-2323
 444. 2323-2324
 445. 2324-2325
 446. 2325-2326
 447. 2326-2327
 448. 2327-2328
 449. 2328-2329
 450. 2329-2330
 451. 2330-2331
 452. 2331-2332
 453. 2332-2333
 454. 2333-2334
 455. 2334-2335
 456. 2335-2336
 457. 2336-2337
 458. 2337-2338
 459. 2338-2339
 460. 2339-2340
 461. 2340-2341
 462. 2341-2342
 463. 2342-2343
 464. 2343-2344
 465. 2344-2345
 466. 2345-2346
 467. 2346-2347
 468. 2347-2348
 469. 2348-2349
 470. 2349-2350
 471. 2350-2351
 472. 2351-2352
 473. 2352-2353
 474. 2353-2354
 475. 2354-2355
 476. 2355-2356
 477. 2356-2357
 478. 2357-2358
 479. 2358-2359
 480. 2359-2360
 481. 2360-2361
 482. 2361-2362
 483. 2362-2363
 484. 2363-2364
 485. 2364-2365
 486. 2365-2366
 487. 2366-2367
 488. 2367-2368
 489. 2368-2369
 490. 2369-2370
 491. 2370-2371
 492. 2371-2372
 493. 2372-2373
 494. 2373-2374
 495. 2374-2375
 496. 2375-2376
 497. 2376-2377
 498. 2377-2378
 499. 2378-2379
 500. 2379-2380
 501. 2380-2381
 502. 2381-2382
 503. 2382-2383
 504. 2383-2384
 505. 2384-2385
 506. 2385-2386
 507. 2386-2387
 508. 2387-2388
 509. 2388-2389
 510. 2389-2390
 511. 2390-2391
 512. 2391-2392
 513. 2392-2393
 514. 2393-2394
 515. 2394-2395
 516. 2395-2396
 517. 2396-2397
 518. 2397-2398
 519. 2398-2399
 520. 2399-2400
 521. 2400-2401
 522. 2401-2402
 523. 2402-2403
 524. 2403-2404
 525. 2404-2405
 526. 2405-2406
 527. 2406-2407
 528. 2407-2408
 529. 2408-2409
 530. 2409-2410
 531. 2410-2411
 532. 2411-2412
 533. 2412-2413
 534. 2413-2414
 535. 2414-2415
 536. 2415-2416
 537. 2416-2417
 538. 2417-2418
 539. 2418-2419
 540. 2419-2420
 541. 2420-2421
 542. 2421-2422
 543. 2422-2423
 544. 2423-2424
 545. 2424-2425
 546. 2425-2426
 547. 2426-2427
 548. 2427-2428
 549. 2428-2429
 550. 2429-2430
 551. 2430-2431
 552. 2431-2432
 553. 2432-2433
 554. 2433-2434
 555. 2434-2435
 556. 2435-2436
 557. 2436-2437
 558. 2437-2438
 559. 2438-2439
 560. 2439-2440
 561. 2440-2441
 562. 2441-2442
 563. 2442-2443
 564. 2443-2444
 565. 2444-2445
 566. 2445-2446
 567. 2446-2447
 568. 2447-2448
 569. 2448-2449
 570. 2449-2450
 571. 2450-2451
 572. 2451-2452
 573. 2452-2453
 574. 2453-2454
 575. 2454-2455
 576. 2455-2456
 577. 2456-2457
 578. 2457-2458
 579. 2458-2459
 580. 2459-2460
 581. 2460-2461
 582. 2461-2462
 583. 2462-2463
 584. 2463-2464
 585. 2464-2465
 586. 2465-2466
 587. 2466-2467
 588. 2467-2468
 589. 2468-2469
 590. 2469-2470
 591. 2470-2471
 592. 2471-2472
 593. 2472-2473
 594. 2473-2474
 595. 2474-2475
 596. 2475-2476
 597. 2476-2477
 598. 2477-2478
 599. 2478-2479
 600. 2479-2480
 601. 2480-2481
 602. 2481-2482
 603. 2482-2483
 604. 2483-2484
 605. 2484-2485
 606. 2485-2486
 607. 2486-2487
 608. 2487-2488
 609. 2488-2489
 610. 2489-2490
 611. 2490-2491
 612. 2491-2492
 613. 2492-2493
 614. 2493-2494
 615. 2494-2495
 616. 2495-2496
 617. 2496-2497
 618. 2497-2498
 619. 2498-2499
 620. 2499-2500
 621. 2500-2501
 622. 2501-2502
 623. 2502-2503
 624. 2503-2504
 625. 2504-2505
 626. 2505-2506
 627. 2506-2507
 628. 2507-2508
 629. 2508-2509
 630. 2509-2510
 631. 2510-2511
 632. 2511-2512
 633. 2512-2513
 634. 2513-2514
 635. 2514-2515
 636. 2515-2516
 637. 2516-2517
 638. 2517-2518
 639. 2518-2519
 640. 2519-2520
 641. 2520-2521
 642. 2521-2522
 643. 2522-2523
 644. 2523-2524
 645. 2524-2525
 646. 2525-2526
 647. 2526-2527
 648. 2527-2528
 649. 2528-2529
 650. 2529-2530
 651. 2530-2531
 652. 2531-2532
 653. 2532-2533
 654. 2533-25





































Equat. p. 74.









Equat. p. 79.














Equat. p. 89.





609390

TRAITÉ DE LA CONSTRUCTION DES EQUATIONS:

Pour la Solution des Problemes
Indeterminez.

Par M. OZANAM, Professeur
en Mathematique.



A PARIS,

Chez ESTIENNE MICHALLET, rue S. Jacques
prés la Fontaine S. Severin, à l'Image
S. Paul.

M. DC. LXXXVII.

AVEC PERMISSION.



604370

TRAITÉ DE LA CONSTRUCTION DES EQUATIONS:

Pour la Solution des Problemes
indeterminez.

Par M. OZANAM, Professeur
en Mathematique.



A PARIS,

Chez ESTIENNE MICHALLET, rue S. Jacques
prés la Fontaine S. Severin, à l'Image
S. Paul.

M. DC. LXXXVII.

AVEC PERMISSION.

THE
OF
IN CONSTRUCTION
OF
EQUATIONS.



AU LECTEUR.



E n'est pas assez , *mon cher Lecteur* , de vous avoir donné quelques Questions au commencement du Traité precedent , pour vous faire voir l'usage des Lieux Geometriques à l'égard des Problemes indeterminés ; Il faut encore vous donner ce Traité , pour vous enseigner l'usage des mêmes Lieux Geometriques , touchant la Construction Geometrique des Equations , ce qu'il faut sçavoir faire pour resoudre par Geometrie les Problemes determinés , comme vous verrez dans les Questions que nous ajoûtons au commencement de ce Traité , dont quelques-unes ont été tirées de nôtre Diophante , comme dans le Traité precedent , pour vous mieux faire comprendre la maniere de resoudre par Geometrie les Problemes d'Arithmetique , en substituant

AU LECTEUR.

des lignes à la place des Nombres donnez,
& en concevant des lignes d'une certaine
quantité à la place des Nombres qu'on
cherche, comme vous avez déjà vû dans
le Traité precedent, & comme vous ver-
rez encore icy. Après quoy nous vous
enseignerons plusieurs manieres nouvelles
pour resoudre par deux Lieux les Equa-
tions de deux dimensions.





T R A I T E
D E
LA CONSTRUCTION
D E S
E Q U A T I O N S.



OMME tout Probleme possible en Geometrie se peut resoudre par deux Lieux conformes à la Nature du Probleme, il faut sçavoir reduire l'Equation constitutive de ce Probleme en deux Lieux, pour les pouvoir joindre ensemble, parce que l'intersection des deux *Lignes Locales* donnera les Racines de l'Equation proposée, & par conséquent la Solution du Probleme, comme vous allez voir dans les Questions suivantes, que nous ajouterons icy auparavant que d'entrer en matière, pour vous mieux persuader de l'utilité de ce Traité.

QUESTION I

1. & 5. 2.
Dioph.
Probleme
simple.

Trouver deux Nombres, tels que les raisons de leur difference & de leur somme à la difference de leurs Quarrez soient données.

Pour résoudre cette Question par Geometrie, nous la proposerons plus generalement, en cette sorte ; Trouver deux lignes, telles que les raisons du Rectangle sous leur difference & une ligne donnée, & du Rectangle sous leur somme & la même ligne donnée, à la difference de leurs Quarrez, soient données.

4. Fig.

On propose de trouver deux lignes $AD \propto x$, $DE \propto y$, en sorte que le Rectangle $lx-ly$, sous leur difference $x-y$, & la ligne donnée $AO \propto l$, soit à la difference de leurs Quarrez $xx-yy$, comme $AP \propto r$, à $AQ \propto f$, & que le Rectangle $lx+ly$ sous leur somme $x+y$ & la même ligne donnée $AO \propto l$, soit à la même difference des Quarrez $xx-yy$, comme $AR \propto a$, à $AS \propto b$.

Selon les conditions de la Question, on aura ces deux Analogies.

$$lx-ly, xx-yy :: r, f$$

$$lx+ly, xx-yy :: a, b.$$

Dans la premiere on trouvera $y \propto \frac{l}{r}x$, qui est un Lieu à la ligne droite, & dans la seconde on trouvera la même $x \propto x - \frac{lb}{a}$, qui est un autre Lieu à la ligne droite, lequel étant joint avec le premier donne la construction suivante.

Construc-
tion.

Ayant fait à un angle quelconque les deux lignes AF , AG , égales chacune à $\frac{l}{r}$ ou quatrième proportionnelle aux trois lignes AP , AQ , AO , prolongez AF au dessus de

DES EQUATIONS.

3

1. Fig.

AG, vers C, & faites les deux lignes AB, AC, égales chacune à $\frac{1}{2}$, ou quatrième proportionnelle aux trois AR, AS, AO, Menez les deux lignes Locales BC, FG, & par leur point de section E, tirez à la ligne CF, la parallèle DE, & les deux lignes AD, DE, seront les deux lignes qu'on cherche, de sorte que le Rectangle AOAD-AODE, sera au Rectangle ADq-DEq, comme AP, à AQ, & le Rectangle AOAD+AODE, au même Rectangle ADq-DEq, comme AR, à AS.

Car puisque nous avons DG $\propto$ DE, à cause de AF égale à AG, & parallèle à DE, par la construction, nous aurons AG égale à AD+DE, & on pourra faire cette analogie, AD, AD+DE :: AO, AG, & si à la place des deux derniers termes AO, AG, ou AO, AF, on met les deux AP, AQ, qui sont en même raison, par la construction, on aura celle-cy, AO, AD+DE :: AP, AQ, & si on donne aux deux premiers termes AO, AD+DE, la hauteur commune AD-DE, on aura cette dernière analogie, AOAD-AODE, ADq-DEq :: AP, AQ. Ce qui est l'une des deux choses qu'il falloit démontrer.

Demonstration.

De même puisque nous avons BD $\propto$ DE, à cause de AC égale à AB, & parallèle à DE, par la construction, nous aurons AB $\propto$ AD-DE, & on pourra faire cette analogie, AO, AD-DE :: AO, AB, & si à la place des deux derniers termes AO, AB, on met les deux AR, AS, qui sont en même raison, par la construction, on aura celle-cy AO, AD-DE, :: AR, AS, & si aux deux premiers termes AO, AD-DE, on donne la hauteur commune AD+DE, on aura cette dernière analogie, AOAD+AODE, ADq-DEq ::

DE LA CONSTRUCTION.

4. *Fig.* AR, AS, Ce qui restoit à demonst. DA

Pour résoudre cette Question en Nombres, on considérera que puisque l'on a ces deux Equations, $y \propto \frac{15}{x}$, $x \propto x - \frac{1b}{2}$, on aura celle-cy, $\frac{15}{x} \propto x - \frac{1b}{2}$ dans laquelle on trouvera $x \propto \frac{15}{x} + \frac{1b}{2}$ ou $x \propto \frac{15}{x} + \frac{b}{2}$, en prenant la lettre l pour l'unité, & les deux Nombres qu'on cherche seront tels,

$\frac{af + br}{abr}$
Si $r \propto 1$, $f \propto 6$, $a \propto 1$, & $b \propto 2$, les deux Nombres seront 4, 2 : Mais si $r \propto 1$, $f \propto 7$, $a \propto 1$, & $b \propto 3$, les deux Nombres seront 5, 2.

Canon. On tire de cette Solution indefinite, le Canon suivant. Si des quatre termes des deux raisons données r, f, a, b , on ajoute & on ôte le plan sous les deux extrêmes du plan sous les deux moyens, & qu'on divise la somme & le reste chacun par le double du plan sous le premier & le troisième, on aura les deux Nombres qu'on cherche.

Un Probleme simple, sçavoir celui où la lettre inconnue se trouve rationnelle, se peut aussi résoudre par l'intersection de la circonference d'un cercle & d'une ligne droite, comme s'il étoit plan, comme vous allez voir dans le Probleme suivant.

QUESTION II.

a Fig.
Probleme
simple.

Couper la droite donnée AE, aux points B, C, D, en sorte que le Rectangle ABD, soit au Rectangle ACD, comme le Quarré BE, au Quarré CE.

Supposant que le Probleme soit déjà résolu, mettez

$$AE \propto a.$$

$$AB \propto x.$$

$$BC \propto y.$$

$$CD \propto x.$$

DES EQUATIONS.

$$CD \propto x.$$

$$DE \propto a.$$

Pour avoir

$$BD \propto y + x.$$

$$AC \propto x + y.$$

$$BE \propto y + x + a.$$

$$CE \propto x + a.$$

Et par consequent

$$ABD \propto xy + x^2.$$

$$ACD \propto x^2 + yx.$$

$$BEq \propto yy + 2yx + x^2 + 2ya + 2xa + aa.$$

$$CEq \propto x^2 + 2xa + aa.$$

Parce que l'on veut que les quatre Plans ABD, ACD, BEq, CEq, soient proportionnels, on aura cette analogie, $xy + x^2, x^2 + yx :: yy + 2yz + zz + 2ya + 2za + aa, zz + 2za + aa$, & en divisant on aura celle cy, $xy - yz, xz + yz :: yy + 2yz + 2ya, zz + 2za + aa$, & en divisant les deux antecedens par y, on aura cette derniere analogie, $x - z, xz + yz :: y + 2z + 2a, zz + 2za + aa$, & consequemment cette Equation, $xzz + 2xz + xaa - z^3 - 2zza - zaa \propto xyz + 2xzz + 2xza + yyz + 2yzz + 2yz a$, dans laquelle on trouvera $y \propto \frac{-z - a - \sqrt{x^2 + R}}{x + R}$, ou plus facilement $x \propto \frac{yy + 2yz + 2ya + 2za + aa}{2y + 2z}$, & par consequent $y \propto \frac{aa + 2z - x}{2y + 2z}$, à cause de $x + y + z = a$, & comme dans la valeur trouvée de x, la quantité y s'y trouve mêlée, si à la place de y, on substitue par tout sa derniere valeur trouvée, $\frac{aa + 2z - x}{2y + 2z}$ on aura une autre valeur de x, dans les mêmes lettres a, z, a, dans lesquelles celle de la lettre y se trouve exprimée. Mais pour éviter un si long calcul, il vaudra mieux chercher cette seconde valeur de x, en substituant par tout dans l'E-

6 DE LA CONSTRUCTION

1. Fig.

quation $x^2 + y^2 + z^2 = a$, à la place de y , sa premiere valeur trouuée $-z - \frac{1}{2}x + R$, $\frac{1}{2}xx + x\omega + \frac{1}{2}\omega^2$ pour auoir cette autre Equation, $\frac{1}{2}x^2 + R - \frac{1}{2}xx + x\omega + \frac{1}{2}\omega^2 = a$, dans laquelle on trouuera $x = \frac{222}{\omega^2 + \omega + 12}$.

Ainsi les deux quantitez inconnues x, y , seront telles, $\frac{222 - 2\omega - 2\omega^2 - 12\omega}{\omega^2 + \omega + 12}$, & comme il n'y a plus de conditions dans la Question, pour determiner les deux autres quantitez inconnues z, ω , on les prendra pour connues, en coupant la ligne donnée AE, aux points C, D, comme l'on voudra, pouruü que z soit plus grande que $\frac{22 - \omega}{27}$ comme nous allons démontrer.

Demonstration analytique.

Pour demontrer que z doit être moindre que $\frac{22 - \omega}{27}$, afin que la Question soit possible, on considerera qu'afin que la ligne BC, ou y soit positive, sa valeur $\frac{222 - 2\omega - 2\omega^2 - 12\omega}{\omega^2 + \omega + 12}$ doit être plus grande que 0, ce qui arrivera si les termes affirmes sont plus grands que les niesz, c'est à dire si le terme 22ω est plus grand que $222 + \omega + 22\omega^2 + 12\omega$, & dans cette inégalité on trouuera z moindre que $\frac{22 - \omega}{27}$. Ce qu'il falloit démontrer. Mais cela se démontrera geometriquement par l'atouchement des deux Lignes Locales, lesquelles par leur intersection peuvent résoudre la Question proposée, & que nous trouuerons en cette sorte.

Supposant donc que les deux quantitez z, ω , soient connues, les deux autres quantitez x, y , seront aussi connues, & la Question sera résolue puisque le point B sera déterminé. Mais comme la construction que l'on tireroit de la valeur trouuée de x , ou de celle de y , pour determiner ce point B, qui reste, seroit un peu longue, il sera plutôt fait de résoudre le Probleme par l'intersection d'un cercle & d'une ligne droite, que l'on trouuera

DES EQUATIONS.

7

premierement en cette maniere

2. Fig.

Elevez des deux poins B, C, à la ligne donnée AE, les perpendiculaires BF, CG, qui se trouveront terminées aux poins F, G; par le moyen d'une circonference de cercle, que l'on décrira du centre I, à l'entour du Diametre AD, afin que l'on puisse metre quand on voudra, le Quarré BF à la place du Rectangle ABD, & le Quarré CG au lieu du Rectangle ACE.

Cette preparation étant faite, supposcz

$$AE \sim a.$$

$$CG \sim b.$$

$$CE \sim c.$$

$$AD \sim d.$$

$$AB \sim x.$$

$$BF \sim y.$$

Si on ôte $AB \sim x$ de $AD \sim d$, on aura $d-x$ pour la ligne BD, laquelle étant multipliée par $AB \sim x$, on aura $dx-xx$ pour le Rectangle ABD, ou pour le Quarré yy de la ligne $BF \sim y$. Ainsi on aura cette Equation $dx-xx \sim yy$, qui est un Lieu au Cercle donné AFGD.

Parce que le Rectangle ABD, ou le Quarré BF, doit être au Rectangle ACD; ou au Quarré CG, comme le Quarré BE, au Quarré CE, les quatre côtes BF, CG, BE, CE, ou $y, b, a-x, c$, seront proportionnels, & l'on aura cette Equation, $cy \sim ab-bx$, dans laquelle on trouvera $x \sim a - \frac{cy}{b}$, qui est un Lieu à la Ligne droite, que l'on pourra joindre avec le Lieu au Cercle, par les preceptes du Probl. III. ou plus facilement en tirant de l'extremité E de la ligne donnée AE, par l'extremité G de la perpendiculaire CG, la Ligne Locale EG, qui coupe icy la circonference du Cercle Local AFGD;

Construc-
tion.

Bij

8

au point F, duquel on tirera sur le Diametre AD, la perpendiculaire FB, & le Rectangle ABD sera au Rectangle ACD, comme le Quarré BE, au Quarré CE.

Car dans les Triangles semblables FBE, GCE, on a cette analogie, BFq, CGq :: BEq, CEq, & si à la place des Quarrez BF, CG, on met les Rectangles ABD, ACD, qui leurs sont égaux, par la nature du Cercle, on aura cette autre analogie, ABD, ACD :: BEq, CEq. Ce qu'il falloit démontrer.

Pour démontrer geometriquement la determination precedente, qui est que z doit être moindre que $\frac{AB \cdot AC}{AT}$, on considerera comme auparavant que la partie BC doit être positive. Pour cette fin, il ne faut pas que la droite EG touche la circonference du Cercle $AFGD$, parce que si ces deux Lignes Locales se touchoient, le point F , conviendrait avec le point G , & par consequent le point B avec le point C , ce qui rendroit la ligne BC infiniment petite, & dans ce cas le Rectangle AED seroit égal au Quarré de la touchante EG , ou à la somme des Quarréz CG , CE , ou du Rectangle ACD & du Quarré CE , c'est à-dire que selon la premiere analyse, on auroit cette Equation, $aw \sim \frac{AB \cdot AC \cdot 2AB - 2AB \cdot 2AC - 2AB \cdot 2AT + 2AT^2}{4AT^2} + zz + 2zw + ww$, dans laquelle on trouveroit $z \sim \frac{AB \cdot AC}{AT}$: & comme le Rectangle AED , est plus grand que le Quarré de la ligne EG , lorsqu'elle coupe le Cercle, puisqu'il est égal au Rectangle FEG , on conclut comme auparavant, que z doit être moindre que $\frac{AB \cdot AC}{AT}$.

Ainsi vous voyez que la Détermination d'un Problème dépend de l'attouchement des deux Lieux constitutifs, ou des deux Lignes Locales, qui le peuvent refoudre, comme vous verrez plus amplement dans

notre *Traité nouveau* de Maximis & Minimis , que nous publierons bien tôt , avec un autre *Traité nouveau* des Touchantes. a. Fig.

S C O L I E.

Si du point D , on tire à la ligne EF , la perpendiculaire DK , le Rectangle BDC , sera égal au Quarré DK. Theor. 1.

Car si l'on tire les droites AF , DF , AG , DG , DF , CK , on connoitra aisément que dans le Triangle Rectangle AGD , l'angle CGD est égal à l'angle CAG , & que le Trapeze CGKD , dont les deux angles opposez C , K , sont droitz , est dans un Cercle . & que par conséquent l'angle CGD , est égal à l'angle CKD . D'où il suit que les trois angles CGD , CKD , CAG , sont égaux. Démonstration.

On connotra aussi facilement que le Trapeze BDKF , dont les deux angles opposez B , K , sont droitz , est dans un Cercle , & que par conséquent l'angle DFK est égal à l'angle DBK , & parce que l'angle DFK , ou DFG est égal à l'angle DAG , ou CAG , il suit que les trois angles CAG , DBK , DFK , sont égaux.

De ce que les trois angles CGD , CKD , CAG , sont égaux , aussi-bien que les trois CAG , DBK , DFK , il suit que les deux CKD , DBK , sont pareillement égaux , & que par conséquent les deux triangles CDK , BDK , sont semblables. C'est pourquoy on aura cette analogie , BD , DK :: DK , CD , & par conséquent cette Equation , BDC ∝ DKq . Ce qu'il falloit demoncrer.

De plus le Rectangle ABCD , sera égal au Quarré GK. Theor. 2.

Car dans le Triangle Rectangle AGD , on a ADC ∝ DGq , & à cause de AD ∝ AB†BD , & de DGq ∝ DKq†GKq , on aura ABCD†BDCD ∝ DKq†GKq , Démonstration.

1. Fig. & étant $BDCD \simeq DKq$, par Theor. 1. il restera $ABCD \simeq GKq$. Ce qu'il falloit démontrer.

Theor. 3. Enfin le Rectangle $ACBD$, sera égal au Quarré FK .

Demonstration. Car dans le Triangle Rectangle AFD , on a $ADB \simeq DFq$, & à cause de $AD \simeq AC \dagger CD$, & de $DFq \simeq DKq \dagger FKq$, on aura $ACBD \dagger BDCD \simeq DKq \dagger FKq$, & étant $BDCD \simeq DKq$, par Theor. 1. on aura $ACBD \simeq FKq$. Ce qu'il falloit démontrer.

Nous ajouterons à ces trois Theoremes, encore les deux suivans, dont le premier est que le Rectangle $BECD$ est égal au Rectangle GKE .

Demonstration. Car dans le Triangle Rectangle GCE , on a $CGq \dagger CEq \simeq GEq$, ou par 4. 2. $CGq \dagger CDq \dagger DEq \dagger 2CDE \simeq GKq \dagger EKq \dagger 2GKE$, & à cause de $CGq \dagger CDq \simeq DKq \dagger GKq$, chaque somme étant égale à DGq , on aura $DKq \dagger GKq \dagger DEq \dagger 2CDE \simeq GKq \dagger EKq \dagger 2GKE$, & étant GKq , on aura $DKq \dagger DEq \dagger 2CDE \simeq EKq \dagger 2GKE$, & à cause de $DEq \simeq DKq \dagger EKq$, on aura $2DKq \dagger EKq \dagger 2CDE \simeq EKq \dagger 2GKE$, & étant EKq , on aura $2DKq \dagger 2CDE \simeq 2GKE$, & par consequent $DKq \dagger CDE \simeq GKE$, & encore à cause de $DKq \simeq BDC$, par Theor. 1. on aura $BDC \dagger CDE \simeq GKE$, & enfin à cause de $BD \dagger DE \simeq BE$, on aura $BECD \simeq GKE$. Ce qu'il falloit démontrer.

Theor. 4. Le second Theoreme est que le Rectangle $BDCE$ est égal au Rectangle FKE .

Demonstration. Car dans le Triangle Rectangle FBE , on a $FBq \dagger BEq \simeq EFq$, ou par 4. 2. $FBq \dagger BDq \dagger DEq \dagger 2BDE \simeq KFq \dagger KEq \dagger 2FKE$, & à cause de $FBq \dagger BDq \simeq KDq \dagger KFq$, chaque somme étant égale à DFq , on aura KDq

†KFq†DEq†2BDE ∼ KFq†KEq†2FKE, & étant 1. Fig.
 KFq, on aura KDq†DEq†2BDE ∼ KEq†2FKE,
 & à cause de DEq ∼ KDq†KEq, on aura 2KDq†
 2BDE ∼ KEq†2FKE, & étant KEq, on aura 2KDq†
 2BDE ∼ 2FKE, & par conséquent KDq†BDE ∼
 FKE, & encore à cause de KDq ∼ BDC, par Theor.
 1. on aura BDC†BDE ∼ FKE, & enfin à cause de
 DC†DE ∼ CE, on aura CEBD ∼ FKE. Ce qu'il falloit
 démontrer.

On peut trouver d'autres Theoremes, qui peuvent
 servir dans le besoin, en tirant d'autres lignes: com-
 me si on tire du point A, sur la ligne EF prolongée, la
 perpendiculaire AH, on connoitra aisément que la ligne Theor. 6.
 FH est égale à la ligne GK.

Car si l'on tire du centre I, par le point L, milieu Demon-
 de FG, la droite IL, elle sera perpendiculaire à la même tration.
 FG, par 3. 3. & par conséquent parallele aux deux AH,
 DK. D'où il est aisé de conclure que comme les deux li-
 gnes IA, IH, sont égales, aussi les deux LH, LK, se-
 ront égales, desquelles étant les deux égales LF, LG, il
 restera la ligne FH égale à la ligne GK. Ce qu'il falloit
 démontrer. D'où il suit que la somme des deux lignes
 FK, GK, est égale à la ligne HK.

On connoitra aussi sans peine, que le Rectangle AED, Theor. 7.
 est au Rectangle BEC, comme le Quarré AD, au
 Quarré HK.

Car dans les Triangles semblables FEB, GEC, on a Demon-
 cette analogie, EG, EF :: EC, EB, & si aux deux pre- tration.
 miers termes EG, EF, on donne la hauteur commune
 EG, & aux deux derniers EC, EB, la hauteur com-
 mune EC, on aura celle-cy, EGq, FEG :: ECq, BEC,

1. Fig.

ou FEG, BEC :: EGq, ECq, & si à la place des deux derniers termes EGq, ECq, on met les deux AEq, EHq, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables AHE, CGE, ou si à la place de ces deux AEq, EHq, on met les deux ADq, HKq, qui sont en même raison, à cause des paralleles AH, DK, on aura cette dernière analogie, FEG, ou ADE, BEC : ADq, HKq. Ce qu'il falloit demontrer. D'où il suit que la raison du Quarré HK, au Rectangle BEC, est égale à celle de la ligne AD, à la ligne DE.

Nous avons decouvert tous ces Theoremes par l'analyse, & on en peut trouver de la même façon une infinité d'autres, comme nous enseignerons dans nôtre Traité de l'invention des Theoremes, qui sera suivi d'un autre Traité de l'invention des Demonstrations.

QUESTION III.

1. & 4.
2. Dioph.
Probleme
plaa.

Trouver deux Nombres, tels que les raisons de leur difference à la difference & à la somme de leurs Quarrez soient données.

Pour résoudre cette Question par Geometrie, nous la proposerons plus generalement en cette sorte : Trouver deux lignes telles que les raisons du Rectangle sous leur difference & une ligne donnée, à la difference & à la somme de leurs Quarrez soient données.

3. Fig.

On propose de trouver deux lignes HC $\propto$ x, & HI $\propto$ y, en sorte que le Rectangle lx-ly, sous leur difference x-y, & la ligne donnée AO $\propto$ l, soit à la difference de leurs Quarrez xx-yy, comme AP $\propto$ r, à AQ $\propto$ f, & que le même Rectangle lx-ly, soit à la somme des

DES EQUATIONS.

13

des mêmes Quarrez $xx + yy$, comme $AR \propto a$, à $AS \propto b$. 1. Fig.

Selon les conditions de la Question, on aura ces deux analogies.

$$lx - ly, xx - yy :: r, f,$$

$$lx - ly, xx + yy :: a, b.$$

Dans la premiere on trouvera $y \propto \frac{lf}{r} - x$, qui est un Lieu à la Ligne droite, & dans la deuxième on trouvera $yy + \frac{lb}{a} \propto \frac{lb}{a} - xx$, qui est un Lieu à un Cercle donné, lequel étant joint avec le Lieu à la Ligne droite, donne la construction suivante.

Ayant fait le triangle isoscele rectangle DCE, dont chacun des côtez CD, CE, soit $\frac{lf}{r}$, ou quatrième proportionnel aux trois Lignes AP, AQ, AO; & le triangle isoscele rectangle ABC, dont chacun des côtez AB, BC, soit $\frac{lb}{a}$, ou quatrième proportionnel aux trois Lignes AR, AS, AO, décrivez du centre A, par le point C, une circonférence de Cercle, qui coupe icy la Ligne droite Locale DE, au point I, duquel vous tirerez à la Ligne DC, la perpendiculaire IH, & les deux Lignes HC, HI, seront celles qu'on cherche, de sorte que le rectangle AOHC-AOHI, sera à la difference de leurs Quarrez HCq-HIq, comme AP, à AQ, & le même rectangle AOHC-AOHI, sera à la somme de leurs Quarrez HCq+HIq, comme AR, à AS.

Construction.

La premiere partie a été démontrée dans la Quest. II. du Traité precedent, & aussi dans la Quest. I. de ce Traité. La seconde partie se démontrera dans la Question V.

Démonstration.

Pour résoudre cette Question en nombres, on trouvera dans la premiere analogie, $y \propto \frac{lf}{r} - x$, & dans la seconde on trouvera le même $y \propto R. \frac{lb}{a} + \frac{lb}{a} - xx - \frac{lb}{a}$. C'est

C

3. Fig.

pourquoy on aura cette Equation, $R. \frac{11bb}{412} + \frac{1bx}{a} - xx - \frac{1b}{12} \propto$
 $\frac{1f}{2} - x$, dans laquelle on trouvera $x \propto \frac{1b}{52} + \frac{1f}{21} - R. \frac{11bb}{422} - \frac{11ff}{411}$,
 & les deux nombres qu'on cherche, seront tels,

$$\frac{af + br - R. bbr - aaf, af - br + R. bbr - aaf}{521}$$

en negligean^t la lettre l , qui doit icy être prise pour l'uni-
 tité, laquelle n'apporte aucun changement en multipliant,
 ou en diuisant.

Si $r \propto 1$, $f \propto 6$, $a \propto 1$, & $b \propto 10$, les deux nombres
 seront 2, 4.

QUESTION IV.

1. & 4.
2. Dioph.
Problème
plan.

Trouver deux Nombres, tels que les raisons de leur
 somme & de leur différence, à la somme de
 leurs Quarrez soient données.

Pour résoudre cette Question par Geometrie, nous la
 proposerons plus generally en cette sorte: Trouver
 deux lignes telles que les raisons du Rectangle sous
 leur somme & une ligne donnée, & du Rectangle sous
 leur différence & la même ligne donnée, à la somme
 de leurs Quarrez, soient données.

4. Fig.

On propose de trouver deux lignes $HC \propto x$, & HI
 $\propto y$, en sorte que le Rectangle $lx + ly$, sous leur somme
 $x + y$, & la ligne donnée $AO \propto l$, soit à la somme
 $xx + yy$ de leurs Quarrez, comme $AP \propto r$, à AQ
 $\propto f$, & que le Rectangle $lx - ly$, sous leur différence $x - y$,
 & la même Ligne donnée $AQ \propto l$, soit à la même somme
 de leurs Quarrez $xx + yy$, comme $AR \propto a$, à $AS \propto b$.

Selon les conditions de la Question, on aura ces deux
 analogies,

$$lx + ly, xx + yy :: r, f.$$

$lx-ly, xx \dagger yy :: a, b.$

Dans la premiere on trouvera $yy - \frac{ly}{r} \propto \frac{lx}{r} - xx$, qui est un Lieu à un Cercle donné, & dans la seconde on trouvera $yy \dagger \frac{ly}{a} \propto \frac{lx}{a} - xx$, qui est un Lieu à un autre Cercle donné, lequel étant joint avec le premier, donne cette construction.

4. Fig.

Ayant fait le triangle rectangle isoscele VTC, dont chacun des côtez TV, TC, soit $\frac{lx}{2a}$, ou quatrième propor-
tionnel aux trois Lignes 2AR, AS, AO; & le triangle isoscele rectangle ABC, dont chacun des côtez BA, BC, soit $\frac{lx}{2r}$, ou quatrième proportionnel aux trois Lignes 2AP, AQ, AO, décrivez des centres V, A, par le même point C, deux circonferences de Cercle. qui se coupent icy au point I, par lequel vous tirerez à la Ligne CT prolongée, la perpendiculaire HI, & les deux Lignes HC, HI, seront celles qu'on cherche; c'est à-dire que le Rectangle AOHC $\dagger$ AOHI, sera au Rectangle HCq $\dagger$ HIq, comme AP, à AQ, & le Rectangle AOHC-AOHI, sera au même Rectangle HCq $\dagger$ HIq, comme AR, à AS.

Construc-
tion.

La premiere partie a été démontrée dans la Quest. III. du Traité precedent, & la deuxième se démontrera dans la Question suivante.

Démon-
stration.

Si vous voulez résoudre cette Question en nombres; vous trouverez dans la premiere analogie, $y \propto \frac{lx}{r} \dagger R. \frac{llr}{4rr} \dagger \frac{lx}{r} - xx$, & dans la seconde vous trouverez le même $y \propto R. \frac{llbb}{4aa} \dagger \frac{lx}{a} - xx - \frac{lb}{ca}$. C'est pourquoy on aura cette Equation, $\frac{lx}{r} \dagger R. \frac{llr}{4rr} \dagger \frac{lx}{r} - xx \propto R. \frac{llbb}{4aa} \dagger \frac{lx}{a} - xx - \frac{lb}{ca}$ dans laquelle on trouvera $x \propto \frac{bbcf + abll}{aall + bbr}$, en negligeant l'unitel, & les deux nombres qu'on cherche, seront tels,

$$\frac{bbcf + abll}{aall + bbr}$$

Si $r \propto 3, l \propto 10, a \propto 1$, & $b \propto 10$, les deux nombres seront 4, 2.

Cij

QUESTION V.

14. 1. & 4.
2. Dioph.
Probleme
solide.

Trouver deux Nombres , tels que les raisons de leur difference à la somme de leurs Quarrez , & de leur somme à leur produit , soient données.

Pour résoudre cette Question par Geometrie , nous la proposerons plus generally en cette sorte ; Trouver deux lignes , telles que les raisons du Rectangle sous leur difference & une Ligne donnée , à la somme de leurs Quarrez : & du Rectangle sous leur somme & la même Ligne donnée , à leur Rectangle , soient données.

N. Fig.

On propose de trouver deux Lignes CH $\propto$ x & HI $\propto$ y , en sorte que le rectangle lx-ly , sous leur difference x-y , & la Ligne donnée AO $\propto$ l , soit à la somme de leurs Quarrez xx+yy , comme AP $\propto$ r , à AQ $\propto$ f ; & que le rectangle lx+ly sous leur somme x+y , & la même Ligne donnée AO $\propto$ l , soit à leur Rectangle xy , comme AR $\propto$ a , à AS $\propto$ b.

Selon les conditions de la Question , on aura ces deux analogies :

$$lx-ly, xx+yy :: r, f.$$

$$lx+ly, xy :: a, b.$$

Dans la première , on trouvera $yy + \frac{ly}{r} \propto \frac{lx}{f} - xx$, qui est un Lieu à un Cercle donné , & dans la seconde on trouvera $\frac{lx}{a} \propto xy - \frac{ly}{b}$, qui est un Lieu à l'Hyperbole entre ses asymptotes , lequel étant joint avec le Lieu au Cercle , donne cette construction.

Construc-
tion.

Ayant fait le triangle isoscele rectangle ABC , dont chacun des côtez AB , BC , soit $\frac{c}{n}$, ou quatrième pro-

proportionnel aux trois lignes $2AP$, AQ , AO , faites la Ligne $CD \propto \frac{1b}{2}$, ou quatrième proportionnelle aux trois Lignes AR , AS , AO , & tirez par le point D , à la Ligne CD , la perpendiculaire indéfinie DL , sur laquelle vous prendrez la Ligne $DE \propto CD$, & vous tirerez par le point E , à la Ligne BC , la parallèle indéfinie EK . Faites $EF \propto DE$, & par le point F , tirez la Ligne FG égale & perpendiculaire à la Ligne EF . Enfin décrivez du centre A , par le point C , une circonférence de Cercle, & du centre E , par le point G , entre les asymptotes EK , EL , l'Hyperbole MGN , qui coupe icy la circonférence du Cercle aux deux points I , par lesquels on tirera sur la Ligne CB , les deux perpendiculaires IH , & chacune de ces deux Lignes HI , avec sa Ligne correspondante CH , représenteront les deux nombres qu'on cherche: de sorte que le Rectangle $AOCH \cdot AOHI$, sera au Plan $CHq \dagger HIq$, comme AP , à AQ , & le Rectangle $AOCH \dagger AOHI$, sera au Plan CHI , comme AR , à AS .

s. Fig.

Pour démontrer la première partie, prolongez les Lignes CH , HI , jusqu'à la circonférence du Cercle, en L , & en X , & tirez par le point C , à la Ligne IX , la parallèle CY , & par le point Y , où elle coupe la circonférence du Cercle, & par le centre A , tirez les Lignes CL , TV , parallèles à la Ligne CL .

Démonstration.

Cette préparation étant faite, on considérera que la Ligne HX , est égale à la somme des deux HI , CL . Car si des deux Lignes égales VI , VX , on ôte les deux égales TC , TY , ou VH , VZ , il restera $HI \propto XZ$, & à cause de $XZ \propto HX \cdot HZ$, on aura $HI \propto HX \cdot HZ$, & à cause de $HZ \propto 2AB \propto 2BC \propto CL$, on aura $HI \propto$

3. Fig.

$HX \cdot CL$, & par consequent $HX \propto HI \dagger CL$, Ce qu'il falloit démontrer.

C'est pourquoy on pourra faire cette analogie, LH , $HX :: LH$, $HI \dagger CL$, & si à la place des deux premiers termes LH , HX , on met les deux HI , CH , qui sont en même raison, par la nature du Cercle, on aura celle-cy, HI , $CH :: LH$, $HI \dagger CL$, & par consequent $HIq \dagger CLHI \propto CHLH$ ou $HIq \dagger CLHI \propto CLCH \cdot CHq$, à cause de $LH \propto CL \cdot CH$, & par l'antisitheze, on aura $CLCH \cdot CLHI \propto CHq \dagger HIq$, ou $2ABCH \cdot 2ABHI \propto CHq \dagger HIq$, à cause de $CL \propto 2AB$, & donnant à chaque plan la hauteur commune AP , on aura $2ABAPCH \cdot 2ABAPHI \propto APCHq \dagger APHIq$, & si à la place de $2ABAP$, on met $AOAQ$, qui luy est égal, à cause des quatre proportionnelles $2AP$, AQ , AO , AB , par la construction, on aura cette dernière Equation, $AOAQCH \cdot AOAQHI \propto APCHq \dagger APHIq$, & par consequent cette analogie, $AOCH \cdot AOHI$, $CHq \dagger HIq :: AP$, AQ . Ce qui est l'une des deux choses qu'il falloit démontrer.

Pour la demonstration de la seconde partie, on considerera que par la propriété de l'Hyperbole entre ses asymptotes, on a cette analogie, EK , $EF :: FG$, KI , ou EK , $EF :: EF$, KI : C'est pourquoy en composant on aura celle-cy, $EK \dagger EF$, $EF :: EF \dagger KI$, KI , ou CH , $EF :: HI$, KI , & en permutant on aura celle-cy, CH , $HI :: EF$, KI , & en composant on aura celle-cy, CH , $CH \dagger HI :: EF$, $EF \dagger KI$, ou CH , $CH \dagger HI :: EF$, HI , & par consequent $CHI \propto CHEF \dagger HIEF$. C'est pourquoy on pourra faire cette analogie, $CHEF \dagger HIEF$, $EFq :: CHI$, EFq , & à cause de la hauteur EF , qui est commune.

aux deux premiers termes on aura cette autre analogie, CH † HI, EF :: CHI, EFq, & si on donne aux deux premiers termes, la hauteur commune AO, on aura celle-cy, AOCH † AOHI, AOEF :: CHI, EFq, & en permutant on aura celle-cy, AOCH † AOHI, CHI :: AOL, EFq, & à cause de la hauteur EF, qui est commune aux deux derniers termes, on aura celle-cy, AOCH † AOHI, CHI :: AO, EF, & si à la place des deux derniers termes AO, EF, ou AO, CO, on met les deux AR, AS, qui sont en même raison, à cause des quatre proportionnelles AR, AS, AO, AQ, on aura cette dernière analogie, AOCH † AOHI, CHI :: AR, AS. Ce qui restoit à démontrer.

Si vous voulez résoudre cette Question en nombres, dans la première analogie, vous trouverez $y \propto R \frac{11x}{4rr} + \frac{16x}{c} - XX - \frac{16}{2c}$ & dans la seconde vous trouverez le même $y \propto \frac{16x}{2x-b}$. C'est pourquoi vous aurez cette Equation, $R \frac{11x}{4rr} + \frac{16x}{c} - XX - \frac{16}{2c} \propto \frac{16x}{2x-b}$, on $x^3 - \frac{16xx}{2x-b} + \frac{16xx}{2x-b} + \frac{16b^2}{2x-b} + \frac{16b^2}{2x-b} \propto \frac{16b^2}{2x-b}$ ou $x^3 - \frac{16xx}{2x-b} + \frac{16xx}{2x-b} \propto \frac{16b^2}{2x-b}$ si $r \propto 1$, $b \propto 6$, $a \propto 1$, & $b \propto 2$, & en supposant toujours $1 \propto 1$, & dans cette dernière Equation vous trouverez $x \propto 4$, & aussi $x \propto \frac{1}{2} R89 + \frac{11}{2}$, & au lieu de $y \propto \frac{16x}{2x-b}$, on de $y \propto \frac{4x}{x-4}$ on aura $y \propto 2$, & aussi $y \propto \frac{1}{2} R89 - \frac{11}{2}$. Ainsi les deux nombres qu'on cherche seront 4° , 2° , & aussi $\frac{R89 + 11}{2}$, parceque cette Question a deux solutions, comme vous avez vu dans la construction Geometrique.

QUESTION VI.

Probleme
solide.

Trouver un Triangle isoscele, dont le contour
& l'aire sont donnez.

6. Fig.

On propose de trouver un triangle isoscele ACB, dont le contour soit égal à la Ligne donnée AE, & dont l'aire soit égale au Quarré de la Ligne donnée AF.

Supposant que la Question soit déjà résolue, c'est à-dire que le triangle ACB soit déjà trouvé, tirez de son sommet C, sur la base AB, la perpendiculaire CD, qui divisera cette base AB en deux également au point D. Après cela supposez

$$AE \sim 2a.$$

$$AF \sim b.$$

$$CD \sim x.$$

pour avoir AD, ou BD $\sim \frac{bb}{x}$ à cause de ADC $\sim$ AFq, par la supposition, & par conséquent AB $\sim \frac{2bb}{x}$ & AC ou BC $\sim R. xx + \frac{bb}{xx}$; & parceque le contour doit être égal à la Ligne donnée AE $\sim 2a$, on aura cette Equation, $\frac{2bb}{x} + 2R. xx + \frac{bb}{xx} \sim 2a$, ou $x^3 - aax + 2abb \sim 0$, qu'il sera facile de reduire en deux Lieux, & de les joindre ensemble par les preceptes du Probl. V. ou bien on pourra trouver immédiatement deux Lieux, en faisant cette autre analyse, c'est à-dire en supposant

$$AE \sim 2a.$$

$$AF \sim b.$$

$$CD \sim x.$$

$$AD \sim y \sim BD.$$

Parce que l'aire du triangle ACB, doit être égale au Quarré bb, de la Ligne AE $\sim b$, on aura cette Equation,

DES EQUATIONS.

21

tion ; $xy \propto bb$, qui est un Lieu à l'Hyperbole entre ses asymptotes, & dans le triangle rectangle ADC, ou BDC, on aura AC ou $BC \propto R. xx + yy$, & le contour du triangle ACB, sera $2R. xx + yy + 2y$. C'est pourquoy on aura cette Equation, $2R. xx + yy + 2y \propto 2a$, ou $aa - 2ay \propto xx$, qui est un Lieu à une Parabole donnée, dont le Parametre est $2a$, ou AE. Ce Lieu étant joint avec le precedent, donne la construction suivante.

Ayant fait $AG \propto \frac{1}{2} AE$, décrivez sur l'axe GE, par le point G, la Parabole HGI, dont le Parametre soit égal à la Ligne donnée AE. Tirez par le point A, à la même Ligne donnée AE, la perpendiculaire indéfinie AL, pour y prendre la Ligne AN égale à l'autre Ligne donnée AF, & pour tirer du point N, à la Ligne AL, la perpendiculaire NO $\propto$ AN. Enfin décrivez du centre A, par le point O, entre les asymptotes AE, AL, l'Hyperbole POQ, qui coupe icy la Parabole HGI, aux deux points C, desquels on tirera sur la Ligne AE, les deux perpendiculaires CD, & ayant fait $DB \propto DA$, le triangle ACB, sera celui qu'on cherche, lequel se trouve icy double, de sorte que son contour sera égal à la Ligne donnée AE, & son aire sera égale au Quarré de la Ligne donnée AF.

Car il est déjà bien évident par la propriété des asymptotes, que l'aire du triangle ACB, ou le Rectangle ADC, est égale au Quarré de la Ligne donnée AF, ou au Rectangle ANO. Il ne reste donc plus qu'à démontrer que le contour du même triangle ACB, est égal à la Ligne donnée AE, ou au Parametre de la Parabole HGI.

Pour cette fin on considérera que par la nature de la Parabole, on a cette Equation, $AEGD \propto CDq$, &

D

Construction.

Démonstration.

4. Fig. à cause de $GD \propto AG-AD \propto \frac{1}{2} AE-AD$, & de $CDq \propto ACq-ADq$, on aura $\frac{1}{2} AEq-AEAD \propto ACq-ADq$, & par l'antithese on aura $\frac{1}{2} AEq-AEAD + ADq \propto ACq$, & par 4. 2. on aura $\frac{1}{2} AE-AD \propto AC$, ou $\frac{1}{2} AE \propto AC + AD$, & par consequent $AE \propto 2AC + 2AD \propto AC + BC + AB$. Ce qu'il falloit démontrer.

4. Fig. Pour faire une détermination touchant les deux Lignes données AE, AF , afin que la Question proposée soit toujours possible, supposons que les deux Lignes Locales HCI, PCQ , se touchent au point C , auquel cas on n'aura qu'un Triangle ACB , & le côté CB touchera l'Hyperbole PCQ en ce point C , par la propriété des asymptotes, à cause des deux Lignes égales AD, DB . C'est pourquoy il touchera aussi la Parabole HGI , au même point C , & par la propriété de la touchante de la Parabole, les Lignes GB, GD , seront égales, ce qui fait que la Ligne BD , ou AD , sera double de la Ligne GD , & par consequent la Ligne AG triple de la même Ligne GD ; & à cause de $AG \propto \frac{1}{2} a$, on aura $GD \propto \frac{1}{2} a$, & par consequent $CD \propto R \frac{a}{3}$, par la nature de la Parabole, & $AD \propto \frac{1}{2} a$. Et parce que le Rectangle ANO , ou bb est égal au Rectangle ADC , ou $\frac{1}{2} aR \frac{a}{3}$, par la propriété des asymptotes, on aura cette Equation $\frac{1}{2} aR \frac{a}{3} \propto bb$, ou $16a^3 \propto 432b^3$, & consequent $2a \propto bRR_{432}$, & reduisant cette Equation en proportion, on aura cette analogie, $2a, b$; ou $AE, AF :: RR_{432}, 1$, qui fait connoître que donnant 1 à la ligne AF , la ligne AE doit valoir RR_{432} , lorsque les deux Lignes Locales se touchent. D'où il est aisé de conclure qu'afin qu'elles puissent se couper, pour avoir deux triangles isocèles de même aire & de même con-

tour, en donnant 1 à la ligne AF, on doit donner à la ligne AE, un peu plus que RR_{432} , comme par exemple, 5, mais non pas $4\frac{1}{2}$. 7. Fig.

S C O L I E.

Ainsi vous voyez qu'on peut trouver deux triangles isosceles de même aire & de même contour, mais non pas davantage, parceque les deux Lignes Locales ne se peuvent couper qu'en deux points.

Si vous voulez trouver en nombres deux sembla- e. & 7. Fig.
bles triangles, comme ABC, EFG, en sorte que les per-
pendiculaires BD, FG, & toutes les autres lignes soient
exprimées par des nombres rationnels, formez de a &
de b, ce triangle Rectangle, 2ab, aa-bb, aa+bb,
& supposez

$$AD \propto 2ab \propto CD.$$

$$AC \propto 4ab.$$

$$BD \propto aa-bb.$$

$$AB \propto aa+bb \propto BC.$$

Pareillement formez de c & de d, ce triangle rectan-
gle, 2cd, cc-dd, cc+dd. & supposez

$$EH \propto 2cd \propto GH.$$

$$EG \propto 4cd.$$

$$FH \propto cc-dd.$$

$$EF \propto cc+dd \propto FG.$$

Le contour du triangle ABC sera $2aa+4ab+2bb$,
& son aire sera $2a'b-2ab'$. Le contour du triangle EFG,
sera $2cc+4cd+2dd$, & son aire sera $2c'd-2cd'$.

Comme ces deux contours doivent être égaux entre-
eux, & ces deux aires pareillement égales entre-elles,
leurs moitiés seront aussi égales, & l'on aura ces deux
Equations.

Dij

1. & 9.
fig.

$$aa + 2ab + bb \propto cc + 2cd + dd.$$

$$a'b - ab' \propto c'd - cd'.$$

Dans la premiere on trouvera $a + b \propto c + d$, & si l'on suppose $a + b \propto m$, on aura $m \propto c + d$, & consequemment $b \propto m - a$, & $d \propto m - c$, & la deuxieme Equation se changera en celle cy, $3aamm - am^2 - 2a^2m \propto 3ccmm - cm^2 - 2c^2m$, ou $3aam - amm - 2a^2 \propto 3ccm - cmm - 2c^2$, ou $cmm - amm + 3aam - 3ccm \propto 2a^2 - 2c^2$, laquelle étant divisée par $c - a$, on aura cette autre Equation, $mm - 3am - 3cm \propto -2aa - 2ac - 2cc$, dans laquelle on trouvera $m \propto \frac{12 + 16}{1} + \frac{1}{2} R. aa + 10ac + cc$. Ainsi on aura cette Puissance à éгалer au Quarré, $aa + 10ac + cc$, pour le côté duquel prenant $a + \frac{16}{a}$ on trouvera

$$a \propto ff - nn.$$

$$c \propto 10nn - 2ff.$$

$$m \propto ff + 2fn + 13nn.$$

$$b \propto 2fn + 14nn.$$

$$d \propto ff + 4fn + 3nn.$$

& les lignes des deux triangles qu'on cherche, seront de cette grandeur,

$$\begin{aligned} \text{ABC} \left\{ \begin{aligned} AD &\propto 4f^2n + 28ffnn - 4fn^2 - 28n^4 \propto CD \propto 12. \\ AC &\propto 8f^2n + 56ffnn - 8fn^2 - 56n^4 \propto 24. \\ AB &\propto f^4 + 56fn^2 + 2ffnn + 197n^4 \propto BC \propto 37. \\ BD &\propto f^4 - 56fn^2 - 6ffnn - 195n^4 \propto 35. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EFG} \left\{ \begin{aligned} EH &\propto 60n^4 + 68fn^2 + 4ffnn - 4f^2n \propto GH \propto 20. \\ EG &\propto 120n^4 + 136fn^2 + 8ffnn - 8f^2n \propto 40. \\ EF &\propto 109n^4 - 16fn^2 + 26ffnn + 8f^2n + f^4 \propto FG \propto 29. \\ FH &\propto 91n^4 - 64fn^2 - 18ffnn - 8f^2n - f^4 \propto 21. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Si l'on suppose $f \propto 2$, & $n \propto 1$, ou $f \propto 1$, & $n \propto 2$, les lignes des deux triangles qu'on cherche, seront telles que vous les voyez icy marquées à la droite.

DES EQUATIONS.

15

Si vous voulez une autre solution indefinite, sup-
posez

Fig. 2. &c.

$$\begin{aligned} & \left. \begin{array}{l} \text{ABC} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{AD} \propto \text{aa} - \text{bb} \propto \text{CD}. \\ \text{AC} \propto 2\text{aa} - 2\text{bb}. \\ \text{BD} \propto 2\text{ab}. \\ \text{AB} \propto \text{aa} + \text{bb} \propto \text{BC}. \end{array} \\ & \left. \begin{array}{l} \text{EFG} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{EH} \propto \text{cc} - \text{dd} \propto \text{GH}. \\ \text{EG} \propto 2\text{cc} - 2\text{dd}. \\ \text{FH} \propto 2\text{cd}. \\ \text{EF} \propto \text{cc} + \text{dd} \propto \text{FG}. \end{array} \end{aligned}$$

Le contour du triangle ABC sera 4aa , & son aire sera $2\text{ab} - 2\text{ab}$. Le contour du triangle EFG sera 4cc , & son aire sera $2\text{cd} - 2\text{cd}$. Et comme les deux contours doivent être égaux, aussi-bien que les aires, leurs moitiés seront égales, & l'on aura ces deux Equations,

$$2\text{aa} \propto 2\text{cc}.$$

$$\text{a}^2\text{b} - \text{ab}^2 \propto \text{c}^2\text{d} - \text{cd}^2.$$

Dans la premiere, on trouvera $\text{a} \propto \text{c}$, & la deuxième se changera en celle-cy, $\text{c}^2\text{b} - \text{cb}^2 \propto \text{c}^2\text{d} - \text{cd}^2$, dans laquelle on trouvera $\text{c} \propto \text{R. bb} + \text{bd} + \text{dd}$, & l'on aura cette Puissance à égalet au Quarré, $\text{bb} + \text{bd} + \text{dd}$, pour le côté duquel prenant $\frac{\text{md}}{\text{n}}$ b, on trouvera

$$\text{b} \propto \text{mm} - \text{nn}.$$

$$\text{d} \propto \text{nn} + 2\text{mn}.$$

$$\text{c} \propto \text{mm} + \text{mn} + \text{nn} \propto \text{a}.$$

& les lignes des deux triangles qu'on cherche, seront celles,

$$\begin{aligned} & \left. \begin{array}{l} \text{ABC} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{AD} \propto 2\text{m}^2\text{n} + 5\text{mmnn} + 2\text{mn}^2 \propto \text{CD} \propto 20. \\ \text{AC} \propto 4\text{m}^2\text{n} + 10\text{mmnn} + 4\text{mn}^2 \propto 40. \\ \text{AB} \propto 2\text{m}^2 + 2\text{m}^2\text{n} + \text{mmnn} + 2\text{mn}^2 + 2\text{n}^2 \propto \text{BC} \propto 20. \\ \text{BD} \propto 2\text{m}^2 + 2\text{m}^2\text{n} - 2\text{mn}^2 - 2\text{n}^2 \propto 21. \end{array} \end{aligned}$$

Fig. 9.

$$\begin{aligned}
 \text{EH} &\propto m' + 2m'n - mmmn - 2mn' \propto \text{GH} \propto 12. \\
 \text{EG} &\propto 2m^2 + 4m'n - 2mmn - 4mn' \propto 24. \\
 \text{EF} &\propto m' + 2m + 7mmn + 6mn' + 2n \propto \text{FG} \propto 37. \\
 \text{FH} &\propto 4mn' + 6mmn + 6mn' + 2n \propto 35.
 \end{aligned}$$

*Si l'on suppose $m \propto 2$, & $n \propto 1$, ou $m \propto 1$, & $n \propto 2$,
les lignes des deux triangles qu'on cherche seront de telle
grandeur que vous les voyez marquées à la droite.*





PROBLEME I.

*D'un Lieu à la Ligne droite, & d'un Lieu
à la Parabole, tirer deux Lieux
au Cercle.*

Lieux $\{ x \dagger y \sim b.$ Lieu à la Ligne droite.

donnez $\{ xx \sim ay.$ Lieu à la Parabole.

$y \sim b - x.$ Lieu changé

$yy \sim bb - 2bx \dagger xx.$

$- 2ay \sim - 2xx$

$yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx.$ Lieu au Cercle.

$x \sim b - y.$ Lieu changé.

$xx \sim bb - 2by \dagger yy.$

$- 2xx \sim - 2ay.$

$- xx \sim bb - 2by - 2ay \dagger yy.$ Lieu au Cercle.

Proposons ce Lieu à la Ligne droite, $x \dagger y \sim b$,
& ce Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$. Pour en tirer
deux Lieux au Cercle, changez le Lieu à la Ligne
droite $x \dagger y \sim b$, en celuy-cy, $y \sim b - x$, & ôtez de
son Quarré $yy \sim bb - 2bx \dagger xx$ le double du Lieu à la
Parabole, $2xx \sim 2ay$, & il viendra ce premier Lieu:

au Cercle , $yy \cdot ay \sim bb \cdot bx \cdot xx$, dont le Rayon est $R. aa \dagger 2bb$, comme l'on connoitra en ôtant les seconds termes.

Ou bien changez le Lieu à la Ligne droite ; $x \dagger y \sim b$, en celui-cy , $x \sim b \cdot y$, & ôtez de son Quarré $xx \sim bb \cdot by \dagger yy$, le double du Lieu à la Parabole , $2xx \sim 2yy$, pour avoir ce second Lieu au Cercle , $-xx \sim bb \cdot by - 2ay \dagger yy$, dont le Rayon est $R. aa \dagger 2ab$.

Par le moyen de ce Probleme , on reduira aisément une Equation de deux dimensions en trois Lieux , dont l'un soit à la Ligne droite , & les deux autres au Cercle , parce qu'on la peut reduire sans peine en deux Lieux , dont l'un soit à la Ligne droite , & l'autre à la Parabole , comme vous allez voir dans le Probleme suivant.

PROBLEME II.

Reduire une Equation de deux dimensions en quatre Lieux , dont l'un soit à la Ligne droite , l'autre à la Parabole , & les deux autres au Cercle.

Toutes les Equations possibles de deux dimensions , se peuvent reduire à l'une des trois suivantes.

$$xx \dagger ax \sim ab.$$

$$xx - ax \sim ab.$$

$$xx \cdot ax \sim ab.$$

Première
Equation.

Pour reduire la premiere Equation , $xx \dagger ax \sim ab$; supposez ce Lieu à la Parabole , $xx \sim ay$, & mettant ay à la place de xx , l'Equation proposée $xx \dagger ax \sim ab$, se changera en celle-cy , $ay \dagger ax \sim ab$, ou $y \dagger x \sim b$, qui est un Lieu à la Ligne droite , par le moyen

inoyen duquel & de celuy à la Parabole, $xx \sim ay$, on trouvera deux Lieux au Cercle, comme nous avons enseigné au Probleme precedent, ce que nous repeterons encore icy.

Premiere
Equation.

Ayant changé le Lieu à la Ligne droite $y \dagger x \sim b$, en celuy-cy, $y \sim b - x$, ôtez de son Quarré $yy \sim bb - 2bx \dagger xx$ le double du Lieu à la Parabole, $2xx \sim 2ay$, pour avoir ce premier Lieu au Cercle, $yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx$, dont le Rayon est $R. aa \dagger 2bb$.

Ou bien ayant changé le Lieu à la Ligne droite, $y \dagger x \sim b$, en celuy-cy, $x \sim b - y$, ôtez de son Quarré $xx \sim bb - 2by \dagger yy$, le double du Lieu à la Parabole, $2xx \sim 2ay$, pour avoir cet autre Lieu au Cercle, $-xx \sim bb - 2by - 2ay \dagger yy$, dont le Rayon est $R. aa \dagger 2ab$. Ainsi la premiere Equation, $xx \dagger ax \sim ab$, se trouve reduite en ces quatre Lieux.

$x \dagger y \sim b$. A la Ligne droite.

$xx \sim ay$. A la Parabole.

$yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx$. Au Cercle.

$yy - 2ay - 2by \sim -bb - xx$. Au Cercle.

C'est de la même façon que la deuxième Equation, $xx - ax \sim ab$, se reduira en ces quatre Lieux.

Seconde
Equation.

$-x \dagger y \sim b$. A la Ligne droite.

$xx \sim ay$. A la Parabole.

$yy - 2ay \sim bb \dagger 2bx - xx$. Au Cercle.

$yy - 2ay - 2by \sim -bb - xx$. Au Cercle.

C'est aussi de la même façon que la troisième Equation $xx - ax \sim -ab$, se reduira en ces quatre Lieux.

Troisième
Equation.

$-x \dagger y \sim -b$. A la Ligne droite.

$xx \sim ay$. A la Parabole.

Troisième
Equation.

$$yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx. \text{ Au Cercle.}$$

$$yy - 2ay \dagger 2by \sim -bb - xx. \text{ Au Cercle.}$$

Abregé de
la Regle pre-
cedente.

On tire de cette Regle generale l'abregé suivant , pour reduire une Equation de deux dimensions en quatre Lieux , dont l'un soit à la Ligne droite , l'autre à la Parabole , & les deux autres au Cercle.

$$xx \dagger ax \sim ab. \text{ Equation proposée.}$$

$$xx \sim ay \text{ Lieu supposé à la Parabole.}$$

$$x \dagger y \sim b. \text{ Lieu supposé à la Ligne droite.}$$

$$y \sim b - x \text{ Lieu changé.}$$

$$yy \sim bb - 2bx \dagger xx.$$

$$-2ay \sim -2xx.$$

$$yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx. \text{ Lieu au Cercle.}$$

$$x \sim b - y \text{ Lieu changé.}$$

$$xx \sim bb - 2by \dagger yy.$$

$$-2xx \sim -2ay.$$

$$-xx \sim bb - 2by - 2ay \dagger yy. \text{ Lieu au Cercle.}$$

Pour reduire par exemple la premiere Equation , $xx \dagger ax \sim ab$, supposez ce Lieu à la Parabole , $xx \sim ay$, & ce Lieu à la Ligne droite $x \dagger y \sim b$, en donnant toujours $\dagger$ à la quantité y , & aux quantitez b , x , les mêmes Signes qu'elles ont dans l'Equation proposée. Si vous changez le Lieu à la Ligne droite , $x \dagger y \sim b$, en ces deux $y \sim b - x$, $x \sim b - y$, & que de leurs Quarrez $yy \sim bb - 2bx \dagger xx$, $xx \sim bb - 2by \dagger yy$, vous en ôtiez le double du Lieu à la Parabole , $2xx \sim 2ay$, il restera ces deux Lieux au Cercle , $yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx$, $yy - 2ay - 2by \sim -bb - xx$.

Si vous voulez que le Lieu au Cercle soit donné , de sorte que son Rayon soit par exemple égal à la quantité donnée d , choisissez une quantité indeter-

DES EQUATIONS.

31

minée, comme r , & supposez $x \sim \frac{ax}{r}$, afin que l'Equation proposée $xx + ax \sim ab$, se change en celle-cy, $xx + rx \sim \frac{brr}{r}$, qu'on reduira par l'abregé precedent, en ces quatre Lieux.

Abregé de
la Regle pre-
cedente.

$$y + z \sim \frac{br}{a}. \text{ A la Ligne droite.}$$

$$zz \sim ry. \text{ A la Parabole.}$$

$$yy - 2ry \sim \frac{bbrr}{aa} - \frac{abrz}{a} - zz. \text{ Au Cercle.}$$

$$yy - 2ry - \frac{abry}{a} \sim -bb - zz. \text{ Au Cercle.}$$

Et si on veut que le premier Cercle soit donné, on égalera son Rayon $R.rr + \frac{bbrr}{aa}$ au Rayon donné d , pour avoir $r \sim R. \frac{aadd}{aa + bbb}$. Pareillement si l'on veut que le second Cercle soit donné, on égalera son Rayon, $R.rr + \frac{bbr}{a}$, au Rayon donné d , pour avoir $r \sim R. \frac{a^2d}{a^2 + b}$.

Il ne reste plus qu'à vous enseigner le moyen de joindre ensemble deux de ces Lieux, pour pouvoir connoître en lignes les Racines d'une Equation de deux dimensions, sçavoir le Lieu à la Ligne droite avec l'un des deux au Cercle, ou les deux au Cercle ensemble, sans toucher au Lieu à la Parabole, qui ne doit servir que pour les Equations plus élevées.

PROBLEME III.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de deux dimensions.

Premiere
Methode.

Toutes les Equations possibles de deux dimensions, se peuvent reduire à l'une des trois suivantes.

$$xx + ax \sim ab.$$

$$xx - ax \sim ab.$$

$$xx - ax \sim -ab.$$

Pour trouver les Racines de la premiere Equation,

E ij

Premiere
Equation.

Premiere
Equation.

$xx + ax \sim ab$, dont les trois Lieux convenables ont été trouvez tels, au Probleme precedent,

$x + y \sim b$. *A la Ligne droite.*

$yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx$. *Au Cercle.*

$yy - 2ay - 2by \sim -bb - xx$. *Au Cercle.*

10. Fig.

& premierement en joignant le Lieu à la Ligne droite $x + y \sim b$, avec le premier Lieu au Cercle $yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx$, dont le Rayon est $R. aa + 2bb$, tirez les deux Lignes perpendiculaires AB, AC, égales chacune à la quantité donnée b , & menez par le point C, du côté de B, la Ligne CE parallele à AB, & égale à l'autre quantité donnée a . Prolongez la Ligne CA en D, en sorte que la Ligne CD soit égale à l'hypoténuse BC, du triangle isoscele rectangle ABC, & décrivez du centre E par le point D, une circonférence de Cercle, qui se trouve icy coupée par la Ligne Locale FBG, perpendiculaire à l'hypoténuse BC; aux deux points F, G, d'où l'on tirera sur la Ligne AB, prolongée les perpendiculaires FH, GI, dont la moindre FH sera la Racine veritable, & la plus grande GI sera la Racine fausse de l'Equation proposée $xx + ax \sim ab$.

Demonstration.

Car à cause de $AB \sim b \sim AC$, on aura BC , ou $CD \sim R. 2bb$. Et à cause de $CE \sim a$, on aura ED , ou $EF \sim R. aa + 2bb$. Parce que l'angle ABC est droit, & que l'angle FBC est droit, l'angle ABF sera aussi droit, aussi-bien que l'angle HFB, & si on suppose $FH \sim x$, on aura aussi $HB \sim x$, & par conséquent AH , ou $CK \sim b - x$, laquelle étant ôtée de $CE \sim a$, on aura $KE \sim a - b + x$, & dans le triangle rectangle FKE, on trouvera cette Equation, $aa - 2ab$

$\dagger bb \dagger 2xx \sim aa \dagger 2ab$, ou $xx \dagger ax \sim ab$, qui est la même que la proposée. D'où il suit que la Ligne FH est la Racine véritable de l'Equation proposée $xx \dagger xx \sim ab$. Ce qui est l'une des deux choses qu'il falloit démontrer.

10. Fig.

La même Equation $xx \dagger ax \sim ab$, viendra aussi en supposant GI $\sim -x$, car à cause de IN $\sim b$, on aura GN $\sim -x - b$, & à cause du Rayon ED, ou EG $\sim R.aa \dagger 2bb$, on aura EN $\sim R.aa \dagger bb - 2bx - xx$, à laquelle ajoutant CE $\sim a$, on aura CN, ou AI $\sim R.aa \dagger bb - 2bx - xx \dagger a$, d'où ôtant GI, ou BI $\sim -x$, il restera AB, ou $b \sim R.aa \dagger bb - 2bx - xx \dagger a \dagger x$, ou $b - a - x \sim R.aa \dagger bb - 2bx - xx$, ou $bb - 2ab \dagger aa - 2bx \dagger 2ax \dagger xx \sim aa \dagger bb - 2bx - xx$, ou $xx \dagger ax \sim ab$, qui est la même chose que l'Equation proposée. D'où il suit que la Ligne GI est la Racine fausse de l'Equation proposée $xx \dagger ax \sim ab$. Ce qui restoit à démontrer.

Pour trouver les Racines de la deuxième Equation $xx - ax \sim ab$, dont les trois Lieux convenables ont été trouvez tels, par le Probleme precedent,

Seconde
Equation.

$-x \dagger y \sim b$. *A la Ligne droite.*

$yy - 2xy \sim bb \dagger 2bx - xx$. *Au Cercle.*

$yy - 2xy - 2by \sim -bb - xx$. *Au Cercle.*

& premierement en joignant le Lieu à la Ligne droite $-x \dagger y \sim b$, avec le premier Lieu au Cercle, $yy - 2xy \sim bb \dagger 2bx - xx$, dont le Rayon est $R.aa \dagger 2bb$, comme auparavant, on fera une construction semblable à la precedente, & des deux Racines GI, FH, la plus grande GI sera la véritable, & la plus petite FH la fausse, & la demonstration s'en fera comme auparavant, sçavoir en supposant FH $\sim -x$, ou GI

10. Fig. $\sim x$, car il viendra l'Equation proposée $xx - ax \sim ab$.

Troisième Equation. Pour trouver les Racines de la troisième Equation, $xx - ax \sim -ab$, dont les trois Lieux convenables ont été trouvez tels, par le Probleme precedent,

$-x \dagger y \sim -b$. *A la Ligne droite.*

$yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx$. *Au Cercle.*

$yy - 2ay \dagger 2by \sim -bb - xx$. *Au Cercle.*

& premierement en joignant le Lieu à la Ligne droite $-x \dagger y \sim -b$, avec le premier Lieu au Cercle, $yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx$, dont le Rayon est le même qu'auparavant, sçavoir $R.aa \dagger 2bb$; on fera une construction semblable à la precedente, excepté que la Ligne CE $\sim a$, doit être mise de l'autre côté vers L, & alors les deux perpendiculaires FH, GI, seront les Racines veritables de l'Equation proposée $xx - ax \sim -ab$, & la demonstration s'en fera comme auparavant, si l'on suppose FH $\sim x$, & GI $\sim x$.

Determin.
nation.

Ces deux Racines veritables FH, GI, ont icy besoin de determination, laquelle se fera en cette sorte. Si $a \sim 4b$, c'est à-dire si la Ligne CE est quadruple de la Ligne AB, les deux Racines FH, GI, seront égales, parce que dans cette supposition la Ligne Locale BG, ne fera que toucher la circonference du Cercle Local LGM, comme il est aisé à démontrer: c'est pourquoy quand la Ligne AB fera plus grande que le quart de la Ligne CE, les deux Lignes Locales ne se rencontreront point, & les deux Racines FH, GI, seront imaginaires. Ainsi vous voyez qu'afin que les deux Racines de l'Equation proposée $xx - ax \sim -ab$, soient réelles il ne faut pas que $\frac{1}{4} a$ soit moindre que b .

S C O L I E.

10. & 11.
Fig.

Bien-que cette Methode soit un peu plus longue que la commune , pour les Equations d'une forme semblable à celle que nous avons proposée , elle a néanmoins de l'avantage pour les Equations de cette forme.

$$xx + ax \sim R. \frac{abb - aa}{a}$$

$$xx - ax \sim R. \frac{abb - aa}{a}$$

$$xx - ax \sim -R. \frac{abb - aa}{a}$$

Car le Rayon du premier Lieu au Cercle sera exprimé par la seule Lettre b , & la construction sera si l'on veut , la même qu'auparavant , excepté qu'on doit faire les Lignes AB , AC , égales chacune à $R. \frac{bb - aa}{a}$, pour avoir BC , ou $CD \sim R. bb - aa$, & par conséquent le Rayon $ED \sim b$. Ou bien on peut commencer par le Cercle , dont le Rayon est b , & prendre sur le Diametre LM , la Ligne $EC \sim a$, depuis le centre E vers L , pour les deux premières Equations , & vers M , pour la troisième Equation , pour tirer du point C , à la Ligne LM , la perpendiculaire CD , que l'on considerera comme la diagonale d'un Quarré , dont le côté donnera la Ligne $AC \sim AB$, &c.

10. & 11.
Fig.

P R O B L E M E I V.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de deux dimensions.

Seconde
Methode.

Nous avons déjà dit , que les Equations possibles de deux dimensions se peuvent reduire à l'une de ces trois ,

12. & 13.
Fig.

$$xx + ax \sim ab.$$

$$xx - ax \sim ab.$$

$$xx - ax \sim -ab.$$

que nous refoudrons icy en joignant le Lieu à la Ligne droite avec le second Lieu au Cercle.

Première
Equation.

Pour trouver les Racines de la première Equation, $xx + ax \sim ab$, en joignant ces deux Lieux,

$$x + y \sim b. \text{ A la Ligne droite.}$$

$$yy - 2ay - 2by \sim -bb - xx. \text{ Au Cercle.}$$

12. Fig.

Tirez la Ligne AB égale à la quantité connue a , & la prolongez en C, en sorte que la Ligne BC soit égale à l'autre quantité connue b , & décrivez à l'entour de la Ligne AC, le demicercle ADC, pour y inscrire la droite CD $\sim$ CB; & pour décrire du centre A, par le point D, une circonférence de Cercle, qui se trouve icy coupée par la Ligne Locale EF, qui fait en B, avec BC un angle demidroit, aux deux points E, F, desquels on tirera sur la Ligne AC, prolongée, les perpendiculaires EH, FG, qui seront les deux Racines de l'Equation proposée $xx + ax \sim ab$, la plus petite EH étant la Racine véritable, & la plus grande FG, la fausse.

Démonstration.

Car si l'on suppose $EH \sim x$, on aura aussi $BH \sim x$, à cause de l'angle B demidroit, & par conséquent $AH \sim a + x$, à cause de $AB \sim a$: & à cause de $BC \sim b \sim CD$, on aura $AC \sim a + b$, & par conséquent AD, ou AE $\sim R.aa + 2ab$, & dans le triangle rectangle AHE, on trouvera cette Equation $aa + 2ax + 2xx \sim aa + 2ab$, ou $xx + ax \sim ab$, qui est la même que la proposée. D'où il suit que la Ligne EH en est la Racine véritable. Ce qui est l'une des deux choses qu'il falloit démontrer.

Pareillement

Pareillement si l'on suppose $FG \sim -x$, on aura aussi $GB \sim -x$, & par conséquent $AG \sim -x-a$, & dans le Triangle rectangle AGF, on trouvera cette Equation, $aa + 2ax + 2xx \sim aa + 2ab$, ou $xx + ax \sim ab$, qui est la même que la proposée. D'où il suit que la Ligne FG en est la Racine fautive. Ce qui restoit à démontrer.

11. Fig.

Pour trouver les Racines de la seconde Equation, $xx - ax \sim ab$, en joignant ensemble ces deux Lieux.

Deuxième Equation.

$-x + y \sim b$. *A la Ligne droite.*

$yy - 2ay - 2by \sim -bb - xx$. *Au Cercle.*

On fera une construction semblable à la précédente, & des deux Racines FG, EH, la plus grande FG sera la véritable, & la plus petite EH la fautive, & la démonstration s'en fera de la même façon; si l'on suppose $FG \sim x$, & $EH \sim -x$.

Pour trouver les Racines de la troisième Equation, $xx - ax \sim -ab$, par le moyen de ces deux Lieux.

Troisième Equation.

$-x + y \sim -b$. *A la Ligne droite.*

$yy - 2ay + 2by \sim -bb - xx$. *Au Cercle.*

On fera une construction semblable à la précédente, excepté qu'on doit ôter de la Ligne AB $\sim a$, la Ligne BC $\sim x$, & les perpendiculaires EH, FG, seront les deux Racines véritables de l'Equation proposée $xx - ax \sim -ab$, & la démonstration s'en fera comme auparavant, si l'on suppose $FG \sim x$, & $EH \sim x$.

13. Fig.

S C O L I E.

Bien que cette Methode soit un peu plus longue que la commune, pour les Equations d'une forme semblable à celle que nous avons proposée, elle a

13. Fig. pourtant quelque avantage pour les Equations de cette forme.

$$xx + ax \sim \frac{1}{2} bb - \frac{1}{2} aa.$$

$$xx - ax \sim \frac{1}{2} bb - \frac{1}{2} aa.$$

$$xx - ax \sim \frac{1}{2} bb - \frac{1}{2} aa.$$

dont la troisiéme suppose b moindre que a ; pour la differencier de la seconde , qui suppose b plus grand que a . Car le Rayon du second Lieu au Cercle sera exprimé par la seule Lettre b , & la construction sera, si l'on veut, la même qu'auparavant, excepté qu'on doit faire $BC \sim \frac{aa \dots bb}{aa}$ $\sim CD$. Ou bien on peut commencer par le Cercle Local, dont le Rayon est b , & prendre sur le Diametre IK, depuis le centre A, vers K la Ligne AB $\sim a$ pour faire en B un angle demidroit ABF, par la Ligne Locale BF, &c. Or comme cette construction est la plus simple de toutes celles que l'on peut inventer par les Lieux, nous en traiterons plus au long dans le Probl. IX. où nous la démontrerons à fonds, & dans le Probl. VIII. nous en découvrirons l'origine par un chemin beaucoup plus court, sans nous amuser à plusieurs autres que l'on peut trouver à l'imitation du precedent & du suivant, comme nous ferons voir dans nôtre grand Traité d'Algebre, lorsqu'il aura le bonheur de paroître.

PROBLEME VI.

Troisième
Methode. *Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de deux dimensions.*

Nous resoudrons encore autrement ce Probleme, en joignant ensemble les deux Lieux au Cercle, qui

ont été trouvez au *Probl. II.* pour les trois Equations suivantes.

$$xx + ax = ab.$$

$$xx - ax = ab.$$

$$xx - ax = -ab.$$

Pour trouver les Racines de la premiere Equation, Premiere Equation.
 $xx + ax = ab$, en joignant ensemble les deux Lieux au Cercle.

$$yy - 2ay = bb - 2bx - xx.$$

$$yy - 2ay - 2by = -bb - xx.$$

Décrivez du centre A, une circonference de Cercle, dont le Rayon AB, ou AC, soit égal à $R.aa + 2ab$, & du même centre A, tirez au Diametre BC, la perpendiculaire AD = b, & par le point D, au même Diametre BC, la parallele DI = AD = b, pour décrire du centre I, à l'intervale de $R.aa + 2bb$, une circonference de Cercle, qui coupe icy la premiere décrite du centre A, aux deux points E, F, d'où l'on tirera au Diametre BC, les perpendiculaires EH, FG, qui seront les Racines de l'Equation proposée, $xx + ax = ab$, dont la plus petite EH fera la Racine veritable, & la plus grande FG la fausse.

14. Fig.

Car si on suppose EH = x, on aura EK = x + b, à cause de KH = b = AD, & à cause de AE = $R.aa + 2ab$, on aura AH, ou DK = $R.aa + 2ab - xx$, de laquelle ôtant DI = b, il restera IK = $R.aa + 2ab - xx - b$, & enfin à cause de IE = $R.aa + 2bb$, on trouvera dans le Triangle rectangle IKE, cette Equation, $aa + 2ab + 2bb = + 2bx - 2bR.aa + 2ab - xx = aa + 2bb$, ou $xx + ax = ab$, qui est la même que la proposée. D'où il suit que EH en est la Racine veritable; Ce qui est

Démonstration.

Fij

14. Fig. l'une des deux choses qu'il falloit démontrer.

Pareillement si on suppose $FG \sim -x$, on aura $FL \sim -x - b$, AG ou $DL \sim R.aa \dagger 2ab - xx$, à cause de $AF \sim R.aa \dagger 2ab$, & à cause de $DI \sim b$, on aura $LI \sim R.aa \dagger 2ab - xx \dagger b$, & enfin à cause de $IF \sim R.aa \dagger 2bb$, on trouvera dans le Triangle rectangle FLI , cette Equation, $aa \dagger 2bx \dagger 2bb \dagger 2ab \dagger 2bR.aa \dagger 2ab - xx \sim aa \dagger 2bb$, ou $xx \dagger ax \sim ab$ qui est la même que la proposée. D'où il suit que FG en est la Racine fausse; Ce qui restoit à démontrer.

Deuxième
Equation.

Pour trouver les Racines de la seconde Equation, $xx - ax \sim ab$, en joignant ensemble ses deux Lieux au Cercle,

$$yy - 2ay \sim bb \dagger 2bx - xx.$$

$$yy - 2ay - 2by \sim -bb - xx.$$

on fera une construction semblable à la précédente, & des deux Racines EH , FG , la plus grande FG sera la Racine véritable, & EH la fausse, & la démonstration s'en fera comme auparavant, si l'on suppose $FG \sim x$, & $EH \sim -x$.

Troisième
Equation.

Pour trouver les Racines de la troisième Equation, $xx - ax \sim -ab$, en joignant ensemble ses deux Lieux au Cercle,

$$yy - 2ay \sim bb - 2bx - xx.$$

$$yy - 2ay \dagger 2by \sim -bb - xx.$$

15. Fig.

On fera une construction semblable à la précédente, excepté qu'on doit faire le Rayon AB , ou AC égal à $R.aa - 2ab$, & que la Ligne $DI \sim b$, doit être mise de l'autre côté depuis D vers B , & les perpendiculaires EH , FG , représenteront les deux Racines véritables de l'Equation proposée $xx - ax \sim -ab$, & la

DES EQUATIONS.

41

demonstration s'en fera comme auparavant , si l'on suppose $EH \propto x$, & $FG \propto x$. 11. Fig.

SCOLIE.

Comme nous avons reduit une Equation de deux dimensions en un Lieu à la *Ligne droite* , & en un Lieu à la *Parabole* , pour en tirer deux Lieux au *Cercle* , qui nous ont donné les constructions precedentes ; on peut aussi la reduire en un Lieu à la *Ligne droite* & en un Lieu à l'*Hyperbole par son Parametre* , pour en tirer deux Lieux au *Cercle* , ou bien en un Lieu à la *Ligne droite* & en un Lieu à l'*Ellipse* , pour en tirer pareillement deux Lieux au *Cercle* , qui nous donneront d'autres constructions , telles que nous les avons dans nôtre grand Traité d'Algebre. Mais on n'en aura point de plus simple , que celle qui se tire en reduisant l'Equation proposée en un Lieu à la *Ligne droite* , & en un Lieu à l'*Hyperbole entre ses asymptotes* , pour en tirer un Lieu tres-simple au *Cercle*. C'est pourquoy nous finirons les Equations de deux dimensions par cette dernière Methode , qui sera precedée de quelques Lemmes , qui serviront pour sa demonstration.

Mais auparavant que de venir à la pratique , nous enseignerons icy en peu de mots l'usage du Lieu à l'*Hyperbole par son Parametre* , & du Lieu à l'*Ellipse* , pour reduire une Equation de deux dimensions en un Lieu à la *Ligne droite* , & en deux Lieux au *Cercle*.

Proposons cette Equation de deux dimensions ,
 $xx + ax \propto ab$. Reduisez-la en celle-cy , $xx + \frac{ax^2}{c^2} \propto$

Fijj

$\frac{mm \div + aad}{c-d}$, en sorte qu'on ait $c \sim 3d$, & $ab \sim \frac{mm \div + aad}{c-d}$, ou $ab \sim \div mm \div - aa$. & par consequent $mm \sim 2ab - aa$. Ayant donc réduit l'Equation proposée $xx \div + ax \sim ab$, en celle-cy, $xx \div \frac{c-x}{c-d} \sim \frac{mm \div + aad}{c-d}$, multipliez-la par $c-d$, pour avoir en entiers cette autre Equation, $cxx - dxx \div + 2adx \sim mmd \div + aad$, que vous diviserez par d , pour avoir cette autre Equation $\frac{c}{d}xx - xx \div + 2ax \sim mm \div + aa$, ou $aa - 2ax \div + xx \sim \frac{c}{d}xx - mm$, dont la premiere partie $aa - 2ax \div + xx$, à sa Racine quarrée $a-x$, que nous appellerons y , pour avoir ce Lieu à la Ligne droite, $a-x \sim y$. Si donc on met y à la place de $a-x$, & yy à la place $aa - 2ax \div + xx$, l'Equation precedente $aa - 2ax \div + xx \sim \frac{c}{d}xx - mm$, se changera en celle-cy, $yy \sim \frac{c}{d}xx - mm$, qui est un Lieu à l'Hyperbole par son Parametre, par le moyen duquel & de celui à la Ligne droite $a-x \sim y$, on trouvera deux Lieux au Cercle, en cette sorte.

Ayant changé le Lieu à la Ligne droite $a-x \sim y$, en celui-cy, $x \sim a-y$, ôtez son Quarré $xx \sim aa - 2ay \div + yy$, du Lieu à l'Hyperbole $\frac{c}{d}xx - mm \sim yy$, ou $3xx - 2ab \div + aa \sim yy$, à cause de $c \sim 3d$, & de $mm \sim 2ab - aa$, le reste $2xx - 2ab \div + aa \sim 2ay - aa$, ou $xx \sim ab - aa \div + ay$, sera un Lieu à la Parabole, par le moyen duquel & de celui à la Ligne droite, on trouvera par *Probl. I.* deux Lieux au Cercle, sçavoir

$$yy - 2ay \sim 2ab - aa - 2ax - xx.$$

$$yy - 4ay \sim 2ab - 3aa - xx.$$

C'est de la même façon que l'on reduira cette autre Equation de deux dimensions, $xx - ax \sim ab$, en ces trois Lieux.

$$a \div + x \sim y. \text{ A la Ligne droite;}$$

DES EQUATIONS.

43

$$yy - 2ay \sim 2ab - aa + 2ax - xx. \text{ Au Cercle.}$$

$$yy - 4ay \sim 2ab - 3aa - xx. \text{ Au Cercle.}$$

C'est encore de la même façon que cette autre Equation de deux dimensions, $xx - ax \sim -ab$, se reduira en ces trois Lieux,

$$a + x \sim y. \text{ A la Ligne droite.}$$

$$yy - 2ay \sim -2ab - aa + 2ax - xx. \text{ Au Cercle.}$$

$$yy - 4ay \sim -2ab - 3aa - xx. \text{ Au Cercle.}$$

Proposons encore la même Equation, $xx + ax \sim ab$. Reduisez-la en celle-cy, $xx + \frac{2adx}{c+d} \sim \frac{mmd - aad}{c+d}$, en sorte qu'on ait $c \sim d$, & $mm \sim aa + 2ab$, & achevant le reste comme auparavant, on trouvera ces trois Lieux,

$$a + x \sim y. \text{ A la Ligne droite.}$$

$$yy \sim 2ab + aa - xx. \text{ Au Cercle.}$$

$$yy + 2ay \sim 3aa + 2ab + 2ax - xx. \text{ Au Cercle.}$$

C'est de la même façon que cette autre Equation de deux dimensions $xx - ax \sim ab$, se reduira en ces trois Lieux,

$$a - x \sim y. \text{ A la Ligne droite.}$$

$$yy \sim 2ab + aa - xx. \text{ Au Cercle.}$$

$$yy + 2ay \sim 3aa + 2ab - 2ax - xx. \text{ Au Cercle.}$$

C'est aussi de la même façon que cette autre Equation de deux dimensions $xx - ax \sim -ab$, se reduira en ces trois Lieux,

$$x - a \sim y. \text{ A la Ligne droite.}$$

$$yy \sim aa - 2ab - xx. \text{ Au Cercle.}$$

$$yy - 2ay \sim 3aa - 2ab - 2ax - xx. \text{ Au Cercle.}$$

En joignant ensemble deux de ces Lieux, on aura d'autres constructions, dont nous ne parlerons pas icy, & il suffit de vous avoir ouvert le chemin pour

en trouver une infinité d'autres , qui ne seront jamais plus simples que celle du *Probl IX.* laquelle par conséquent nous expliquerons plus au long , comme vous allez voir dans les Lemmes suivans.

L E M M E I.

Si les deux côtez d'un Triangle rectangle sont égaux , le double de leur Rectangle sera égal au Quarré de l'Hypotenuse.

16. Fig. Je dis que si les deux côtez AD , DC , du Triangle Rectangle ADC sont égaux , le double de leur Rectangle , sçavoir $2ADC$, est égal au Quarré de l'Hypotenuse AC.

Demonstration.

Car puisqu'on a $ADq + CDq = ACq$, par 47. 1. Si à la place de CDq on met son égal ADq , on aura $ADq + ADq$, ou $2ADq$, ou $2ADC = ACq$. Ce qu'il falloit démontrer.

L E M M E II.

Les deux côtez d'un Triangle Rectangle sont égaux , lorsque le double de leur Rectangle est égal au Quarré de l'Hypotenuse.

17. Fig. Je dis que si le double Rectangle sous les côtez AD , DC , est égal au Quarré de l'Hypotenuse AC , du Triangle Rectangle ADC , ces deux mêmes côtez AD , DC , sont égaux.

Demonstration.

Car si l'on veut que le côté CD , par exemple ; soit plus grand que le côté AD , que l'on en retranche $DK = AD$, & qu'on mene la droite AK. Puisque

que par l'hypotese nous avons $2ADC \sim ACq$, & que par 12. 2. nous avons $AKq \dagger CKq \dagger 2CKD \sim ACq$, nous aurons $2ADC \sim AKq \dagger CKq \dagger 2CKD$, & à cause de $DK \sim AD$, par la construction, & de $AKq \sim 2ADK$, par le Lemme precedent, nous aurons $2ADq \sim 2ADK \dagger CKq \dagger 2CKD$. Ce qui est impossible.

Ou bien à cause de $2ADC \sim ACq$, on aura par 47. 1. $2ADC \sim ADq \dagger DCq$, & ajoutant $2ADC$, on aura $4ADC \sim ADq \dagger DCq \dagger 2ADC$, & parce que, par 4. 2. $ADq \dagger DCq \dagger 2ADC$, est le Quarré de la somme $AD \dagger DC$ des côtez AD , DC , on pourra faire cette analogie, $2AD$, $AD \dagger DC :: AD \dagger DC$, $2DC$: c'est pourquoy en divisant on aura celle-cy, $2AD$, $AD - DC :: AD \dagger DC$, $AD - DC$, & par consequent $2AD \sim AD \dagger DC$, ou $AD \sim DC$. Ce qu'il faloit démontrer.

LEMM E III.

Si la droite CE coupe à angles demidroits le Diametre HI en B, & la circonference du Cercle, dont le centre est A, aux deux points C, E, d'où l'on tire sur le Diametre HI, les perpendiculaires CD, EF, la Ligne AF sera égale à la Ligne BD.

13. & 19. Fig.

Ayant mené les deux rayons AC , AE , on tirera des deux Triangles rectangles, AEF , ACD , cette Equation, $AFq \dagger EFq \sim ADq \dagger CDq$, ou $AFq \dagger BFq \sim ADq \dagger BDq$, & à cause de $BFq \sim ABq \dagger AFq \dagger 2FAB$, & de $ADq \sim ABq \dagger BDq \dagger 2ABD$, par 4. 2. on aura $ABq \dagger 2AFq \dagger 2FAB \sim ABq \dagger 2BDq \dagger 2ABD$, ou $AFq \dagger FAB \sim BDq \dagger ABD$, & ajoutant $\frac{1}{2} ABq$, on

13. Fig.

G

18. Fig. aura $AFq \dagger FAB \dagger \frac{1}{2} ABq \sim BDq \dagger ABD \dagger - ABq$, & par 4. 2. on aura $AF \dagger \frac{1}{2} AB \sim BD \dagger - AB$, & par conséquent $AF \sim BD$. Ce qu'il falloit démontrer.

La démonstration se fera de la même façon dans la Fig. 19. pourvû qu'à la place de BDq on mette $ABq - 2AFB \dagger AFq$, & $ABq - 2ABD \dagger BDq$ à la place de ADq , &c.

COROLLAIRE I.

18. & 19. Fig. Il s'ensuit de ce Theoreme, que la Ligne AF est aussi égale à la Ligne CD, à cause de $CD \sim BD$, & que par conséquent les trois Lignes AF, BD, CD, sont égales.

COROLLAIRE II.

Il s'ensuit aussi que la Ligne EF, ou BF, est égale à la Ligne AD, & que par conséquent les trois Lignes EF, BF, AD, sont égales. Car si dans la 18. Fig. on ajoute aux deux Lignes égales AF, BD, la Ligne AB, ou dans la 19. Fig. la Ligne FD, on aura BF, ou EF $\sim$ AD.

COROLLAIRE III.

Il s'ensuit encore que la Ligne AB, dans la 18. Fig. est la difference des Lignes EF, CD, & la somme dans la 19. Fig. parce que dans la 18. Fig. la Ligne AB est l'excez de la Ligne BF, ou EF, sur la Ligne AF, ou BD, ou CD, & que dans la 19. Fig. elle est la somme des Lignes AD, ou EF, & BD, ou CD.

Il s'en suit encore que la moitié de la difference des Quarrez AB, AC, est égale au Rectangle des Lignes CD, EF. Car dans le Triangle ABC, de la 18. Fig. on a, par 13. 2. cette Equation, $ACq - ABq \sim BCq + 2ABD$, & à cause de $BCq \sim 2BDq$, par Lem. 1. on aura celle-cy, $ACq - ABq \sim 2BDq + 2ABD$, & encore à cause de $BDq + ABD \sim ADB$, par 3. 2. on aura $ACq - ABq \sim 2ADB$, & par conséquent $\frac{ACq - ABq}{2} \sim ADB \sim CDEF$. Ce qu'il falloit démontrer.

Ou bien parce que l'on a par 3. 2. cette Equation, $BDq + ABD \sim ADB$, on aura $2BDq + 2ABD \sim 2ADB$, & ajoutant ABq , on aura $ABq + 2BDq + 2ABD \sim 2ADB + ABq$, & à cause de $ADq \sim ABq + BDq + 2ABD$, par 4. 2. on aura $ADq + BDq$, ou $ADq + CDq$, ou $ACq \sim 2ADB + ABq$, & par l'antithese on aura $ACq - ABq \sim 2ADB$, & par conséquent $\frac{ACq - ABq}{2} \sim ADB \sim CDEF$.

De même dans le triangle ABC de la 19. Fig on a, par 12. 2. cette Equation, $ABq - ACq \sim 2ABD - BCq$, & à cause de $BCq \sim 2BDq$, par Lem. 1. on aura $ABq - ACq \sim 2ABD - 2BDq$, & encore à cause de $AB - BD \sim AD$, on aura $ABq - ACq \sim 2ADB$, & par conséquent $\frac{ABq - ACq}{2} \sim ADB \sim CDEF$.

Ou bien dans le Triangle rectangle ACD, on a cette Equation, $ADq + CDq \sim ACq$, par 47. 1. ou $ADq + BDq \sim ACq$, & ajoutant $2ADB$, on aura $ADq + BDq + 2ADB \sim ACq + 2ADB$, ou $ABq \sim ACq + 2ADB$, & conséquemment $\frac{ABq - ACq}{2} \sim ADB \sim CDEF$.

COROLLAIRE V.

Il s'enfuit de plus que dans la 18. *Fig.* le Quarré CD, plus le Rectangle ABCD, est égal à la moitié de la difference des Quarrez AB, AC; & que le Quarré EF, moins le Rectangle ABEF, est égal à la même moitié.

Car à cause de $CD \sim BD$, & de $AB \sim EF$, par *Coroll.* 2. on a $CD \dagger AB \sim EF$, & donnant la hauteur commune CD, on aura $CDq \dagger ABCD \sim CDEF$, & à cause de $CDEF \sim \frac{ACq \cdot ABq}{1}$, par *Coroll.* 4. on aura $CDq \dagger ABCD \sim \frac{ACq \cdot ABq}{1}$, ce qui est une des choses qu'il falloit démontrer.

Pareillement on a $EF - AB \sim CD$, & donnant la hauteur commune EF, on aura $EFq - ABEF \sim CDEF$, & à cause de $EFCD \sim \frac{ACq \cdot ABq}{1}$, on aura $EFq - ABEF \sim \frac{ACq \cdot ABq}{1}$, ce qui restoit à démontrer.

COROLLAIRE VI.

Enfin il s'enfuit que dans la 19. *Fig.* que la difference du Quarré CD, & du Rectangle ABCD, est égale à la moitié de la difference des Quarrez AB, AC, & que la difference du Quarré EF, & du Rectangle ABEF est égale à la même moitié.

Car si à $CD \sim AB - EF$, on donne la hauteur commune CD, on aura $CDq \sim ABCD - CDEF$, & à cause de $CDEF \sim \frac{ACq \cdot ABq}{1}$, par *Coroll.* 4. on aura $CDq \sim ABCD - \frac{ACq \cdot ABq}{1}$, & par conséquent $CDq - ABCD \sim \frac{ABq \cdot ACq}{1}$, ce qui est une des choses qu'il falloit démontrer.

Pareillement si à $EF \sim AB - CD$, on donne la hau-

DES EQUATIONS.

49

teur commune EF, on aura $EFq \sim AB EF - CDEF$, ^{12. & 13.}
& à cause de $CDEF \sim \frac{ABq \cdot ACq}{1}$, par Coroll. 4. on aura ^{Fig.}
 $EFq \sim AB EF - \frac{ABq \cdot ACq}{1}$ & par conséquent $AB EF - EFq$
 $\sim \frac{ABq \cdot ACq}{1}$. Ce qui restoit à démontrer.

PROBLEME VII.

D'un Lieu à la Ligne droite & d'un Lieu à l'Hyperbole entre ses asymptotes, tirer un Lieu au Cercle.

Proposons ce Lieu à la Ligne droite, $x \dagger y \sim b$,
& ce Lieu à l'Hyperbole entre ses asymptotes, $xy \sim aa$. Pour en tirer un Lieu au Cercle, ôtez du Quarré
 $xx \dagger 2xy \dagger yy \sim bb$, du Lieu à la Ligne droite $x \dagger y$
 $\sim b$, le double $2xy \sim 2aa$, du Lieu à l'Hyperbole,
 $xy \sim aa$, pour faire évanouïr le terme $2xy$, & vous
aurez ce Lieu au Cercle, $xx \dagger yy \sim bb - 2aa$, dont le
Rayon est $R. bb - 2aa$.

PROBLEME VIII.

Reduire une Equation de deux dimensions en trois Lieux, dont l'un soit à la Ligne droite, l'autre à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, & le troisieme au Cercle.

Toute Equation possible de deux dimensions, se peut toujours reduire à l'une des trois suivantes.

$$xx \dagger ax \sim ab.$$

$$xx - ax \sim ab.$$

$$xx - ax \sim -ab.$$

Supposez premicrement ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $xy \sim ab$, & mettant xy à la pla-

ce de ab , la premiere Equation, $xx + ax \sim ab$, se changera en celle-cy, $xx + ax \sim xy$. ou $x + a \sim y$, ou $y - x \sim a$, qui est un Lieu à la Ligne droite, par le moyen duquel & de celuy à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, on trouvera, par le Probleme precedent, un Lieu au Cercle, sçavoir en ajoutant au Quarré $yy - 2xy + xx \sim aa$, du Lieu à la Ligne droite, $y - x \sim a$, le double $2xy \sim 2aa$, du Lieu $xy \sim aa$ à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, pour faire évanouir le terme $2xy$, le reste $xx + yy \sim aa + 2ab$ sera un Lieu au Cercle, dont le Rayon est $R. aa + 2ab$. Ainsi la premiere Equation $xx + ax \sim ab$, se trouve reduite en ces trois Lieux.

Premiere
Equation.

$y - x \sim a$. A la Ligne droite.

$xy \sim ab$. A l'Hyperbole.

$xx + yy \sim aa + 2ab$. Au Cercle.

C'est de la même façon que la deuxième Equation, $xx - ax \sim ab$, se reduira en ces trois Lieux.

Deuxième
Equation.

$x - y \sim a$. A la Ligne droite.

$xy \sim ab$. A l'Hyperbole.

$xx + yy \sim aa + 2ab$. Au Cercle.

C'est encore de la même façon que la troisième Equation $xx - ax \sim -ab$, se reduira en ces trois Lieux.

Troisième
Equation.

$x + y \sim a$. A la Ligne droite.

$xy \sim ab$. A l'Hyperbole.

$xx + yy \sim aa - 2ab$. Au Cercle.

Nous avons tiré de cette Regle generale, l'abregé suivant, pour reduire en trois semblables Lieux une Equation de deux dimensions, lorsqu'elle est semblable à l'une des trois suivantes.

$$xx + ax \sim \frac{bb - aa}{1}$$

$$xx - ax \sim \frac{bb - aa}{1}$$

$$xx - ax \sim \frac{bb - aa}{1}$$

où l'on doit supposer b plus grand que a , dans les deux premières, & b moindre que a dans la dernière.

Pour reduire la premiere Equation, $xx + ax \sim \frac{bb - aa}{1}$, en trois Lieux, dont l'un soit à la Ligne droite, l'autre à l'Hyperbole entre ses asymptotes, & le troisième au Cercle; multipliez-la par 2, pour faire évanouir la fraction, & vous aurez cette autre Equation, $2xx + 2ax \sim bb - aa$, de laquelle ôtant le Quarré xx , vous aurez cette autre Equation, $xx + 2ax \sim bb - aa - xx$, à laquelle ajoutant le Quarré aa , vous aurez cette autre Equation, $xx + 2ax + aa \sim bb - xx$, dont la premiere partie $xx + 2ax + aa$ a sa Racine quarrée $x + a$, que nous appellerons y , de sorte qu'on aura ce Lieu à la Ligne droite, $x + a \sim y$, & l'Equation precedente, $xx + 2ax + aa \sim bb - xx$, se changera en celle-cy, $yy \sim bb - xx$, qui est un Lieu au Cercle, dont le Rayon est b . Si vous multipliez le Lieu à la Ligne droite, $x + a \sim y$ par x , vous aurez $xx + ax \sim xy$, ou $\frac{bb - aa}{1} \sim xy$, qui est un Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes; Ainsi l'Equation proposée $xx + ax \sim \frac{bb - aa}{1}$, se trouve reduite en ces trois Lieux.

$x + a \sim y$. A la Ligne droite.

$bb - xx \sim yy$. Au Cercle.

$\frac{bb - aa}{1} \sim xy$. A l'Hyperbole.

Premiere
Equation.

C'est de la même façon que la seconde Equation $xx - ax \sim \frac{bb - aa}{1}$, se reduira en ces trois Lieux,

$x - a \sim y$. A la Ligne droite.

Deuxième
Equation.

$bb - xx \sim yy$. *Au Cercle.*

$\frac{bb - aa}{a} \sim xy$. *A l'Hyperbole.*

C'est encore de la même façon que la troisième Equation, $xx - ax \sim \frac{bb - aa}{a}$, se reduira en ces trois Lieux,

Troisième
Equation.

$a - x \sim y$. *A la Ligne droite.*

$bb - xx \sim yy$. *Au Cercle.*

$-\frac{bb + aa}{a} \sim xy$. *A l'Hyperbole.*

PROBLEME IX.

Quatrième
Méthode.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de deux dimensions.

Nous avons dit que les Equations possibles de deux dimensions se peuvent reduire à l'une des trois suivantes,

$$xx + ax \sim \frac{bb - aa}{a}$$

$$xx - ax \sim \frac{bb - aa}{a}$$

$$xx - ax \sim \frac{bb + aa}{a}$$

& que pour les distinguer, on doit concevoir b plus grande que a , dans les deux premieres, & b moindre que a , dans la dernière.

Première
Equation.

Pour trouver les Racines de la première Equation, $xx + ax \sim \frac{bb - aa}{a}$, dont les deux Lieux convenables sont

$x + a \sim y$ *A la Ligne droite.*

$bb - xx \sim yy$ *Au Cercle.*

rejetant le Lieu à l'Hyperbole, qui ne convient qu'aux Equations de trois ou de quatre dimensions;

11. Fig.

Décrivez du centre A , à l'intervalle de la quantité donnée b , une circonference de Cercle, & prenez sur son Diametre HI , la Ligne AB égale à l'autre quantité

DES EQUATIONS.

53

quantité donnée a . Tirez par le point B, à angles de- 18. Fig.
midroits, la droite CE, & par les points C, E,
sur HI, les perpendiculaires CD, EF, qui seront les
Racines de l'Equation proposée, $xx + ax \sim \frac{bb+aa}{4}$ dont
la plus petite CD, sera la véritable, & la plus gran-
de EF la fausse.

Car leur différence est égale à la Ligne AB, ou au Démon-
stration.
coefficient a , par *Coroll. 3. Lem. 3.* & leur Rectangle
est égal à la moitié de la différence des Quarrez AB,
AI, ou au dernier terme $\frac{bb+aa}{4}$ par *Coroll. 4. Lem. 3.*
ce qui suffit pour la démonstration. Mais on connoît
encore par *Coroll. 5. Lem. 3.* que ce même Rectangle
est égal à $CDq + ABCD$, ou à $EFq - ABEF$. D'où il
suit que la Ligne CD est la Racine véritable, & EF
la fausse.

Pour trouver les Racines de la seconde Equation, Deuxième
Equation.
 $xx - ax \sim \frac{bb+aa}{4}$ dont les Lieux convenables, sont

$x - a \sim y$. A la Ligne droite.

$bb - xx \sim yy$. Au Cercle.

on fera une construction semblable à la précédente,
mais des deux Racines CD, EF, la plus grande EF,
sera la véritable, & la plus petite CD, la fausse, &
la démonstration s'en fera comme auparavant.

Pour trouver les Racines de la troisième Equation, Troisième
Equation.
 $xx - ax \sim \frac{bb+aa}{4}$ dont les deux Lieux convenables sont

$a - x \sim y$. A la Ligne droite.

$bb - xx \sim yy$. Au Cercle.

on fera une construction semblable à la précédente,
& l'on démontrera de la même façon que les Lignes
CD, EF, sont les deux Racines véritables de l'E- 19. Fig.
quation proposée, $xx - ax \sim \frac{bb+aa}{4}$ Mais comme nous

19. Fig

Determi-
nation.

avons icy a plus grand que b , le point B se rencontrera au dehors du Cercle, & il aura besoin de determination : car s'il étoit bien éloigné, la droite BE, pourroit ne pas rencontrer la circonference du Cercle, & alors les Racines CD, EF, seroient imaginaires. Or la plus grande distance que ce point B puisse avoir de la circonference du Cercle, est lorsque les deux Racines CD, EF, sont égales chacune à la moitié du Rayon AC, c'est à-dire lorsque la droite BE touche la circonference du Cercle, ce qui arrivera quand le Quarré AB fera double du Quarré AC, comme nous allons démontrer.

Démon-
stration.

Puisque par la supposition, nous avons $ABq \sim 2ACq$, & que par 4. 2. nous avons $ABq \sim ADq \dagger 2ADB \dagger BDq$, ou $ABq \sim ADq \dagger 2ADB \dagger CDq$, ou $ABq \sim ACq \dagger 2ADC$, nous aurons $ACq \dagger 2ADC \sim 2ACq$, & par conséquent $2ADC \sim ACq$, & par Lem. 2. nous aurons $AD \sim CD$. C'est pourquoy l'angle CAD sera demidroit, & comme l'angle B, est aussi demidroit par la construction, il faut que l'angle ACB, soit droit, par 32. 1. & qu'ainsi la droite BC touche le Cercle. D'où il suit que quand le Quarré AB sera plus grand que le double du Quarré AC, la Ligne BC ne pourra pas rencontrer le Cercle, & qu'ainsi les Racines seront imaginaires.

Cinquième
Methode.

Si vous voulez trouver les Racines d'une Equation de deux dimensions par la Methode commune, réduisez-la à l'une des trois suivantes, ce qui sera toujours possible.

$$xx \dagger ax \sim bb.$$

$$\underline{xx} - ax \sim bb.$$

$$xx - ax \sim -bb.$$

Pour trouver les Racines de la premiere Equation, $xx + ax \sim bb$, faites le Triangle rectangle ABC, dont la base AB, soit égale à la quantité donnée b , ou à la Racine quarrée de l'Homogene de comparaison, & la hauteur AC à la moitié du côté coefficient a , & décrivez du centre C, par le point A, une circonference de Cercle, qui se trouve icy coupée par l'hypotenuse BC, prolongée aux points D, E, & les Lignes BD, BE, seront les Racines de l'Equation proposée $xx + ax \sim bb$, dont la plus petite BD, sera la veritable, & la plus grande BE, la fausse.

Premiere
Equation.
10. Fig.

Car si l'on suppose $BD \sim x$, on aura $BE \sim x + a$, à cause de $DE \sim a$, & parce que le Rectangle EBD est égal au Quarré de la touchante AB, par 36. 3. on aura cette Equation, $xx + ax \sim bb$, qui est la même que la proposée.

Demonstration.

On trouvera la même Equation en supposant $BE \sim -x$; D'où il suit que BD est la Racine veritable, & BE la fausse, ce que l'on connoît encore, parce que leur difference DE est égale au coefficient a , & que leur Rectangle EBD, ou le Quarré de la touchante AB, est égal à l'Homogene bb .

Pour trouver les Racines de la seconde Equation, $xx - ax \sim bb$, on fera une construction semblable à la precedente, mais des deux Racines BD, BE, la plus grande BE sera la Racine veritable, & la plus petite BD, la fausse, & la demonstration s'en fera comme auparavant.

Deuxieme
Equation.

Pour trouver les Racines de la troisieme Equation, $xx - ax \sim -bb$, on fera une construction sem-

Troisieme
Equation.
11. Fig.

11. Fig.

blable à la précédente, excepté qu'au lieu de prolonger l'Hypoténuse BC jusqu'à ce qu'elle coupe le Cercle, on doit tirer du point B, à la Ligne AC, la parallèle BE, & alors les Lignes BD, BE seront les Racines véritables de l'Equation proposée $xx - ax \sim -bb$, & la démonstration s'en fera comme auparavant.

Determina-
tion.

Le point B, peut être tellement éloigné du point A, que la droite BE ne fera que toucher la circonférence du Cercle, & alors les deux Racines seront égales : & si le point B, est encore plus éloigné, la Ligne BE ne rencontrera jamais le Cercle, & dans ce cas les deux Racines seront imaginaires. Ainsi le point B, a besoin de détermination, qui est que la Ligne AB, ou b , ne doit pas être plus grande que le Rayon du Cercle, ou que $\frac{1}{2}a$, & la démonstration en est évidente.

PROBLEME X.

Reduire en Lieux une Equation de trois dimensions, où le troisième terme manque.

Proposons cette Equation de trois dimensions affectée sous le côté, $x^3 + abx \sim aac$. Commencez par ce Lieu le plus simple à la Parabole, $xx \sim dy$, dont le parametre d est indéterminé, & substituant dy à la place de xx , l'Equation proposée $x^3 + abx \sim aac$, se changera en celle-cy, $dxy + abx \sim aac$, ou $xy + \frac{abx}{d} \sim \frac{aac}{d}$, qui est un Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes.

Pour avoir d'autres Lieux, multipliez l'Equation

proposée $x^3 + abx \sim aac$ par x , & vous aurez cette autre Equation, $x^4 + abxx \sim aacx$, qui se reduira en Lieux en cette sorte. Substituant comme auparavant, dy à la place de xx , & ddy à la place de x^4 , l'Equation precedente, $x^4 + abxx \sim aacx$, se changera en celle-cy, $ddy + aby \sim aacx$, ou $yy + \frac{aby}{d} \sim \frac{aacx}{d}$, qui est un autre Lieu à la Parabole, lequel étant ôté du premier $xx \sim dy$, en ôtant $\frac{aayx}{dd}$ de xx , & $yy + \frac{aby}{d}$ de dy , on aura ce Lieu au Cercle, $xx - \frac{aayx}{dd} - \frac{aby}{d} \sim dy - \frac{aby}{d} - yy$, & en ôtant $yy + \frac{aby}{d}$ de xx & $\frac{aayx}{dd}$ de dy , on aura ce Lieu à l'Hyperbole équilateré, $xx - yy - \frac{aby}{d} \sim dy - \frac{aayx}{dd}$. Que si on ne change que x^4 en ddy , on aura cette autre Equation, $ddy + abxx \sim aacx$, ou $yy \sim \frac{aayx}{dd} - \frac{abyx}{da}$ qui est un Lieu à l'Ellipse, car il est permis de changer seulement tel terme que l'on voudra, pourvu que dans le Lieu qu'on trouvera, la Lettre inconnue n'ait pas plus de deux dimensions, autrement ce Lieu seroit inutile, comme étant trop élevé.

Ainsi nous avons deux Lieux à la Parabole, deux à l'Hyperbole, un au Cercle, & un à l'Ellipse, & comparant diversement ces Lieux ensemble, on en trouvera d'autres, entre lesquels on choisira les plus simples, pour résoudre l'Equation; mais on ne trouvera jamais deux Lieux differens au Cercle, parce que l'Equation a trois dimensions, à moins qu'elle ne se puisse abaisser.

Comme le Parametre d , du Lieu supposé à la Parabole, $xx \sim dy$, est indéterminé, on le doit prendre le plus commode qu'on pourra, pour avoir une solution plus simple, & il sera bon de supposer icy $d \sim a$, & alors l'Equation proposée $x^3 + abx \sim aac$,

se trouvera reduite en ces six Lieux ;

$xx \sim ay$. *A la Parabole.*

$yy \dagger by \sim cx$. *A la Parabole.*

$xy \dagger bx \sim ac$. *A l'Hyperbole entre ses Asymptotes.*

$xx - cx \sim ay - by \cdot yy$. *Au Cercle.*

$xx \dagger cx \sim yy \dagger ay \dagger by$. *A l'Hyperbole Equilatere.*

$yy \sim cx - \frac{bxx}{a}$. *A l'Ellipse.*

C'est de la même façon que l'on reduira cette Equation cubique , $x^3 - abx \sim aac$, en ces six Lieux ;

$xx \sim ay$. *A la Parabole.*

$yy - by \sim cx$. *A la Parabole.*

$xy - bx \sim ac$. *A l'Hyperbole entre ses Asymptotes.*

$xx - cx \sim ay \dagger by - yy$. *Au Cercle.*

$xx \dagger cx \sim yy \dagger ay - by$. *A l'Hyperbole Equilatere.*

$yy \sim cx \dagger \frac{bxx}{a}$. *A l'Hyperbole Scalene.*

C'est encore de la même façon que cette autre Equation cubique $x^3 - abx \sim -aac$, se reduira en ces six Lieux ;

$xx \sim ay$. *A la Parabole.*

$yy - by \sim -cx$. *A la Parabole.*

$xy - bx \sim -ac$. *A l'Hyperbole entre ses Asymptotes.*

$xx \dagger cx \sim ay \dagger by - yy$. *Au Cercle.*

$xx - cx \sim yy \dagger ay - by$. *A l'Hyperbole Equilatere.*

$yy \sim -cx \dagger \frac{bxx}{a}$. *A l'Hyperbole Scalene.*

Il y a plusieurs autres moyens pour reduire en Lieux l'Equation proposée , $x^3 \dagger abx \sim aac$, qu'il sera facile de trouver à celuy qui aura bien entendu les Regles precedentes, où l'on void aisément qu'on peut commencer par tel Lieu qu'on voudra , pourvû qu'il soit convenable à l'Equation , & qu'on en puisse commodément tirer d'autres Lieux : & nous n'avons com-

mencé par le Lieu le plus simple à la Parabole , que pour avoir aussi d'autres Lieux plus simples.

Par exemple dans l'Equation proposée , $x^3 + abx \sim aac$, on auroit pû supposer au commencement , $x^3 + abx \sim axy$, ou $xx + ab \sim ay$, qui est un Lieu à la Parabole , & si au lieu de $x^3 + abx$, on met sa valeur aac , au lieu de l'Equation supposée $x^3 + abx \sim axy$, on aura celle-cy , $axy \sim aac$, ou $xy \sim ac$, qui est un Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes , & par la comparaison de ces deux Lieux , on trouvera ces deux autres , $xx - xy \sim ay - ab - ac$, $xx + xy \sim ay - ab + ac$, qui sont chacun à l'Hyperbole scalene , & en comparant ces deux derniers Lieux avec les deux premiers , on en trouvera encore d'autres , & ainsi en suite.

Pareillement si dans l'Equation , $x^4 + abxx \sim aacx$, on ajoûte $\div aabb$, on aura cette autre Equation , $x^4 + abxx + \div aabb \sim aacx + \div aabb$, dont la premiere partie $x^4 + abxx + \div aabb$ a sa Racine quarrée , $xx + \div ab$: c'est pourquoy on supposera $xx + \div ab \sim ay$, qui est un Lieu à la Parabole , pour avoir $x^4 + abxx + \div aabb \sim aayy$, ou $aacx + \div aabb \sim aayy$, ou $cx + \div bb \sim yy$, qui est un autre Lieu à la Parabole , lequel étant ôté du premier $xx + \div ab \sim ay$, en ôtant $cx + \div bb$ de $xx + \div ab$, & yy de ay , on aura ce Lieu au Cercle , $xx - cx - \div bb + \div ab \sim ay - yy$, dont le Rayon est le même que celui d'auparavant , & en ôtant yy de $xx - \div ab$, & $cx + \div bb$ de ay , on aura ce Lieu à l'Hyperbole Equilatera , $xx + \div ab - yy \sim ay - cx - \div bb$, &c.

Comme le Lieu à l'Hyperbole Equilatera est plus simple que celui à l'Hyperbole scalene , nous vous enseignerons icy le moyen de changer un Lieu à l'Hy-

perbole Scalene en un Lieu à l'Hyperbole Equilatre.

Changer
un Lieu à
l'Hyperbole
Scalene en un
Lieu à l'Hyper-
bole Equilatre.

Pour changer en un Lieu à l'Hyperbole Equilatre ce Lieu à l'Hyperbole Scalene, $yy \sim cx + \frac{bxx}{a}$ qui a été trouvé dans l'Equation $x^3 - abx \sim aac$, changez premierement la fraction $\frac{bxx}{a}$ en une autre qui soit quarree, en multipliant le numerateur & le denominateur par a ou par b : si on les multiplie par a , on aura cette autre fraction, $\frac{abxx}{aa}$, & si l'on reduit le plan ab , au Quarré dd , on aura cette fraction quarree, $\frac{ddxx}{aa}$, dont la Racine quarree est $\frac{dx}{a}$ qu'on nommera z , pour avoir $x \sim \frac{ax}{a}$, & $\frac{ddxx}{aa}$, ou $\frac{abxx}{aa}$, ou $\frac{bxx}{a} \sim zz$, & alors le Lieu proposé à l'Hyperbole Scalene, $yy \sim cx + \frac{bxx}{a}$ se trouvera changé en celui-cy, $yy \sim \frac{ax}{a} + zz$, qui est à l'Hyperbole Equilatre.

Quand on a ainsi changé x en $\frac{ax}{a}$, on doit remettre dans tous les autres Lieux cette même valeur $\frac{ax}{a}$, à la place de x , & comme il arrive icy que le Lieu au Cercle $xx - cx \sim ay + by - yy$, se change en ce Lieu à l'Ellipse, $\frac{axx}{a} - \frac{acx}{a} \sim ay + by - yy$, on ne tire pas un grand avantage de cette reduction, puisque le Lieu au Cercle est plus simple que celui à l'Ellipse.

Parce que dans le Lieu proposé $yy \sim cx + \frac{bxx}{a}$, il n'y a point de second terme, où y se rencontre, on pourra changer ce Lieu en celui-cy, $\frac{ayy}{b} \sim \frac{acx}{b} + xx$, & supposer $\frac{ayy}{b} \sim zz$, pour avoir ce Lieu à l'Hyperbole Equilatre, $zz \sim \frac{acx}{b} + xx$.

C'est de la même façon que l'on reduira un Lieu à l'Ellipse en un Lieu au Cercle, pourvû que l'angle des deux quantitez inconnûes soit droit, ce que nous supposons toujours.

Comme

Comme dans la reduction de l'Equation proposée en Lieux, $x^3 + abx \sim aac$, nous avons commencé par ce Lieu à la Parabole, $xx \sim dy$, dont le Parametre d , est indeterminé, on connoît d'abord qu'ainsi on a un Lieu à des Paraboles infinies, & par conséquent à une Parabole donnée, puisque l'on peut égaler ce Parametre indeterminé à tel Parametre que l'on voudra.

Mais on peut aussi reduire un Lieu à l'Ellipse à un Lieu à des Ellipses infinies, & conséquemment à une Ellipse semblable à une donnée, c'est à-dire à une dont le Diametre & son Parametre soient en raison donnée, comme dans la raison de d à p .

Reduire
un Lieu à
l'Ellipse à
un Lieu à
des Ellipses
infinies.

Dans l'Equation proposée $x^3 + abx \sim aac$, nous avons trouvé ce Lieu à l'Ellipse, $yy \sim cx - \frac{b^2 x}{a}$ que vous changerez en un Lieu à des Ellipses infinies, en supposant $y \sim \frac{mx}{n}$, les quantitez m , n , étant indeterminées, car il viendra $\frac{m^3 mx}{n^3} \sim cx - \frac{b^2 x}{a}$ ou $\frac{m^3 mx}{n^3} \sim \frac{acx}{b} - xx$, qui est un Lieu à des Ellipses infinies, parce que les quantitez m , n , étant indeterminées, on les peut prendre en une infinité de manieres différentes, & comme il suffit icy pour nôtre dessein, d'avoir une seule lettre indeterminée, on peut changer n en a , pour avoir ce Lieu plus simple à l'Ellipse, $\frac{m^3 mx}{a^3} \sim \frac{acx}{b} - xx$, ou $\frac{m^3 mx}{a^3} \sim \frac{2cc}{4b^3} - aa$, en supposant $x \sim a + \frac{ac}{b}$, pour ôter le second terme, & alors on connoîtra que le Diametre de cette Ellipse est à son Parametre, comme mm à ab , & parce que cette raison doit être égale à celle de d à p , on aura cette analogie, mm , $ab :: d, p$, & par conséquent cette Equation, $pmm \sim abd$, dans laquelle on trouvera $mm \sim \frac{ab \cdot d}{p}$ & le Lieu

precedent $\frac{mmix}{ab} \sim \frac{aacc}{bb} - ww$, se changera en celui-cy ,
 $\frac{ixi}{p} \sim \frac{aacc}{abb} - ww$, qui est à une Ellipse, dont le Diametre
 est bien à son Parametre, comme d à p .

C'est de la même façon que l'on reduira un Lieu
 à une Hyperbole à un autre à des Hyperboles infi-
 nies, & par conséquent à une Hyperbole semblable
 à une donnée; & l'on pourroit faire même que le
 Lieu fût donné, si des trois quantitez connues a, b, c ,
 qui se rencontrent dans l'Equation proposée $x^3 + abx$
 $\sim aac$, l'une étoit indeterminée. Il faut donc aupara-
 vant que de reduire l'Equation en Lieux, la changer
 en une autre, où il y ait au moins une lettre indeter-
 minée, outre l'inconnuë, comme vous allez voir, à
 l'égard de la même Equation proposée, $x^3 + abx \sim$
 aac .

Choisissez une quantité indeterminée, comme r ,
 & supposez $x \sim \frac{a}{r}$, & non pas $x \sim \frac{a}{r}$, parce que la
 quantité indeterminée r , monteroit à un degré trop
 élevé, pour la pouvoir connoître par le Cercle & par
 la Ligne droite, quand le Lieu sera donné, comme
 l'on pretend icy.

Ayant donc supposé $x \sim \frac{a}{r}$, l'Equation proposée $x^3 +$
 $abx \sim aac$, se changera en celle-cy, $\frac{a^3}{r^3} + \frac{abr}{r} \sim \frac{aca}{r}$,
 que l'on reduira aisément en ces six Lieux, qui ap-
 partiennent tous à des Lignes courbes infinies, à cau-
 se de la quantité indeterminée r , qui demeure dans
 chacun.

$xx \sim ry$. *A la Parabole.*

$yy + \frac{bry}{a} \sim \frac{cra}{a}$. *A la Parabole.*

$xx + \frac{bry}{a} \sim \frac{cra}{a}$. *A l'Hyperbole entre ses Asymptotes.*

$xx - \frac{cra}{a} \sim ry - \frac{bry}{a}$. *Au Cercle.*

$xx - yy - \frac{bry}{a} \sim ry - \frac{cx}{a}$. A l'Hyperbole Equilatere.

$yy \sim \frac{cx}{a} - \frac{bry}{a}$. A l'Ellipse.

Pour changer le premier Lieu à la Parabole, $xx \sim ry$, dont le Parametre est r , en un autre à la Parabole, dont le Parametre soit donné, comme d , il n'y a qu'à supposer $d \sim r$, & mettant d à la place de r , on aura $xx \sim dy$, pour le Lieu qu'on cherche.

Changer un Lieu à la Parabole en un autre, qui soit donné.

De-même pour changer le second Lieu à la Parabole, $yy \pm \frac{bry}{a} \sim \frac{cx}{a}$, dont le Parametre est $\frac{a}{r}$, en un autre à la Parabole, dont le Parametre soit donné, comme d , il n'y a qu'à supposer $\frac{a}{r} \sim d$, pour avoir $r \sim \frac{a}{d}$, & mettant $\frac{a}{d}$ à la place de r , on aura $yy \pm \frac{bry}{d} \sim dx$, pour le Lieu qu'on cherche.

Pour changer le Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $yx \pm \frac{bry}{a} \sim \frac{cx}{a}$, où le Rectangle est $\frac{a}{r}$, en un autre où le Rectangle soit donné, comme ac , il n'y a qu'à supposer $\frac{a}{r} \sim ac$, pour avoir $r \sim a$, & mettant a à la place de r , on aura $yx \pm bx \sim ac$, pour le Lieu qu'on cherche.

Changer un Lieu à l'Hyperbole entre les Asymptotes en un autre, qui soit donné.

Pour changer le Lieu au Cercle, $xx - \frac{crr}{a} \sim ry - \frac{bry}{a}$, dont le Rayon est $R = \frac{bbrr - bcr + rr + ccr}{4aa}$, en un autre, dont le Rayon soit donné, comme d , il n'y a qu'à supposer $\frac{bbrr - bcr + rr + ccr}{4aa} \sim d$, pour avoir $rr \sim \frac{4aadl}{aa - 2ab + bb + cc}$, & par conséquent $r \sim R = \frac{4aadl}{aa - 2ab + bb + cc}$, & si à la place de r , on met $R = \frac{4aadl}{aa - 2ab + bb + cc}$, on aura $xx - \frac{1cdx}{aa - 2ab + bb + cc} \sim R = \frac{1abry}{aa - 2ab + bb + cc} - R = \frac{1bdy}{aa - 2ab + bb + cc} - yy$, pour le Lieu qu'on cherche.

Changer un Lieu au Cercle en un autre, qui soit donné.

Pour changer le Lieu à l'Hyperbole Equilatere, $xx - yy - \frac{bry}{a} \sim ry - \frac{cx}{a}$, ou $xx \pm \frac{crr}{a} \sim yy \pm \frac{bry}{a}$, dont le Diametre déterminé ou son Parametre est $R = \frac{bbrr}{aa} \pm \frac{bry}{a}$, en un autre Lieu à l'Hyperbole Equilatere, dont le Diametre déterminé ou son Parametre soit donné, comme d , il n'y a qu'à supposer $\frac{bbrr}{aa} \pm \frac{bry}{a} \sim d$, pour avoir $rr \sim \frac{4aadl}{aa - 2ab + bb + cc}$, & par conséquent $r \sim R = \frac{4aadl}{aa - 2ab + bb + cc}$, & si à la place de r , on met $R = \frac{4aadl}{aa - 2ab + bb + cc}$, on aura $xx - \frac{1cdx}{aa - 2ab + bb + cc} \sim R = \frac{1abry}{aa - 2ab + bb + cc} - R = \frac{1bdy}{aa - 2ab + bb + cc} - yy$, pour le Lieu qu'on cherche.

Changer un Lieu à l'Hyperbole Equilatere en un autre, qui soit donné.

dont le Diametre ou son Parametre soit donné, comme d ; il n'y a qu'à supposer $R. \frac{bb}{aa} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{cc}{4aa} \sim d$, pour avoir $r \sim R. \frac{aaad}{aa + 1ab + bb + cc}$, & mettant $R. \frac{aaad}{aa + 1ab + bb + cc}$ à la place de r , on aura $xx + \frac{acda}{R. aa + 1ab + bb + cc} \sim \frac{1ady}{R. aa + 1ab + bb + cc} + \frac{chly}{R. aa + 1ab + bb + cc} + yy$, pour le Lieu qu'on cherche.

Changer
un Lieu à
l'Ellipse en
un autre, qui
soit donné.

Pour changer le Lieu à l'Ellipse, $yy \sim \frac{cx}{a} - \frac{bxx}{a}$, dont le Diametre est à son Parametre, comme a à b , en un autre à l'Ellipse, dont le Diametre soit donné, comme d , & le Parametre soit aussi donné, comme p ; parce que le Diametre & le Parametre sont inégaux, il faut qu'il y ait dans le Lieu proposé deux lettres indéterminées. Reduisons donc le Lieu proposé $yy \sim \frac{cx}{a} - \frac{bxx}{a}$, en un autre, où il y ait encore une quantité indéterminée outre la quantité r , comme f , ce qui se fera ainsi.

Multipliez le premier Lieu à la Parabole, $xx \sim yy$, par $\frac{1}{a}$ pour avoir cet autre Lieu à la Parabole, $\frac{fx}{a} \sim \frac{xy}{a}$ duquel vous ôterez le Lieu proposé, $yy \sim \frac{cx}{a} - \frac{bxx}{a}$, ou $\frac{axy}{b} \sim \frac{cx}{b} - xx$, en ôtant $\frac{cx}{b} - xx$ de $\frac{fx}{a}$, ou $\frac{axy}{b}$ de $\frac{xy}{a}$, pour avoir cet autre Lieu à telle Ellipse que l'on voudra, $\frac{fx}{a} + xx - \frac{cx}{b} \sim \frac{xy}{a} - \frac{xy}{b}$, ou $\frac{bfax + abxx}{aa} - \frac{c}{a} \sim \frac{bfxy}{aa} - yy$, dont le Diametre $R. \frac{bbf}{aa} + \frac{cc}{ab + bf}$ est à son Parametre, comme $ab + bf$, à aa , & parce que le Diametre donné est d , on aura cette Equation, $R. \frac{bfxy}{aa} + \frac{cc}{ab + bf} \sim d$, dans laquelle on trouvera $r \sim R. \frac{a, add + aa, b, ddf}{abf + bf^2 + cc}$: & parce que le Diametre est au Parametre, comme $ab + bf$ à aa , & que le Parametre donné est p , on aura cette analogie, $d, p :: ab + bf, aa$, & par conséquent cette Equation, $aad \sim abp + bfp$, dans laquelle on trouvera $f \sim \frac{aad - abp}{bp}$. Ainsi on a déterminé la quantité f , dont la valeur $\frac{aad - abp}{bp}$ étant mise dans la valeur trouvée de r ,

cette quantité r sera aussi déterminée, & le Lieu proposé à l'Ellipse, $yy \sim \frac{ax}{a} - \frac{bx}{a}$, se trouvera réduit à un autre Lieu à l'Ellipse, dont le Diametre sera d , & le Parametre sera p , comme il étoit proposé.

C'est de la même façon que l'on réduira un Lieu à l'Hyperbole Scalene, en un autre à l'Hyperbole Scalene, dont le Diametre & son Parametre seront donnez.

Il ne reste plus qu'à vous enseigner le moyen de joindre ensemble deux de ces Lieux; pour trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de trois dimensions, où le second terme manque, ce qui servira generalement pour toutes les autres Equations cubiques, parce qu'elles se peuvent reduire à celle-cy. Nous joindrons seulement icy le *Cercle* avec la *Parabole*, parce qu'ils sont les plus simples.

PROBLEME XI.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de trois dimensions, où le second terme manque.

Toutes les Equations possibles de trois dimensions affectées sous le côté, se peuvent reduire à l'une des trois suivantes;

$$x^3 - abx \sim aac.$$

$$x^3 - abx \sim -aac.$$

$$x^3 \dagger abx \sim aac.$$

Pour trouver les Racines de la premiere Equation, $x^3 - abx \sim aac$ par le moyen du premier Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , & du Lieu au Cercle, $ax - cx \sim ay \dagger by - yy$, dont le Rayon

Premiere
Equation.

21. Fig.

est $\frac{1}{4} R. aa + 2ab + bb + cc$. Décrivez sur l'axe AB, la Parabole FAG, dont le Parametre soit égal à la quantité donnée a , & prenez sur cet axe AB, la Ligne $AC \sim \frac{1}{4} a$ & la Ligne $CD \sim \frac{1}{4} b$, pour avoir $AD \sim \frac{1}{4} b$ parce que son Quarré $\frac{aa}{4} + \frac{ab}{2} + \frac{bb}{4}$ le rencontre dans le Rayon du Cercle, & parce qu'il reste encore le Quarré $\frac{cc}{4}$, il faut tirer du point D sur AB, la perpendiculaire $DE \sim \frac{1}{4} c$, pour avoir le Rayon du Cercle $EA \sim \frac{1}{4} R. aa + 2ab + bb + cc$. Décrivez donc du centre E, par le sommet A, une circonférence de Cercle, qui coupe icy celle de la Parabole aux trois points F, O, Q, d'où l'on tirera sur l'axe AB, les perpendiculaires FL, OP, QR, qui seront les trois Racines de l'Equation proposée $x^3 - abx \sim aac$, dont FL, qui est du côté du centre E, sera la Racine véritable, & les deux autres OP, QR, qui sont de l'autre côté, seront les fausses.

Démonstration.

Car si l'on suppose $FL \sim x$, les autres Lignes seront telles que vous les voyez icy marquées,

$$AC \sim \frac{1}{4} a.$$

$$CD \sim \frac{1}{4} b.$$

$$DE \sim \frac{1}{4} c \sim LN.$$

$$AD \sim \frac{1}{4} b.$$

$$FL \sim x.$$

$$AL \sim y \sim \frac{aa}{4}.$$

$$EA \sim \frac{1}{4} R. aa + 2ab + bb + cc \sim EF.$$

$$DL \sim \frac{aa}{4} - \frac{1}{4} b \sim EN.$$

$$FN \sim x - \frac{1}{4} c.$$

$$OP \sim -x.$$

$$QR \sim -x.$$

& dans le Triangle Rectangle ENF, on trouvera

cette Equation $\frac{x^3}{aa} + \frac{ax}{4} + \frac{ab}{4} + \frac{bb}{4} + \frac{cc}{4} - \frac{bax}{a} - cx \sim \frac{aa}{4} + \frac{ab}{4} + \frac{bb}{4} + \frac{cc}{4}$, ou $x^3 - abx \sim aac$, qui est la même que la proposée.

11. Fig.

La même Equation $x^3 - abx \sim aac$, viendra encore, en supposant $OP \sim -x$, ou $QR \sim -x$, d'où il suit que ces deux sont les Racines fausses, & que la première FL , est la véritable. Ce qu'il falloit démontrer.

S C O L I E.

Si le Cercle au lieu de couper la Parabole aux deux points O, Q , la touchoit seulement en un point, comme O , alors la Racine FL , seroit double de la Racine OP , parce que dans ce cas la Ligne OP , représenteroit deux Racines égales.

On tire de cette construction la maniere de résoudre une Equation pure de trois dimensions : car quand la quantité b , sera nulle, le terme abx sera aussi nul, & l'Equation proposée $x^3 - abx \sim aac$, se changera en cette pure, $x^3 \sim aac$, & alors la Ligne $CD \sim \frac{1}{4}b$ sera aussi nulle, de sorte que le point D conviendra avec le point C , duquel il faudra tirer sur l'axe AB la perpendiculaire $DE \sim \frac{1}{4}c$, & achever le reste comme auparavant.

Equation
pure de trois
dimensions.

Pour trouver les Racines de la seconde Equation, $x^3 - abx \sim -aac$, par le moyen du premier Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , & du Lieu au Cercle, $xx + cx \sim ay + by - yy$, dont le Rayon est $\frac{1}{2}R. aa + 2ab + bb + cc$, on fera une construction semblable à la précédente, & des trois Racines FL, OP, QR , la première FL , qui est du côté du centre E , sera la Racine fautive, & les deux autres $OP,$

Deuxième
Equation.

22. Fig

QR, seront les veritables, & la demonſtration ſ'en fera de la même façon.

Il ne reſte donc plus icy qu'à faire la determination des trois quantitez connuës a , b , c , pour empêcher que les deux Racines veritables OP, QR, ne ſoient imaginaires. On void aiſément qu'en quelque Lieu que ſoit le centre E, du Cercle, ce Cercle coupera toûjours la Parabole du côté du centre E, & qu'ainſi dans cette Equation, $x^3 - abx = -aac$, la Racine fauſſe FL ſera toûjours réelle, & que les deux veritables OP, QR, qui ſont de l'autre côté, peuvent être imaginaires, parce qu'il ſe peut faire que le Cercle ne rencontre point de ce côté-là la Parabole, ſçavoir quand la Ligne DE, ſera extrêmement grande, & hors des limites qu'elle doit avoir, & que nous allons icy preſcrire, par raport aux deux quantitez connuës a , b .

Determination.

Si le Cercle ne faiſoit que toucher la Parabole, on auroit cette Equation, $x^3 = \frac{1}{4}aac$, & par conſequent $x = RC. \frac{1}{4}aac$, & l'Equation propoſée $x^3 - abx = -aac$, ſe changera en celle-cy, $\frac{1}{4}aac - abRC. \frac{1}{4}aac = -aac$, dans laquelle on trouvera $\frac{1}{4}c = R. \frac{b}{172}$. Donc puisſque $\frac{1}{4}c$, ou DE, eſt égale à $R. \frac{b}{172}$, quand le Cercle touche la Parabole, elle ne doit par être plus grande que $R. \frac{b}{172}$, autrement le Cercle ne rencontreroit pas la Parabole de ce côté-là, & les deux Racines OP, QR, ſeroient imaginaires.

Troisième Equation.

Pour trouver les Racines de la troiſième Equation, $x^3 + abx = aac$, par le moyen du premier Lieu à la Parabole $xx = ay$, dont le Parametre eſt a , & du Lieu au Cercle, $xx - cx = ay - by - yy$, dont le Rayon eſt $\frac{1}{4}R. aa -$

DES EQUATIONS.

69

$\frac{1}{2}$ R. $aa - 2ab + bb + cc$, on fera une coſtruction ſemblable à la precedente, excepté qu'on fera $CD \propto \frac{1}{2}b$, depuis C vers A, & la Ligne FL ſera la Racine veritable de l'Equation propoſée $x^3 + abx \propto aac$, les deux autres étant imaginaires, & la demonſtration ſ'en fera de la même façon.

13. Fig.

$$AC \propto \frac{1}{2}a.$$

$$CD \propto \frac{1}{2}b.$$

$$DE \propto \frac{1}{2}c \propto NL.$$

$$AD \propto \frac{b+a}{2}.$$

$$FL \propto x.$$

$$AL \propto y \propto \frac{xy}{2}.$$

$$DL \propto \frac{xy}{2} + \frac{b-a}{2} \propto EN.$$

$$FN \propto x - \frac{1}{2}c.$$

$$EA \propto \frac{1}{2}R. aa - 2ab + bb + cc \propto EF.$$

SCOLIE

Cette même Equation, $x^3 + abx \propto aac$, ſe peut reſoudre tres-ſimplement par un Cercle & par une Hyperbole entre ſes Aſymptotes, lorsqu'elle eſt reduite à cette forme, $x^3 + ddx \propto ddm$, ce qui ſe peut faire en cherchant aux trois quantitez b, a, c , une quatrième proportionnelle m , & entre les deux a, b , une moyenne d .

Ayant donc reduit l'Equation propoſée $x^3 + abx \propto aac$, en celle-cy, $x^3 + ddx \propto ddm$, voicy comment vous en pourrez connoître la Racine veritable, par l'interſection d'un Cercle & d'une Hyperbole entre ſes Aſymptotes.

Deſcrivez un Cercle du centre F, dont le Rayon DF ou EF $\propto \frac{1}{2}m$, & tirez à ſon Diametre DE, par K

14. Fig.

14. Fig.

l'extrémité D, la perpendiculaire DB, que vous prolongerez en A, en sorte qu'on ait $DA \sim d$, pour élever du point A sur AB, la perpendiculaire AC, & pour décrire par l'autre extrémité E, du même Diamètre DE, entre les Asymptotes AB, AC, une Hyperbole, qui coupe icy le Cercle au point G, d'où l'on tirera sur AB, la perpendiculaire GH, qui sera la Racine véritable de l'Equation proposée $x^3 + ddx \sim ddm$.

Démonstration.

Car si l'on suppose $GH \sim x$, les autres Lignes seront telles que vous les voyez icy marquées,

$$AD \sim d.$$

$$DE \sim m.$$

$$DF \sim \frac{1}{2}m \sim EF \sim FG.$$

$$GH \sim x \sim DI.$$

$$AH \sim \frac{dm}{x} \sim y.$$

$$DH \sim \frac{dm}{x} - d \sim IG.$$

$$FI \sim m - x.$$

& dans le Triangle rectangle FLG, on trouvera cette Equation, $\frac{1}{2}mm - mx + xx + \frac{dmm}{x} - \frac{16d^2d}{x} + dd \sim \frac{1}{4}mm$, ou $x^4 - mx^3 + ddx - 2ddmx + ddmm \sim 0$, laquelle étant divisée par $x - m$, on aura celle-cy, $x^3 + ddx - ddm \sim 0$, ou $x^3 + ddx \sim ddm$, qui est la même que la proposée.

Origine de la construction précédente.

Pour vous faire voir l'origine de la construction précédente, multipliez l'Equation proposée $x^3 + ddx \sim ddm$, par $x - m$, pour avoir cette autre Equation, $x^4 + ddx - mx^3 - ddmx \sim mddx - ddmm$, & supposez $dm \sim xy$, qui est un Lieu à l'Hyperbole entre les Asymptotes, tel que nous l'avons décrit, & mettant xy à la place de dm , on aura cette autre Equation, $x^4 +$

$ddxx - mx^3 - dxxxy \sim dxxxy - xxyy$, ou $xx \dagger dd - mx \sim 2dy - yy$, qui est un Lieu au Cercle, dont le Rayon est $\perp m$, tel que nous l'avons décrit.

C'est de la même façon que l'on peut résoudre les deux premières Equations, $x^3 - abx \sim aac$, $x^3 - abx \sim -aac$, & cela est trop facile à comprendre, pour en parler icy davantage.

PROBLEME XII.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de trois dimensins, qui a un second terme.

Nous parlerons premierement icy des Equations cubiques affectées sous le Quarré, & nous dirons que quand elles sont possibles, elles se peuvent toutes réduire à l'une des trois suivantes.

$$x^3 - axx \sim aab.$$

$$x^3 - axx \sim -aab.$$

$$x \dagger axx \sim aab.$$

Pour trouver les Racines de la premiere Equation, $x^3 - axx \sim aab$, décrivez sur l'axe AB, la Parabole CAD, dont le Parametre soit égal à la quantité donnée a , & prenez sur le même axe AB, la Ligne AE $\sim a$, & luy tirez par le point E, la perpendiculaire ED, qu'il faut prolonger en F, en sorte qu'on ait EF $\sim -b$, pour décrire du centre F, par le point D, une circonference de Cercle, qui coupe icy celle de la Parabole au point C, duquel on tirera sur l'axe AB, la perpendiculaire CG, qui sera la Racine véritable de l'Equation proposée, $x^3 - axx \sim aab$.

Premiere
Equation.
11. Fig.

Car si l'on suppose CG $\sim x$, les autres Lignes se-

Demonstration.

K ij

25. Fig. ront telles que vous les voyez icy marquées,

$$AE \sim a \sim DE.$$

$$EF \sim \frac{1}{2}b.$$

$$DF \sim a + \frac{1}{2}b \sim CF.$$

$$CG \sim x.$$

$$AG \sim \frac{x^2}{a} \sim y.$$

$$EG \sim \frac{x^2}{a} - a.$$

$$CH \sim x - \frac{1}{2}b.$$

& dans le Triangle rectangle FHC, on trouvera cette Equation, $\frac{x^2}{a} - xx + aa - bx + \frac{1}{4}bb \sim aa + ab + \frac{1}{4}bb$, ou $x^4 - aaxx - aabx - a^3b \sim 0$, laquelle étant divisée par $x + a$, on aura $x^3 - axx - aab \sim 0$, ou $x^3 - axx \sim aab$, qui est la même que la proposée.

Origine de
la construc-
tion prece-
dente.

Pour vous faire voir l'origine de la construction precedente, reduisons l'Equation proposée, $x^3 - axx \sim aab$, en une de quatre dimensions sans second terme, en la multipliant par $x + a$, & il viendra cette Equation de quatre dimensions telle qu'on la demande, $x^4 - aaxx \sim aabx + a^3b$, & si l'on suppose ce Lieu à la Parabole $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , telle que nous l'avons décrite, & qu'on mette ay à la place de xx , & ayy à la place de x^2 , l'Equation precedente, $x^4 - aaxx \sim aabx + a^3b$, se changera en celle-cy, $ayy - a^2y + aabx + a^3b$, ou $yy - ay \sim bx + ab$, qui est encore un Lieu à la Parabole lequel étant ôté du premier $xx \sim ay$, en ôtant $bx + ab$ de xx , & $yy - ay$ de ay ; on aura $xx - bx - ab \sim 2ay - y$, qui est un Lieu au Cercle, dont le Rayon est $a + \frac{1}{2}b$, tel que nous l'avons décrit.

Deuxième
Equation.

C'est de la même façon que l'on reduira la deuxième Equation, $x^3 - axx \sim aab$, en ce Lieu à la

Parabole, $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , & en ce Lieu au Cercle, $xx \dagger bx \dagger ab \sim 2ay - yy$, dont le Rayon est $a \div b$, sçavoir en multipliant l'Equation proposée $x^3 - axx \sim -aab$, par $x \dagger a$, pour avoir cette Equation de quatre dimensions sans second terme, $x^4 - aaxx \sim -aabbx - a^3b$, & en supposant ce Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, car si l'on met ay à la place de xx , & $aayy$ à la place de x^4 , l'Equation precedente $x^4 - aaxx \sim -aabbx - a^3b$ se changera en celle-cy, $aayy - a'y \sim -aabbx - a^3b$, ou $yy - ay \sim -bx - ab$, qui est un Lieu à la Parabole, lequel étant ôté du premier $xx \sim ay$, en ôtant $-bx - ab$ de xx , & $yy - ay$ de ay , on aura ce Lieu au Cercle, $xx \dagger bx \dagger ab \sim 2ay - yy$.

Comme le Rayon de ce Cercle est $a \div b$, la construction sera un peu differente de la precedente, en ce que l'on doit prendre $EF \sim \frac{1}{2}b$, depuis E vers D, & comme le Cercle ne coupe la Parabole qu'au point C du côté du centre F, la perpendiculaire CG sera la Racine fausse de l'Equation proposée, $x^3 - axx \sim -aab$; & comme dans la 27. Fig. le Cercle se trouve coupé encore de l'autre côté aux deux points I, L, les perpendiculaires IK, LM, représenteront les Racines veritables, qui sont imaginaires dans la 26. Fig. parce qu'on y a pris la Ligne $EF \sim \frac{1}{2}b$, plus grande que dans la Fig. 27.

Ainsi vous voyez que dans cette deuxième Equation, $x^3 - axx \sim -aab$, la quantité EF, ou $\frac{1}{2}b$, a besoin de termination, pour empêcher que les deux Racines veritables ne deviennent imaginaires. Pour cette fin voyez la raison qui devrait être entre les deux quantitez données a & b , si le Cercle ne faisoit

26. Fig.

Construc-
tion.
26. Fig.

27. Fig.

Determina-
tion.

que touche la Parabole au point I.

27. Fig.

Analysé.

Supposant donc que le Cercle touche la Parabole au point I, la Ligne FI, sera perpendiculaire à la même Parabole, & l'on aura $KN \sim \frac{1}{2}a$, par la propriété de la perpendiculaire de la Parabole, & en supposant $IK \sim x$, on aura $AK \sim \frac{x^2}{a}$, & conséquemment $KE \sim a - \frac{x^2}{a}$, & $EN \sim \frac{1}{2}a - \frac{x^2}{a}$, & dans les Triangles semblables IKN, FEN, on aura cette analogie, $x, \frac{1}{2}b :: \frac{1}{2}a - \frac{x^2}{a}, \frac{1}{2}a - \frac{x^2}{a}$, & par conséquent cette Equation, $\frac{1}{2}ab \sim \frac{1}{2}ax - \frac{x^3}{a}$, dans laquelle on trouvera $b \sim 2x - \frac{x^3}{a}$, & l'Equation proposée $x^3 - axx \sim -aab$, se changera en celle-cy, $x^3 - axx \sim -2aax + 4x^3$, dans laquelle on trouvera $x \sim \frac{2a}{3}$, & au lieu de $b \sim 2x - \frac{x^3}{a}$, on aura $b \sim \frac{4a}{3}$, & par conséquent $\frac{1}{2}b$ ou EF $\sim \frac{2a}{3}$. Puisque donc la Ligne EF vaut $\frac{2a}{3}$, quand le Cercle touche la Parabole, si on la fait plus grande, le Cercle ne rencontrera pas la Parabole de ce côté-là, & les deux Racines IK, LM, deviendront imaginaires.

Troisième
Equation.

C'est aussi de la même façon que l'on reduira la troisième Equation, $x^3 + axx \sim aab$, en ce Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , & en ce Lieu au Cercle, $xx - bx + ab \sim 2ay - yy$, dont le Rayon est $a - \frac{1}{2}b$, comme auparavant, sçavoir en multipliant l'Equation proposée $x^3 + axx \sim aab$, par $x - a$, & en achevant le reste comme auparavant.

Construc-
tion.

Parce qu'on trouve icy le même Cercle & la même Parabole qu'auparavant, la construction sera la même que la precedente, & des trois Racines CG, IK, LM, la premiere CG sera la veritable, & les deux autres IK, LM, les fausses, comme il est aisé à démontrer.

C'est encore de la même façon, que l'on reduira en deux semblables Lieux les Equations cubiques où tous les termes sont, lesquelles se peuvent toutes reduire à l'une des sept formules suivantes,

$$x^3 + axx + abx \sim aac.$$

$$x^3 - axx + abx \sim -aac.$$

$$x^3 + axx - abx \sim aac.$$

$$x^3 - axx - abx \sim -aac.$$

$$x^3 - axx + abx \sim aac.$$

$$x^3 + axx - abx \sim -aac.$$

$$x^3 - axx - abx \sim aac.$$

Equation
cubique où
tous les ter-
mes sont.

Pour reduire la premiere Equation, $x^3 + axx + abx \sim aac$, en deux Lieux, dont l'un soit à la Parabole, & l'autre au Cercle, multipliez-la par $x - a$, pour avoir cette Equation de quatre dimensions sans second terme, $x^4 + abax - aaxx - aabx \sim aacx - aac$, & supposez ce Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , & mettant ay à la place de xx , & ayy à la place de x^2 , vous aurez cette autre Equation, $ayyy + aaby - ay - aabx \sim aacx - ac$, ou $yy + by - ay \sim bx + cx - ac$, qui est un Lieu à une Parabole, lequel étant ôté du premier $xx \sim ay$, en ôtant $bx + cx - ac$ de xx , & $yy + by - ay$ de ay , on aura ce Lieu au Cercle, $xx - bx - cx + ac \sim 2ay - by - yy$, dont le Rayon R. $ai - ab + \frac{1}{2}bb - ac + \frac{1}{2}bc + \frac{1}{2}cc$.

Premiere
Equation.

Pour joindre le Lieu au Cercle, $xx - bx - cx + ac \sim 2ay - by - yy$, avec le premier Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, décrivez sur l'axe AB, la Parabole CAF, dont le Parametre soit égal à la quantité connue a , & prenez sur le même axe AB, la Ligne AE $\sim a$, & luy tirez par le point E, la perpendiculaire EF, sur la

Construc-
tion.

13. Fig.

23. Fig.

quelle vous prendrez la Ligne $EG \sim \frac{b+c}{1}$ pour tirer du point E, sur EF, la perpendiculaire $GH \sim \frac{1}{2}b$, & pour décrire du centre H, par le point F, une circonférence de Cercle, qui coupe icy celle de la Parabole au point I, d'où l'on tirera sur l'axe AB, la perpendiculaire IK, qui sera la Racine véritable de l'Equation proposée, $x^3 + axx + abx \sim aac$.

Démonstration.

Car si l'on suppose $IK \sim x$, les autres Lignes seront telles que vous les voyez icy marquées,

$$AE \sim a \sim EF.$$

$$EG \sim \frac{b+c}{1} \sim MH \sim KL.$$

$$GF \sim a - \frac{b+c}{1}.$$

$$GH \sim \frac{1}{2}b \sim EM.$$

$$IK \sim x.$$

$$AK \sim \frac{x^2}{2} \sim y.$$

$$EK \sim a - \frac{x^2}{2} \sim GL.$$

$$HL \sim a - \frac{1}{2}b - \frac{x^2}{2}.$$

$$HF \sim R. aa - ab + \frac{1}{2}bb - ac + \frac{1}{2}bc + \frac{1}{2}cc.$$

& dans le Triangle rectangle HLI, on trouvera cette Equation, $\frac{bb}{1} + \frac{bc}{1} + \frac{cc}{4} - bx - cx = xx + aa - ab + \frac{bxx}{2} + \frac{x^3}{2} \sim aa - ab + \frac{bb}{2} - ac + \frac{bc}{2} + \frac{cc}{4}$, ou $x^4 + abxx - aaxx - aacx - aabx + a^3c \sim 0$, laquelle étant divisée par $x - a$, on aura $x^3 + axx + abx - aac \sim 0$, ou $x^3 + axx + abx \sim aac$, qui est la même que la proposée.

Deuxième Equation.

Pour trouver les Racines de la seconde Equation, $x^3 - axx + abx \sim -aac$, on fera une construction semblable à la précédente, & alors la Ligne IK, représentera la Racine faussée, les véritables étant imaginaires parce que le Cercle ne peut pas rencontrer la Parabole de l'autre côté, car le plus loin qu'il puisse aller c'est au sommet A, sçavoir en ce cas auquel les

Lignes

Lignes EG, GH, seroient égales, ce qui ne pourroit arriver que lorsque la quantité c , seroit nulle, auquel cas l'Equation seroit plane. Mais comme la Ligne GH est moindre que la Ligne EG, lorsque la quantité c est réelle, la Ligne FH sera aussi moindre que la Ligne AH, & le Cercle qui sera décrit du centre H, par le point F, ne rencontrera jamais la Parabole au sommet A, & encore moins au delà du même sommet A.

Pour trouver les Racines de la troisième Equation, $x^3 + axx - abx \sim aac$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + bx - cx + ac \sim 2ay + by - yy$, dont le Rayon est R. $aa + ab + \frac{bb}{4} - \frac{bc}{2} - ac + \frac{cc}{4}$, avec son Lieu à la Parabole $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , lesquels on trouvera comme il a été enseigné auparavant, on fera une construction semblable à la precedente, excepté qu'on doit prendre $EG \sim \frac{b-c}{2}$, & qu'on doit tirer la perpendiculaire $GH \sim \frac{1}{2}b$, en bas vers B, & la Ligne IK, sera la Racine veritable de l'Equation proposée, $x^3 + axx - abx \sim aac$, & la demonstration s'en fera comme auparavant.

28. Fig.

Troisième Equation.

29. Fig.

Voyez l'Equation suivante.

Pour trouver les Racines de la quatrième Equation, $x^3 - axx - abx \sim -aac$, on fera une construction semblable à la precedente, & alors la Ligne IK en representera la Racine fausse, les veritables étant imaginaires, comme dans la seconde Equation, $x^3 - axx + abx \sim -aac$, en supposant que le centre H, tombe entre l'axe AB, & le point F, ce qui arrivera lorsque b sera moindre que c , comme il a été supposé dans la construction; car si b avoit été plus grand que c , il auroit falu prendre $EG \sim \frac{b-c}{2}$ de l'au-

Quatrième Equation.

28. Fig.

tre côté, & dans ce cas on auroit le centre H, au delà de l'axe AB, vers C, & de ce même côté on auroit les Racines veritables pour cette Equation, $x^3 - axx - abx \sim -aac$, & les fausses pour la precedente, $x^3 + axx - abx \sim aac$.

Cinquième Equation.

30. Fig.

Pour trouver les Racines de la cinquième Equation, $x^3 - axx + abx \sim aac$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + bx - cx - ac \sim 2ay - by - yy$, dont le Rayon est R. $aa - ab + \frac{bb}{2} + ac - \frac{bc}{2} + \frac{cc}{4}$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, qui se trouveront comme auparavant, on fera une construction semblable à celle de la première Equation, $x^3 + axx + abx \sim aac$, excepté qu'on doit prendre $EG \sim \frac{c-b}{2}$, de l'autre côté sur la Ligne EF prolongée, si b est moindre que c , comme nous avons supposé icy, & alors la Ligne IK, fera l'une des trois Racines veritables de l'Equation proposée, $x^3 - axx + abx \sim aac$, les deux autres étant imaginaires, parce que le Cercle ne peut couper la Parabole qu'en un point.

Sixième Equation.

31. Fig.

Pour trouver les Racines de la sixième Equation, $x^3 + axx - abx \sim -aac$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + bx + cx - ac \sim 2ay + by - yy$, dont le Rayon est R. $aa + ab + \frac{bb}{2} + ac + \frac{bc}{2} + \frac{cc}{4}$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, on fera une construction semblable à celle de la troisième Equation, $x^3 + axx - abx \sim aac$, excepté qu'on doit prendre $EG \sim \frac{b+c}{2}$, de l'autre côté sur la Ligne EF, prolongée, & la Ligne IK sera la Racine fausse de l'Equation proposée $x^3 + axx - abx \sim -aac$, les deux veritables étant imaginaires.

Septième Equation.

On fera une semblable construction, pour connoître les Racines de la septième Equation, $x^3 - axx - abx$.

$\sim aac$, & la Ligne IK, en representera la Racine veritable, les deux fausses étant imaginaires. 31. Fig.

COROLLAIRE.

De la construction de ces sept Equations, où tous les termes sont, on tirera aisément une construction pour les trois du *Probl. XI.* où le troisieme terme manque, en supposant la quantité b nulle, pour faire évanouir le troisieme terme.

PROBLEME XIII.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de quatre dimensions, où le second terme manque.

Toutes les Equations possibles de quatre dimensions sans second terme, se peuvent reduire à l'une des sept suivantes ;

$$x^4 + abxx + aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 + abxx - aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 - abxx + aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 - abxx - aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 + abxx - aacx \sim -a^3 d.$$

$$x^4 - abxx + aacx \sim -a^3 d.$$

$$x^4 - abxx - aacx \sim -a^3 d.$$

Vous avez appris au *Probl. III.* la maniere de reduire ces Equations en Lieux, & c'est pour cela que nous n'en parlerons point icy, & nous enseignerons seulement la maniere de joindre ensemble deux Lieux les plus simples, tels que sont les Lieux au Cercle & à la Parabole, comme Descartes.

Pour trouver les Racines de la premiere Equation, Premiere Equation.

29. Fig.

tre côté, & dans ce cas on auroit le centre H, au delà de l'axe AB, vers C, & de ce même côté on auroit les Racines veritables pour cette Equation, $x^3 - axx - abx \sim -aac$, & les fausses pour la precedente, $x^3 + axx - abx \sim aac$.

Cinquième Equation.

30. Fig.

Pour trouver les Racines de la cinquième Equation, $x^3 - axx + abx \sim aac$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + bx - cx - ac \sim 2ay - by - yy$, dont le Rayon est R. $aa - ab + \frac{bb}{2} + ac - \frac{bc}{2} + \frac{cc}{4}$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, qui se trouveront comme auparavant, on fera une construction semblable à celle de la première Equation, $x^3 + axx + abx \sim aac$, excepté qu'on doit prendre $EG \sim \frac{c-b}{2}$, de l'autre côté sur la Ligne EF prolongée, si b est moindre que c , comme nous avons supposé icy, & alors la Ligne IK, sera l'une des trois Racines veritables de l'Equation proposée, $x^3 - axx + abx \sim aac$, les deux autres étant imaginaires, parce que le Cercle ne peut couper la Parabole qu'en un point.

Sixième Equation.

31. Fig.

Pour trouver les Racines de la sixième Equation, $x^3 + axx - abx \sim -aac$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + bx + cx - ac \sim 2ay + by - yy$, dont le Rayon est R. $aa + ab + \frac{bb}{2} + ac + \frac{bc}{2} + \frac{cc}{4}$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, on fera une construction semblable à celle de la troisième Equation, $x^3 + axx - abx \sim aac$, excepté qu'on doit prendre $EG \sim \frac{b+c}{2}$, de l'autre côté sur la Ligne EF, prolongée, & la Ligne IK sera la Racine fausse de l'Equation proposée $x^3 + axx - abx \sim -aac$, les deux veritables étant imaginaires.

Septième Equation.

On fera une semblable construction, pour connoître les Racines de la septième Equation, $x^3 - axx - abx$.

~ aac , & la Ligne IK , en représentera la Racine véritable, les deux fausses étant imaginaires. 31. Fig.

COROLLAIRE.

De la construction de ces sept Equations, où tous les termes sont, on tirera aisément une construction pour les trois du *Probl. XI.* où le troisième terme manque, en supposant la quantité b nulle, pour faire évanouir le troisième terme.

PROBLEME XIII.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de quatre dimensions, où le second terme manque.

Toutes les Equations possibles de quatre dimensions sans second terme, se peuvent reduire à l'une des sept suivantes ;

$$x^4 + abxx + aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 + abxx - aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 - abxx + aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 - abxx - aacx \sim a^3 d.$$

$$x^4 + abxx - aacx \sim -a^3 d.$$

$$x^4 - abxx + aacx \sim -a^3 d.$$

$$x^4 - abxx - aacx \sim -a^3 d.$$

Vous avez appris au *Probl. III.* la maniere de reduire ces Equations en Lieux, & c'est pour cela que nous n'en parlerons point icy, & nous enseignerons seulement la maniere de joindre ensemble deux Lieux les plus simples, tels que sont les Lieux au Cercle & à la Parabole, comme Descartes.

Pour trouver les Racines de la premiere Equation, Premiere Equation.

32. Fig.

$x^4 + abxx + aacx \sim a^3d$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + cx - ad \sim ay - by - yy$, dont le Rayon est $R. \frac{a}{4} - \frac{ab}{4} + \frac{bb}{4} + \frac{cc}{4} + ad$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, dont le Parametre est a , décrivez sur l'axe AB, la Parabole CAD, dont le Parametre soit égal à la quantité connuë a , & prenez sur cet axe AB, les Lignes $AE \sim \frac{1}{4}a$, $EF \sim \frac{1}{4}b$, & $AG \sim d$; Tirez par le point G, à l'axe AB, la perpendiculaire GH, & par le point F, au même axe AB, la perpendiculaire FI $\sim \frac{1}{4}c$. Menez la droite FA, & luy tirez par le sommet A, la perpendiculaire AL $\sim GH$, pour décrire du centre I, par le point L, une circonference de Cercle, qui coupe icy celle de la Parabole aux deux points C, D, d'où l'on tirera sur l'axe AB, les perpendiculaires CM, DN, qui seront deux des Racines de l'Equation proposée, $x^4 + abxx + aacx \sim a^3d$, les deux autres étant imaginaires, parce que le Cercle ne peut jamais couper la Parabole qu'en deux points: desquelles DN, sera la Racine veritable, & CM la fausse, & la demonstration s'en fera comme auparavant.

Deuxième
Equation.

Pour trouver les Racines de la seconde Equation, $x^4 + abxx - aacx \sim a^3b$, on fera une construction semblable à la precedente, & alors CM sera la Racine veritable, & DN la fausse.

Troisième
Equation.
33. Fig.

Pour trouver les Racines de la troisiéme Equation, $x^4 - abxx + aacx \sim a^3d$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + cx - ad \sim ay + by - yy$, dont le Rayon est $R. \frac{a}{4} + \frac{ab}{4} + \frac{bb}{4} + \frac{cc}{4} + ad$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, on fera une construction semblable à la precedente, excepté qu'on doit prendre $EF \sim \frac{1}{4}b$, de

l'autre côté, depuis E vers B, & alors la Ligne DN 33. Fig.
sera la Racine veritable, & CM, la fausse.

Pour trouver les Racines de la quatrième Equation, $x^4 - abxx - aacx \sim a^3d$, on fera une construction Quatrième Equation.
semblable à la precedente, & des deux Racines CM, DN, qui se trouvent seulement dans cette Figure, la premiere CM, sera la veritable, & l'autre DN, la fausse.

Bienque le Cercle ne coupe icy la Parabole du côté opposé à son centre qu'en un point, il peut néanmoins la couper en trois points de ce même côté, pour les trois Racines fausses de l'Equation proposée, $x^4 - abxx + aacx \sim a^3d$ qui sont veritables pour la precedente, $x^4 - abxx + aacx \sim a^3d$, entre lesquelles une sera toujours réelle, & les deux autres peuvent être imaginaires, comme elles le sont effectivement dans cette Figure, c'est selon le raport de la quantité $\frac{1}{2}c$, ou EF, aux trois autres quantitez connues a, b, d , qui se peut connoître dans le cas auquel ces trois Racines sont réelles, en supposant premierement que le Cercle touche la Parabole, comme vous allez voir.

Supposant donc que le Cercle touche la Parabole au point D, si l'on suppose $DN \sim -x$, on aura $AN \sim \frac{2x}{a}$, & $NK \sim \frac{1}{2}a$, & par consequent $AK \sim \frac{2x}{a} + \frac{1}{2}a$, & à cause de $AF \sim \frac{1}{2}b$, on aura $KF \sim \frac{1}{2}b - \frac{2x}{a}$, & dans les Triangles rectangles semblables, KND, KFI, on aura cette analogie, $-x, \frac{1}{2}a :: \frac{1}{2}c, \frac{1}{2}b - \frac{2x}{a}$, & par consequent cette Equation, $\frac{x^2}{a} - \frac{bx}{2} \sim \frac{ac}{4}$, dans laquelle on trouvera $\frac{1}{2}c$, ou EF $\sim \frac{2x}{a} - \frac{bx}{2}$, & au lieu de l'Equation proposée, $x^4 - abxx - aacx \sim a^3d$, on

34. Fig.
Determine-
nation.

34. Fig.

aura celle-cy, $-3x^4 + abxx \sim a^3d$, dans laquelle on trouvera $x \sim R. \frac{ab}{4} - R. \frac{a^2bb}{16} - \frac{a^3d}{4}$, ou $x \sim R. \frac{a}{4} + R. \frac{a^2bb}{16} - \frac{a^3d}{4}$, où l'on voit, que $\frac{a^2bb}{16}$ ne doit pas être moindre que $\frac{a^3d}{4}$, & que par conséquent b ne doit pas être moindre que $R. 12ad$, &c.

Cinquième Equation.

35. Fig.

Pour trouver les Racines de la cinquième Equation, $x^4 + abxx - aacx \sim a^3d$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx - cx + ad \sim ay - by - yy$, dont le Rayon est $R. \frac{aa}{4} - \frac{ab}{2} + \frac{bb}{4} + \frac{cc}{4} - ad$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, on fera une construction semblable à celle de la première Equation, $x^4 + abxx + aacx \sim a^3d$, excepté qu'au lieu de tirer la Ligne AL égale à GH, perpendiculairement sur la Ligne AI, il la faut inscrire dans un demy Cercle décrit à l'entour de la même Ligne AI, parce que dans le Rayon du Cercle il y a $-ad$, qui est une marque de soustraction, & les deux perpendiculaires CM, DN, représenteront les deux Racines véritables de l'Equation proposée, $x^4 + abxx - aacx \sim a^3d$, les deux autres étant essentiellement imaginaires, parce que le Cercle ne sçauroit jamais couper la Parabole qu'en deux points.

S C O L I E

Il peut arriver aussi que le Cercle ne rencontre point du tout la Parabole, & alors les quatre Racines seront imaginaires. Pour connoître le cas auquel les deux Racines véritables CM, DN, seront toujours réelles, cherchons le rapport de $\frac{c}{a}$, ou de FI, avec les trois autres quantitez connues a , b , d , quand le Cercle ne fait que toucher la Parabole.

D termi.

D&I 102.

Supposant donc que le Cercle touche la Parabole

au point D, menons la droite IDK, & supposons $DN \sim x$, pour avoir $AN \sim \frac{x^2}{a}$, & $NK \sim \frac{1}{a}x$, & par conséquent $AK \sim \frac{x^2}{a} + \frac{1}{a}x$, & à cause de $AF \sim \frac{b^2}{a}$, on aura $KF \sim \frac{x^2}{a} + \frac{1}{a}x$, & dans les Triangles semblables, KFL, KND, on aura cette analogie, $\frac{x^2}{a} + \frac{1}{a}x : \frac{1}{a}x :: \frac{1}{a}x : x$, & par conséquent cette Equation, $\frac{x^2}{a} + \frac{1}{a}x \sim \frac{bx}{a}$, dans laquelle on trouvera $\frac{1}{a}x$, ou $FL \sim \frac{bx}{a} + \frac{bx}{a}$, & au lieu de l'Equation proposée, $x^4 + abxx - aacx \sim -a^3d$, on aura celle-cy, $x^4 + \frac{1}{a}abxx \sim \frac{1}{a}a^3d$, dans laquelle on trouvera $x \sim R. -\frac{ab}{a} + R. \frac{11bb}{16} + \frac{1}{3}d$, & au lieu de $\frac{1}{a}x$, ou $FI \sim \frac{bx}{a} + \frac{bx}{a}$, on aura une autre valeur pour la Ligne FI. Puisque donc la Ligne FI, étant de cette grandeur le Cercle touche la Parabole, elle doit être plus grande, afin qu'il la puisse couper.

35. Fig.

Pour trouver les Racines de la sixième Equation, $x^4 - abxx + aacx \sim -a^3d$, en joignant son Lieu au Cercle, $xx + cx + ad \sim ay + by - yy$, avec son Lieu à la Parabole, $xx \sim ay$, on fera une construction semblable à la précédente, excepté qu'on doit prendre $EF \sim \frac{1}{a}b$, de l'autre côté vers B, & comme le Cercle coupe icy la Parabole aux quatre points C, D, P, R, les quatre perpendiculaires CM, DN, PQ, RS, seront les Racines de l'Equation proposée, $x^4 - abxx + aacx \sim -a^3d$, dont les deux premières CM, DN, seront les fausses, & les deux autres PQ, RS, seront les veritables.

Sixième Equation.

36. Fig.

Pour trouver les Racines de la septième Equation, $x^4 - abxx - aacx \sim -a^3d$, on fera une construction semblable à la précédente, & alors CM, DN, seront les deux Racines veritables, & PQ, RS, les deux

Septième Equation.

34. Fig. fausses, lesquelles seront imaginaires, quand elles seront hors des limites de la détermination suivante.

Determi-
nation.

Supposant que le Cercle touche la Parabole au point P, menons la droite IKP, & supposons $PQ \sim -x$, pour avoir $AQ \sim \frac{xx}{a}$, & $QR \sim \frac{1}{2}a$, & conséquemment $AK \sim \frac{xx}{a} + \frac{1}{2}a$, & à cause de $AF \sim \frac{a+b}{2}$, on aura $KF \sim \frac{1}{2}b - \frac{xx}{a}$, & dans les Triangles semblables IFK, KPQ, on aura cette analogie, $\frac{1}{2}c, \frac{1}{2}b - \frac{xx}{a} :: -x, \frac{1}{2}a$, & par conséquent cette Equation, $\frac{xx}{a} - \frac{bx}{2} \sim \frac{ac}{4}$, dans laquelle on trouvera $\frac{1}{2}c$, ou $FI \sim \frac{xx}{2a} - \frac{bx}{4}$, & l'Equation proposée, $x^4 - abxx - aacx \sim -a^3d$, se changera en celle-cy, $x^4 - \frac{1}{2}abxx \sim \frac{1}{2}a^3d$, dans laquelle on trouvera $x \sim R. \frac{ab}{2} \pm R. \frac{a^3db}{16} \pm \frac{a-1}{1}$, & au lieu de $\frac{c}{2}$, ou $FI \sim \frac{xx}{2a} - \frac{bx}{4}$, on aura une autre valeur pour la Ligne FI. Puisque donc la Ligne FI, étant de cette grandeur, le Cercle touche la Parabole, étant moindre, le Cercle coupera la même Parabole.

COROLLAIRE.

De la construction de ces sept Equations de quatre dimensions, où le second terme manque, on tirera aisément une construction pour les Equations de trois dimensions sans second terme, en supposant la quantité d , nulle, & l'on réduira sans peine toutes ces constructions à une seule, qui sera generale pour toutes les Equations de trois & de quatre dimensions, où le second terme manque, à la maniere de M^r Descartes, si l'on prend garde que les Racines veritables se rencontrent du côté du centre I, dans les Equations où la quantité c , est niée, lorsque tous les

termes

termes sont mis d'un seul côté , & que quand la même quantité c , est affirmée , les Racines veritables sont du côté opposé au centre I , & qu'on doit prendre EF $\propto \frac{1}{2}b$, depuis E vers B , si la quantité b , est niée , ou depuis E vers le sommet A , si la même quantité b , est affirmée , & qu'enfin le Cercle doit passer par le sommet A , si la quantité d , est nulle , c'est-à-dire si l'Equation n'a que trois dimensions , & si elle en a quatre , le Cercle doit passer par le point L , qu'on trouvera en tirant par le sommet A , à la Ligne AI , la perpendiculaire AL $\propto$ GH , si la quantité d est niée , & si elle est affirmée , on doit inscrire la même Ligne AL $\propto$ GH , dans un demy Cercle décrit à l'entour de la Ligne AI.

Nous pourrions icy donner des Regles pour la construction des Equations de quatre dimensions , où tous les termes sont , mais cela seroit icy inutile , puisque vous devez être assez sçavant pour les pouvoir inventer de vous-même , outre que vous en pouvez ôter le second terme , pour les rendre d'une forme semblable à l'une des sept precedentes.

PROBLEME XIV.

Trouver par Geometrie les Racines d'une Equation de cinq & de six dimensions.

Bien que les Equations de cinq & de six dimensions ne soient pas d'un si grand usage que les precedentes , nous en dirons pourtant icy quelque chose , pour vous faire voir que par la jonction de deux Lieux on peut résoudre tout Probleme possible dans les Mathematiques.

Les Equations de cinq & de six dimensions se reduiront en Lieux comme celles de trois dimensions , en commençant par le Lieu à la *Parabole plane* , ou par le Lieu à la *Parabole solide* , ou par quelqu'autre Lieu du premier ou du second genre , selon la commodité , pour en avoir d'autres , entre lesquels on choisira les plus simples & les plus communs , tels que sont les Lieux à la *Conchoïde* , à la *Cysoïde* , & quelques autres , dont nous parlerons ailleurs.

Equat'on
de cinq di-
mensions.
fictée sous
le Quarré.

Proposons en premier Lieu cette Equation de cinq dimensions , $x^5 - aabxx \sim a^4c$, où le second , le troisième , & le cinquième terme manquent. Supposez ce Lieu à la *Parabole solide* , $x^3 \sim aay$, dont le Parametre est égal à la quantité connue a , & mettant aay à la place de x^3 , l'Equation proposée , $x^5 - aabxx \sim a^4c$, ou $x^5 - aabx^3 \sim a^4cx$, se changera en celle cy , $a^4yy - a^4by \sim a^4cx$, ou $yy - by \sim cx$, qui est un Lieu à la *Parabole plane* , dont le Parametre est égal à la quantité connue c . De la jonction de ces deux Lieux , on tire cette construction.

Construc-
tion.
37. Fig.

Décrivez sur le Diametre BF , la *Parabole solide* ABC , dont le Parametre BH $\sim a$, & prenez sur le même Diametre BF , la Ligne BD $\sim \frac{1}{2}b$, & tirez par le point D , sur l'axe BF , la perpendiculaire DE $\sim \frac{bh}{c}$, pour décrire par les points E , B , sur le Diametre DE , la *Parabole plane* AEB , qui coupe icy la *Parabole solide* ABC au point A , d'où l'on tirera sur le Diametre BF l'ordonnée AF , qui sera la Racine veritable de l'Equation proposée $x^5 - aabxx \sim a^4c$.

Demon-
stration.

Car si l'on suppose AF $\sim x$, les autres Lignes seront telles que vous les voyez icy marquées ,

$$BH \sim a.$$

$$EI \sim c.$$

$$BD \sim \frac{1}{a} b.$$

$$DE \sim \frac{b^2}{4a}.$$

$$AF \sim x \sim DG.$$

$$BF \sim \frac{x^2}{2a} \sim y.$$

$$DF \sim \frac{x^2}{2a} - \frac{1}{2} b \sim AG.$$

$$EG \sim x + \frac{b^2}{4a}.$$

37. Fig.

& parce que le Rectangle IEG, est égal au Quarré AG, par la propriété de la Parabole plane, on aura cette Equation, $cx + \frac{1}{2} bb \sim \frac{x^2}{2a} - \frac{bx}{2a} + \frac{1}{2} bb$, ou $x^2 - aabxx \sim a^2c$, qui est la même que la proposée.

Ou bien supposez ce Lieu à l'Hyperbole solide entre ses Asymptotes, $xy \sim ac$, & mettant xy à la place de ac , l'Equation proposée $x^2 - aabxx \sim a^2c$, se changera en celle-cy, $x^2 - aabxx \sim aaxxy$, ou $x^2 \sim aay + aab$, qui est un Lieu à la Parabole solide, dont le Parametre est a .

C'est pourquoy décrivez sur le Diametre BF, la Parabole solide ABC, semblable à la précédente, & prenez sur ce Diametre BF, la Ligne BD $\sim b$, & menez par le point D, parallèlement à l'une des ordonnées de la Parabole solide, la Ligne DE $\sim a$, & par le point E, parallèlement au Diametre BF, la Ligne EG $\sim c$, pour décrire par le point G, entre les asymptotes DE, DF, une Hyperbole solide, où le solide commun soit ac , laquelle coupe icy la Parabole solide au point A, par lequel on tirera sur le Diametre BF, l'ordonnée AF, qui sera la Racine véritable de l'Equation proposée, $x^2 - aabxx \sim a^2c$.

Autre construction.
38. Fig.

Car si l'on suppose $AF \sim x$, les autres Lignes se-

Démonstration.

M ij

ront telles que vous les voyez icy marquées,

$$DE \sim a.$$

$$BD \sim b.$$

$$EG \sim c.$$

$$AF \sim x \sim DH.$$

$$BF \sim \frac{x^2}{aa} \sim \frac{ax}{xx} + b.$$

$$AH \sim \frac{ax}{xx} \sim y.$$

& comme la Ligne BF, se trouve icy exprimée en deux façons, par la différente propriété de chaque Lieu, on aura cette Equation $\frac{x^2}{aa} \sim \frac{ax}{xx} + b$, ou $x^4 - aabxx \sim a^3c$, qui est la même que la proposée.

Equation
de cinq d.
m^{re} dimensions.
scilicet sous
le Quatre
quatre.

Proposons en second Lieu cette Equation de cinq dimensions, $x^4 - bx^2 \sim aab^3$, où le troisième, le quatrième, & le cinquième terme manquent. Multipliez-la par a , afin que le dernier terme devienne cubique, & vous aurez cette autre Equation, $ax^4 - abx^2 \sim a^3b^3$, & supposez ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $xy \sim ab$, & mettant xy à la place de ab , on aura cette autre Equation, $ax^4 - x^2y \sim x^2y^3$, ou $axx - xxy \sim y^3$, qui est un Lieu à la Cissoïde, où le Diametre de son Cercle generateur est a .

Construc.
tion.
39 Fig.

C'est pourquoy tirez les deux perpendiculaires indefinies AB, AH, & prenez sur AH, la Ligne AC $\sim a$, & luy tirez par le point c, la perpendiculaire CF $\sim b$, pour décrire par le point F, entre les Asymptotes AB, AH, l'Hyperbole EF, & par le sommet A, la Cissoïde AE, dont l'axe soit AB, le Diametre du Cercle generateur soit AC, & l'Asymptote soit CFG. Enfin tirez par le point de section E, sur le Diametre AC, la perpendiculaire ED, qui sera la Racine véritable de l'Equation proposée, $x^4 - bx^2 \sim aab^3$.

Car si l'on suppose $DE \propto x$, les autres Lignes seront
telles que vous les voyez icy marquées, Démon-
stration.

$$AC \propto a.$$

$$CF \propto b.$$

$$DE \propto x \propto AI.$$

$$AD \propto y \propto \frac{ab}{x} \propto IE.$$

& parce que le cube de AD , est égal au solide sous
 CD , & le Quarré DE , par la nature de la Cissoïde,
on aura cette Equation, $\frac{a^3 b^3}{x^3} \propto axx - abx$, ou $x^3 - bx^2$
 $\propto aab^3$, qui est la même que la proposée.

On fera une construction tout-à-fait semblable, Equation
de cinq di-
mensions af-
fectée sous
le côté.
pour trouver la Racine véritable de cette autre Equa-
tion de cinq dimensions, $x^5 + aabbx \propto a^4bb$, excepté
qu'il faut tirer sur l'axe AB , l'ordonnée EI , qui sera
la Racine véritable qu'on cherche.

Proposons encore cette Equation de cinq dimen- Equation
de cinq di-
mensions af-
fectée sous
le Quarré
& sous le
côté.
sions $x^5 - aabxx + a^4x \propto a^4c$; supposez ce Lieu à
la Parabole solide, $x^3 \propto aay$, dont le Parametre est
 a , & mettant aay à la place de x^3 , l'Equation pro-
posée, $x^5 - aabxx + a^4x \propto a^4c$, ou $x^5 - aabx + a^4xx \propto$
 a^4cx , se changera en celle-cy, $a^4yy - a^4by + a^4xx \propto$
 a^4cx , ou $yy - by \propto cx - xx$, qui appartient à un Cercle,
dont le Rayon est $R. bb + cc$.

C'est pourquoy décrivez sur l'axe AB , la Parabole Construc-
tion.
40. Fig.
solide CAD , semblable à la précédente & prenez sur
le même axe AB , la Ligne $AE \propto \frac{1}{2}b$, & luy tirez
par le point E , la perpendiculaire $EF \propto \frac{1}{2}c$, pour
décrire du centre F , par le sommet A , une circon-
ference de Cercle, qui coupe icy celle de la Para-
bole solide au point C , duquel on tirera sur l'axe
 AB , la perpendiculaire CG , qui sera la Racine vé-

40. Fig. ritable de l'Equation proposée, $x^6 - aabxx + a^4x \sim a^4c$.
 Démonf. Car si l'on suppose $CG \sim x$, les autres Lignes se-
 tration, ront telles que vous les voyez icy marquées;

$$AE \sim \frac{1}{2}b.$$

$$EF \sim \frac{1}{2}c.$$

$$AF \sim \frac{1}{2}R. bb + cc \sim CF.$$

$$CG \sim x.$$

$$AG \sim \frac{x^2}{2a} \sim \bar{y}.$$

$$EG \sim \frac{x^2}{2a} - \frac{1}{2}b \sim FH.$$

$$CH \sim x - \frac{1}{2}c.$$

& dans le Triangle rectangle CHF, on trouvera cette Equation, $xx - cx + \frac{cc}{4} + \frac{x^2}{2a} - \frac{bx}{2} + \frac{bb}{4} \sim \frac{bb}{4} + \frac{cc}{4}$, ou $x^6 - aabxx + a^4x \sim a^4c$, qui est la même que la proposée.

Equation
de fix di-
mensions af-
fectée sous
le cube &
sous le côté.

Proposons maintenant cette Equation de six di-
 mensions, $x^6 - aabx^3 + a^4cx \sim a^4d$, où le second, le
 troisième & le cinquième terme manquent, suppo-
 sons ce Lieu à la Parabole solide, $x^3 \sim aay$, dont le
 Parametre est a , & mettant aay à la place de x^3 ,
 l'Equation proposée, $x^6 - aabx^3 + a^4cx \sim a^4d$, se chan-
 gera en celle-cy, $a^4yy - a^4by + a^4cx \sim a^4d$, ou $yy - by \sim$
 $ad - cx$, qui est un Lieu à la Parabole plane, dont
 le Parametre est c .

Construc-
tion.
41 Fig.

C'est pourquoy décrivez sur l'axe BD, la Parabole
 solide ABC, dont le Parametre soit égal à la quanti-
 té connuë a , & prenez sur le même axe BD, la Li-
 gne $BD \sim \frac{1}{2}b$, & luy tirez par le point D, la perpen-
 diculaire $DE \sim \frac{bb}{2c} + \frac{a^2}{2}$, pour décrire sur l'axe DE, par
 le point E, la Parabole plane AEC, dont le Para-
 metre soit égal à la quantité connuë c . Ces deux Pa-
 raboles s'entre-coupent icy aux deux points C, F, d'où
 l'on tirera sur l'axe BD, les perpendiculaires CG, FI,

dont CG sera la Racine veritable, & FI la Racine fausse de l'Equation proposée, $x^6 - aabx^3 + a^4cx \sim a^4d$, & la demonstration s'en fera comme auparavant, sur tout si l'on regarde la valeur de chaque Ligne, que nous avons icy marquée,

$$BD \sim \frac{1}{2} b.$$

$$DE \sim \frac{bb}{4c} + \frac{ad}{c}.$$

$$CG \sim x \sim DH.$$

$$BG \sim y \sim \frac{x^3}{aa}.$$

$$EH \sim \frac{bb}{ac} + \frac{ad}{c} - x.$$

$$CH \sim R. \frac{bb}{c} + ad - cx \sim \frac{1}{2} b - \frac{x^3}{2a}.$$

Proposons encore cette Equation de six dimensions, $x^6 - aabx^3 + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$. Supposéz ce Lieu à la Parabole solide, $x^3 \sim aay$, dont le Parametre est a , & mettant aay à la place de x^3 , l'Equation proposée $x^6 - aabx^3 + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$, se changera en celle-cy, $a^4yy - a^4by + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$, ou $yy - by \sim ad + cx - xx$, qui est un Lieu au Cercle, dont le Rayon est $R. \frac{bb}{c} + ad + \frac{cc}{c}$.

Equation de six dimensions af. fectée sous le cube, sous le Quarté, & sous le côté.

C'est pourquoy décrivez sur l'axe AB, la Parabole solide CAD, semblable à la precedente, & prenez sur le même axe AB, la Ligne AE $\sim \frac{1}{2} b$, & luy tirez par le point E, la perpendiculaire EF $\sim \frac{1}{2} c$. Après tirez à la Ligne FA la perpendiculaire AL $\sim R. ad$, pour décrire du centre F, par le point L, une circonférence de Cercle, qui coupe icy celle de la Parabole solide aux deux points C, I, d'où l'on tirera sur l'axe AB, les perpendiculaires, CG, IK, dont CG sera la Racine veritable, & IK la Racine fausse de l'Equation proposée, $x^6 - aabx^3 + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$, comme il est aisé à démontrer, en regardant le nom de chaque Ligne, qui a été icy ajouté.

Construction.
41. F.g.

40. Fig. ritable de l'Equation proposée, $x^5 - aabxx + a^4x \sim a^4c$.

Demonf. Car si l'on suppose $CG \sim x$, les autres Lignes seront telles que vous les voyez icy marquées;

$$AE \sim \frac{1}{2}b.$$

$$EF \sim \frac{1}{2}c.$$

$$AF \sim \frac{1}{2}R. bb + a \sim CF.$$

$$CG \sim x.$$

$$AG \sim \frac{x^2}{2a} \sim \bar{y}.$$

$$EG \sim \frac{x^3}{2a} - \frac{1}{2}b \sim FH.$$

$$CH \sim x - \frac{1}{2}c.$$

& dans le Triangle rectangle CHF, on trouvera cette Equation, $xx - cx + \frac{cc}{2} + \frac{x^3}{2a} - \frac{bx}{2} + \frac{bb}{4} \sim \frac{bb}{4} + \frac{cc}{4}$, ou $x^5 - aabxx + a^4x \sim a^4c$, qui est la même que la proposée.

Equation
de fix di-
mensions af-
fectée sous
le cube &
sous le côté.

Proposons maintenant cette Equation de fix dimensions, $x^6 - aabx^3 + a^4cx \sim a^4d$, où le second, le troisiéme & le cinquiéme terme manquent, supposons ce Lieu à la Parabole solide, $x^3 \sim aay$, dont le Parametre est a , & mettant aay à la place de x^3 , l'Equation proposée, $x^6 - aabx^3 + a^4cx \sim a^4d$, se changera en celle-cy, $a^4yy - a^4by + a^4cx \sim a^4d$, ou $yy - by \sim ad - cx$, qui est un Lieu à la Parabole plane, dont le Parametre est c .

Construc-
tion.

41 Fig.

C'est pourquoy décrivez sur l'axe BD, la Parabole solide ABC, dont le Parametre soit égal à la quantité connuë a , & prenez sur le même axe BD, la Ligne $BD \sim \frac{1}{2}b$, & luy tirez par le point D, la perpendiculaire $DE \sim \frac{bb}{2c} + \frac{a^4}{c}$, pour décrire sur l'axe DE, par le point E, la Parabole plane AEC, dont le Parametre soit égal à la quantité connuë c . Ces deux Paraboles s'entre-coupent icy aux deux points C, F, d'où l'on tirera sur l'axe BD, les perpendiculaires CG, FI,

dont CG sera la Racine veritable , & FI la Racine fausse de l'Equation proposée , $x^6 - aabx^3 + a^4cx \sim a^4d$, & la demonstration s'en fera comme auparavant , sur tout si l'on regarde la valeur de chaque Ligne , que nous avons icy marquée ,

$$BD \sim \frac{1}{4}b.$$

$$DE \sim \frac{bb}{4c} + \frac{xd}{4c}.$$

$$CG \sim x \sim DH.$$

$$BG \sim y \sim \frac{x^3}{aa}.$$

$$EH \sim \frac{bb}{4c} + \frac{ad}{c} - x.$$

$$CH \sim R. \frac{bb}{4c} + ad - cx \sim \frac{1}{4}b - \frac{x^3}{aa}.$$

Proposons encore cette Equation de six dimensions , $x^6 - aabx^3 + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$. Supposéz ce Lieu à la Parabole solide , $x^3 \sim aay$, dont le Parametre est a , & mettant aay à la place de x^3 , l'Equation proposée $x^6 - aabx^3 + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$, se changera en celle-cy , $a^4yy - a^4by + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$, ou $yy - by \sim ad + cx - xx$, qui est un Lieu au Cercle , dont le Rayon est $R. \frac{bb}{4c} + ad + \frac{cc}{4c}$.

Equation de six dimensions af. fectée sous le cube, sous le Quarré, & sous le côté.

C'est pourquoy décrivez sur l'axe AB , la Parabole solide CAD , semblable à la precedente , & prenez sur le même axe AB , la Ligne AE $\sim \frac{1}{4}b$, & luy tirez par le point E, la perpendiculaire EF $\sim \frac{1}{4}c$. Après tirez à la Ligne FA la perpendiculaire AL $\sim Rad$, pour décrire du centre F , par le point L , une circonference de Cercle , qui coupe icy celle de la Parabole solide aux deux points C , I , d'où l'on tirera sur l'axe AB , les perpendiculaires , CG , IK , dont CG sera la Racine veritable , & IK la Racine fausse de l'Equation proposée , $x^6 - aabx^3 + a^4xx - a^4cx \sim a^4d$, comme il est aisé à démontrer , en regardant le nom de chaque Ligne , qui a été icy ajouté .

Construction.
41. Fig.

42. Fig.

$$AE \sim \frac{1}{2} b.$$

$$EF \sim \frac{1}{2} c \sim GH.$$

$$AF \sim R. \frac{bb + cc}{4}.$$

$$AL \sim R. ad.$$

$$FL \sim R. \frac{bb}{4} + ad \frac{cc}{4} \sim FG.$$

$$CG \sim x.$$

$$AG \sim y \sim \frac{x^2}{aa}.$$

$$EG \sim \frac{x^2}{aa} - \frac{1}{2} b \sim FH.$$

$$CH \sim x - \frac{1}{2} c.$$

Il ne sera pas plus difficile de reduire en Lieux les autres Equations qui peuvent arriver, & d'en tirer des constructions à l'imitation des precedentes.

FIN.

PERMISSION.







Permis d'imprimer, fait ce 4. Avril 1687.

DE LA RETNIE.

A PARIS,
De l'Imprimerie d'ESTIENNE CHARDON,
rue Galande, près saint Blaise.

600370





1875

1875

1875







1875

1875

1875






1875







Sección. Con. p. 38.







Sect. Con. p. 50.




19 Fig.



20 Fig.




21 Fig.







22 Fig.













Sect. Con. p. 60.



























41. Fig.



42. Fig.







43. Fig.







44. Fig.
















Scot. Con. p. 132.



53. Fig.



54. Fig.



55. Fig.





69391
TRAITE'
DES LIEUX
GEOMETRIQUES.

EXPLIQUEZ

Par une Méthode courte & facile.

*Par M. OZANAM, Professeur
en Mathématique.*



A PARIS,

Chez ESTIENNE MICHALLET, rue S. Jacques,
à l'Image S. Paul.

M. DC. LXXXVII.

AVEC PERMISSION.

THE

LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF

CHICAGO

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

AU LECTEUR.

MON intention n'étoit pas, Mon cher Lecteur, de vous donner si-tôt ce *Traité des Lieux Geometriques*, parce que je voulois voir auparavant, si le *Traité* precedent auroit le bonheur de vous plaire. Mais le Libraire m'ayant prié de ne pas différer davantage, pour satisfaire à plusieurs Personnes curieuses, qui luy demandoient avec empressement ce *Traité*, & encore le suivant; cela m'a obligé de vous donner ces deux *Traitez*, tels que je les avois composez pour mon usage, sans les avoir augmentez que de quelques Questions au commencement de chaque *Traite*, pour vous mieux faire comprendre l'usage des Lieux Geometriques, pour la solution des Problemes Geometriques, qui reçoivent une

*infinite' de solutions , & qu'à cause de
cela on nomme Indeterminez ; & l'u-
tilite de la Construction des Equa-
tions , pour resoudre les Problemes
Geometriques , qui n'ont qu'un certain
nombre de solutions differentes , & que
pour cela on appelle Determinez.*





TRAITE'

DES LIEUX

GEOMETRIQUES.



OR s qu'après avoir accompli les conditions d'un Probleme, il demeure dans la derniere Equation plus d'une lettre inconnuë, le Probleme est un *Lieu*; & quand il ne reste que deux lettres inconnuës, ce Lieu est une *Ligne*, qui sera droite, lorsque dans l'Equation constitutive chaque lettre inconnuë n'aura qu'une dimension, & qu'elles ne se multiplieront point ensemble; & alors ce Lieu est appelé *Simple*, ou à la *Ligne droite*.

Mais, si l'une de ces deux lettres inconnuës a deux dimensions, ou bien, quand leur Rectangle se trouve dans l'Equation constitutive, cette ligne locale est courbe, & elle est toujours la circonference ou d'un *Cercle*, ou d'une *Ellipse*, ou d'une *Parabole*, ou d'une *Hyperbole*: C'est selon la disposition des deux lettres inconnuës dans l'Equation: car si le *Quarré* d'une

6 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

lettre inconnüe se trouve affirmé d'un côté de l'Equation, & réduit à l'unité, & que le Quarré de l'autre lettre inconnüe se trouve nié de l'autre côté, & pareillement réduit à l'unité, sans que le Rectangle de ces deux mêmes lettres inconnües se trouve dans l'Equation, cette ligne courbe sera la circonference d'un Cercle, pour le moins lorsque les deux lettres inconnües feront un Angle droit, & alors le Lieu se nomme *Plan*, ou *au Cercle*.

*Lieu
Plan.*

Dans les autres cas cette ligne courbe peut être la circonference d'une *Ellipse*, d'une *Parabole*, & d'une *Hyperbole*, & alors ce Lieu est appelé *Solide*.

*Lieu
Solide.*

Mais, si dans l'Equation l'une des deux lettres inconnües, ou toutes deux ensemble, ont trois ou quatre dimensions, la ligne courbe qui determinera ce Lieu, qu'on appelle *Surfolide*, sera une *Ligne du second genre*. Et comme le nombre de ces lignes n'a pas encore été déterminé, nous ne parlerons icy que des Lieux *Simple*s, *Plans*, & *Solides*.

*Lieu
Surfolide.*

Nous ajoutérons donc, que le Cercle se change en *Ellipse*, lorsque les deux lettres inconnües ne font pas un Angle droit, ou bien lorsque le Quarré de l'une n'est pas réduit à l'unité.

*Lieu à
l'Ellipse.*

Que si le Quarré de chaque lettre inconnüe se trouve affirmé; ou si au lieu du Quarré d'une lettre inconnüe il y a le Rectangle de ces deux lettres; ou bien encore si ce Rectangle se trouve seul égal à un autre Rectangle connu, le Lieu est une *Hyperbole*.

*Lieu à
l'Hyper-
bole.*

Enfin, si ce Rectangle ne se trouve point dans l'Equation, & que le Quarré de l'une des lettres inconnües s'y rencontre, le Lieu est une *Parabole*. Tout

*Lieu à
la Para-
bole.*

cela se démontrera par ordre dans les Problemes suivans.

Mais, auparavant que de venir à la pratique, pour vous mieux faire comprendre ce que nous venons de dire, nous ajouterons ici quelques Questions, dont la premiere vous fera connoître, qu'un Probleme est aussi un Lieu, bien que dans son Equation constitutive il ne demeure que l'une des deux lettres inconnues, qui auront été introduites dans l'Analyse, & qui doivent toujours faire en lignes un Angle donné, pourvû que l'autre lettre inconnue n'ait pas été déterminée, comme vous allez voir.

QUESTION I.

Trouver au dedans d'un Angle rectiligne donné, un point, duquel tirant aux deux lignes de cet Angle deux perpendiculaires, la somme de ces deux perpendiculaires soit égale à une ligne donnée. *Lieu à la ligne droite.*

ON donne l'Angle rectiligne BAC , & il est proposé de trouver au dedans de cet Angle le point D , duquel tirant aux deux lignes AB , AC , les perpendiculaires DB , DC , leur somme $DB + DC$, soit égale à la ligne donnée AE . 1. Fig.

Ayant tiré deux points E , C , sur AB , les perpendiculaires EF , CG , & du point D , à la ligne CG , la perpendiculaire DH , comme si la Question étoit déjà résolue, supposez

8 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

$$AE \propto a.$$

$$EF \propto b.$$

$$AF \propto c.$$

$$CD \propto x.$$

$$AC \propto y.$$

Parce que l'Angle donné BAC, est icy supposé aigu, les deux perpendiculaires EF, CG, tomberont au dedans du même Angle: & parce que les quatre lignes AE, AF, CD, CH, sont proportionnelles, aussi-bien que les quatre AE, EF, CD, DH, à cause des Triangles semblables AEF, CDH, on trouvera $CG \propto \frac{bx}{a}$, & $CH \propto \frac{c^2}{a}$, & par conséquent GH, ou BD $\propto \frac{bx+c^2}{a}$; Et parce que l'on veut que la somme des deux lignes DB, DC, soit égale à la ligne donnée AE, on aura cette Equation $x + \frac{bx+c^2}{a} \propto a$, ou $x \propto \frac{a^2 - bx}{a - c}$, qui est un Lieu à la ligne droite, lequel étant résolu par Probl.I. donne la construction suivante.

Constru-
ction.

Ayant fait EI $\propto$ AF, tirez du point I, à la ligne AC, la perpendiculaire IK $\propto$ EF. Tirez du point A, à la même ligne AC, la perpendiculaire AM, troisième proportionnelle aux deux lignes AI, AE, & menez par le point M, à la ligne AK, la parallèle MP, dont la partie OP, comprise entre les lignes de l'Angle donné BAC, sera le Lieu qu'on cherche: de sorte, que si l'on y prend un point à discretion, comme D, pour en tirer sur les lignes AB, AC, les perpendiculaires DB, DC, leur somme DB + DC, sera égale à la ligne donnée AE.

1.
Démon-
stration.

Car, dans les Triangles semblables AEF, CDH, on a AECH $\propto$ AFCD, & dans les semblables AEF, ACG, on a AECG $\propto$ ACEF: c'est pourquoy on aura AECG - AECH $\propto$ ACEF - AFCD; & à cause de CG - CH $\propto$ GH $\propto$ BD, on aura AEBD $\propto$ ACEF - AFCD.

Si

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 9

Si on prolonge la ligne DC, jusqu'à ce qu'elle coupe la ligne AK, prolongée en L, les deux Triangles AIK, ACL, seront semblables, & l'on aura $AICL \sim ACIK$, & à cause de $IK \sim EF$, par la construction, on aura $AICL \sim ACEF$; & ôtant AFCD, on aura $AICL - AFCD \sim ACEF - AFCD$; & si à la place de $ACEF - AFCD$, on met AEBD, qui luy est égal, par l'article precedent, on aura $AICL - AFCD \sim AEBD$; & si à la place de AI, on met AE - AF, qui luy est égal, par la construction, au lieu du Rectangle AICL, on aura AECL - AFCL; & au lieu de AICL - AFCD, on aura AECL - AFCL - AFCD, ou AECL - AFDL, ou AECL - AFAM, à cause de $CL \dagger CD \sim DL \sim AM$; & enfin au lieu de AICL - AFCD $\sim$ AEBD, on aura AECL - AFAM $\sim$ AEBD; & par l'antithese, on aura AECL - AEBD $\sim$ AFAM, & par conséquent cette Analogie, AE, AF::AM, CL - BD; & si au lieu de AM, on met son égale DL, ou $CD \dagger CL$, on aura cette derniere Analogie, AE, AF:: $CD \dagger CL$, CL - BD. 3.

Si dans la premiere Analogie, AE, AF::AM, CL - BD, on permute, on aura celle-cy, AE, AM::AF, CL - BD; & si aux deux premiers termes AE, AM, on donne la hauteur commune AE, on aura cette autre Analogie, AEq, AEAM::AF, CL - BD; & si à la place du Quarré AE, on met le Rectangle AIAM, qui luy est égal, à cause des trois proportionnelles AI, AE, AM, par la construction, on aura cette autre Analogie, AIAM, AEAM::AF, CL - BD; & si au lieu des deux premiers termes AIAM, AEAM, dont la hauteur commune est AM, on met les bases AI, AE, qui sont en même raison, par 1. 6. on aura cette autre Analogie, AI, AE::AF,

10 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

CL-BD; & si au lieu du premier terme AI, on met AE-
AF, qui luy est égal, par la construction, & qu'on per-
muse, on aura celle-cy, AE-AF, AF::AE, CL-BD;
& en composant, on aura celle-cy, AE, AF::AE+CL-
BD, CL-BD; & enfin, si à la place des deux premiers
termes AE, AF, on met les deux CD+CL, CL-BD,
qui sont en même raison, par la dernière Analogie de l'arti-
cle precedent, on aura cette dernière Analogie, CD+CL,
CL-BD::AE+CL-BD, CL-BD, & par consequent
AE+CL-BD ∝ CD+CL; & par l'antithese, on aura
AE ∝ BD+CD. Ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE.

IL s'ensuit, que quand le point D, conviendra avec le
point O, la seule perpendiculaire qui tombera du point O,
sur AC, sera égale à la ligne AE. C'est pourquoy, si au
lieu de AM ∝ $\frac{AE}{AC}$, on fait AN ∝ AE, & que par le point
N, on tire à la ligne AC, la parallele NO, on aura le
point O. Et pareillement, si l'on faisoit AQ, perpendi-
culaire à AB, & égale à AE, & que par le point Q,
on tirât à la ligne AB, la parallele QP, on auroit le point
P. Mais, pour avoir le point P, il suffira de faire AP
∝ AO. D'où il suit, que le Triangle AOP, sera tou-
jours isoscele, & que dans un Triangle isoscele, comme
AOP, les deux perpendiculaires DB, DC, tirées du
point D, pris à discretion sur sa base OP, sont ensemble
égales à une même ligne, telle qu'est ici la ligne donnée AE,
laquelle est égale à la perpendiculaire, qui tomberoit de l'un
des deux Angles O, P, sur son côté opposé.

SCOLIE.

SI au lieu de prendre la somme DB+DC, on veut
prendre la somme CH+DH, pour la rendre égale à la

DES LIEUX GÉOMETRIQUES. II

ligne donnée AE, on trouvera $x \propto \frac{aa}{b \mp c}$, qui est un Lieu à la ligne droite, parce que la quantité y, qui entre dans la Question, n'est point déterminée. Ce Lieu fait connoître que le point D, est dans une ligne droite indéfinie parallèle à la ligne AC, & éloignée de la mesme ligne AC, d'une quantité égale à la fraction trouvée $\frac{aa}{b \mp c}$. De sorte que la perpendiculaire CD, étant troisième proportionnelle aux deux lignes AF†EF, AE, la somme CH†DH, sera égale à la ligne donnée AE.

Car, puisque par la construction, nous avons cette Démonstration.
 Analogie AF†EF, AE::AE, CD, si à la place des deux premiers termes AF†EF, AE, on met les deux CH†DH, CD, qui sont en mesme raison, à cause des Triangles semblables AEF, CDH, on aura cette autre Analogie, CH†DH, CD::AE, CD, & par consequent CH†DH $\propto$ AE. Ce qu'il falloit démontrer.

QUESTION II.

Trouver deux Nombres, tels que la raison de leur différence à celles de leurs Quarrez, soit donnée.

Lieu à la ligne droite.
2. 2.
Dioph.

COMME nôtre intention est de résoudre cette Question aussi bien en Lignes qu'en Nombres, & qu'en Geometrie elle est mal proposée, nous la proposerons plus généralement, en cette sorte: Trouver deux lignes, telles que le Plan sous leur différence & une ligne donnée, soit à la différence de leurs Quarrez, en raison donnée.

On propose de trouver deux lignes AD $\propto$ x, & DE $\propto$ y, telles que le Plan lx-ly, sous la ligne donnée AO $\propto$ l, & leur différence x-y, soit à la différence xx-yy, 1. Fig.
B ij

12 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

de leurs Quarrez, comme $AP \propto r$, à $AQ \propto l$.

Selon la condition de la Question, on aura cette Analogie, $lx-ly, xx-yy::r, f$, ou $l, x+y::r, f$, & par conséquent cette Equation, $lf \propto rx+ry$, ou $y \propto \frac{lf}{r} - x$, qui est un Lieu à la ligne droite, lequel étant résolu par Probl. I. donne la construction suivante.

Constru-
ction.

Ayant fait à volonté l'Angle BAC , par les deux lignes AB, AC , dont chacune soit $\frac{l}{r}$, ou quatrième proportionnelle aux trois AP, AQ, AO , menez la droite BC , qui sera le Lieu qu'on cherche : de sorte, que si on y prend entre B, C , un point à discrétion, comme E , pour en tirer à la ligne AC , la parallèle DE , les deux lignes AD, DE , seront celles qu'on cherche ; c'est-à-dire, que le Plan sous la ligne donnée AO , & leur différence $AD-DE$, savoir $AOAD-AODE$, sera à la différence $ADq-DEq$, de leurs Quarrez, comme AP , à AQ .

Demon-
stration.

Car, puisque nous avons $DB \propto DE$, à cause de $AB \propto AC$, par la construction, & des deux Triangles semblables BDC, BAC , nous aurons $AB \propto AD+DE$, à cause de $AB \propto AD+DB$, & on pourra faire cette Analogie, $AO, AD+DE::AO, AB$; & si à la place des deux derniers termes AO, AB , on met les deux AP, AQ , qui sont en même raison, par la construction, on aura celle-cy, $AO, AD+DE::AP, AQ$; & si on donne aux deux premiers termes $AO, AD+DE$, la hauteur commune $AD-DE$, on aura cette dernière Analogie, $AOAD-AODE, ADq-DEq::AP, AQ$. Ce qu'il falloit démontrer.

Quand on voudra résoudre cette Question en Nombres; il sera plus élégant de mettre $\frac{a+b}{x}$, pour les deux Nombres qu'on cherche, & selon la condition de la Question, on

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 13

aura cette Analogie, $\frac{a}{x} : \frac{b}{x} :: r, s$, ou $x, a + b :: r, s$,
 & par consequent cette Equation, $s x \propto a + b r$, dans
 laquelle on trouvera $x \propto \frac{a + b r}{s}$, & les deux nombres qu'on
 cherche, seront tels,

$$\frac{a r, h c}{a r + b r^2}$$

Si $r \propto 1$, & $s \propto 6$, & qu'on suppose $a \propto 1$, & $b \propto 2$;
 les deux Nombres seront 2, 4; & si on suppose $a \propto 5$, &
 $b \propto 1$, les deux Nombres seront 5, 1.

On tire de cette solution, le Canon suivant: Sion mul-
 tiplie deux Nombres quelconques, chacun par le se-
 cond terme de la raison donnée, & qu'on divise cha-
 que produit par le Plan sous le premier terme & la
 somme des deux mêmes Nombres, on aura les deux
 Nombres qu'on cherche.

Comme cette Question est indeterminée, on en peut don-
 ner autant de solutions indéfinies que l'on voudra, & en
 tirer autant de Canons differens: mais ce n'est pas icy le
 lieu d'en parler davantage.

QUESTION III.

Trouver deux Nombres, tels que la raison de
 leur somme à celle de leurs Quarrez,
 soit donnée,

Lien au
 Cercle.
 1. 2.
 Dioph.

POUR résoudre cette Question par Geometrie, nous la
 proposerons plus generalement en cette sorte: Trouver
 deux lignes, telles que le Plan sous leur somme &
 une ligne donnée, soit à la somme de leurs Quarrez,
 en raison donnée.

On propose de trouver deux lignes $HC \propto x$, & $HE \propto y$, 3. Fig.
 B iij

14 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

3. Fig.

selles que le Plan $lx \dagger ly$, sous la ligne donnée $AO \propto l$, & leur somme $x \dagger y$, soit à la somme $xx \dagger yy$ de leurs Quarrez, comme $AP \propto r$, à $AQ \propto f$.

Selon la condition de la Question, on aura cette Analogie, $lx \dagger ly, xx \dagger yy :: r, f$, & par consequent cette Equation $lfx \dagger lfy \propto rxx \dagger ryy$, ou $xx - \frac{lf}{l} \propto \frac{rf}{l} - yy$, qui est un Lieu à un Cercle donné, dont le rayon est $\sqrt{\frac{rff}{4l}}$, comme l'on connoît en ôtant les seconds termes, & savoir en supposant $x \propto a \dagger \frac{lf}{2l}$, & $y \propto z \dagger \frac{lf}{2l}$, pour avoir ces autre Lieu au Cercle, $zz \propto \frac{rff}{4l} - \omega\omega$, lequel étant résolu par les preceptes du Probl. II. donne la construction suivante.

Constru-
ction.

Ayant fait le Triangle isoscele rectangle ABC , dont chacun des côtés AB, BC , soit $\frac{lf}{2}$, ou quatrième proportionnel aux trois lignes $2 AP, AO, AQ$, décrivez du centre A , par le point C , une circonférence de Cercle, qui sera le Lieu qu'on cherche: & pour y déterminer en lignes les deux nombres qu'on cherche, tirez le Diametre FG , parallele au côté BC , & prenez sur ce Diametre FG , un point quelconque D , par où vous tirez au mesme Diametre FG , la perpendiculaire EH , qui sera terminée d'un côté en E , par la circonférence du Cercle, & de l'autre côté en H , par la ligne BC , prolongée quand il en sera besoin; & les lignes EH, CH , représenteront les deux nombres qu'on cherche, en prenant la lettre l , ou la ligne AO , pour l'unité: de sorte que le Plan $AOEH \dagger AOCH$, sous leur somme $EH \dagger CH$, & la ligne donnée AO , sera à la somme $EH \dagger CH$, de leurs Quarrez, comme AP , à AQ .

Demon-
stration.

Pour la demonstration, prolongez les lignes EH, CH , jusqu'à la circonférence du Cercle en I , & en L , & tirez par le point C , à la ligne HI , la parallele CN , & par le point N , où elle coupe la circonférence du Cercle, &

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 15

par le Centre A, à la ligne LC, les paralleles MN, FG.
 Cette preparation étant faite, on considerera que la ligne HI, est égale à EH-CL. Car si des deux lignes égales DE, DI, on oste les deux égales TC, TN, ou DH, DM, il restera HI ∽ EM; & à cause de EM ∽ EH-HM, on aura HI ∽ EH-HM; & à cause de HM ∽ 2 DH, on aura HI ∽ EH-2 DH; & encore à cause de DH ∽ AB, & de AB ∽ BC, on aura HI ∽ EH-2 BC; & enfin à cause de 2 BC ∽ CL, on aura HI ∽ EH-CL. Ce qu'il falloit demontrer.

Cela étant suppose, puisqu'on a HI ∽ EH-CL, on pourra faire cette Analogie, LH, HI::LH, EH-CL; & si à la place des deux premiers termes LH, HI, on met les deux EH, CH, qui sont en mesme raison, par la nature du Cercle, on aura cette autre Analogie, EH, CH::LH, EH-CL, & par consequent cette Equation, EHq-CL EH ∽ CHLH, ou EHq-CL EH ∽ CLCH-CHq, à cause de LH ∽ CL-CH, & par l'antithese on aura celle-cy, CL EH†CLCH ∽ EHq†CHq, ou 2ABEH†2ABCH ∽ EHq†CHq, à cause de CL ∽ 2 AB; & donnant à chaque Plan la hauteur commune AP, on aura 2ABAPEH†2ABAPCH ∽ APEHq†APCHq; & si à la place de 2ABAP, on met AOAQ, qui luy est égal, à cause des quatre proportionnelles 2 AP, AO, AQ, AB, par la construction, on aura cette dernière Equation, AOAQEH†AOAQCH ∽ APEHq†APCHq, & par consequent cette Analogie, AOE H†AOCH, EHq†CHq::AP, AQ. Ce qu'il falloit demontrer.

Pour resoudre cette Question en nombres, on pourra se servir de l'Equation precedente, lx†lsy ∽ rxx†ryy,

16 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

dans laquelle on trouvera $y \propto \frac{1}{12} + \sqrt{\frac{1}{444} + \frac{11}{12}} \times x - 2$ & pour avoir une solution rationnelle, il faudra éгалer au Quarré cette Puissance, $\frac{11}{444} + \frac{1}{12} \times x$, pour le côté duquel prenant $\frac{a}{b} - \frac{1}{12}$, pour avoir une solution indéfinie aussi générale qu'il est possible, on trouvera $x \propto \frac{fab + fbb}{caa + rbb}$, & par conséquent $y \propto \frac{fab + faa}{caa + rbb}$. Ainsi les deux Nombres qu'on cherche, seront tels,

$$\frac{fbb + fab, faa + fab}{caa + rbb}.$$

Si $r \propto 1$, & $f \propto 10$, & qu'on suppose $a \propto 1$, & $b \propto 2$, les deux Nombres qu'on cherche, seront 12, 6. mais si l'on suppose $a \propto 3$, & $b \propto 1$, les deux Nombres seront 4, 12.

Nous avons résolu cette Question dans nôtre Diophante en plusieurs manieres différentes, mais ce n'est pas icy le lieu d'en parler davantage. Je diray seulement que de cette solution indéfinie on tire le Canon suivant.

Si on multiplie le Plan sous la somme de deux Nombres quelconques & le second terme de la raison donnée, par chacun de ces deux mêmes Nombres, & qu'on divise chaque solide par le solide sous le premier terme & la somme des Quarrez des deux mêmes Nombres, on aura les deux Nombres qu'on cherche.

QUESTION IV.

Lien à la Parabole. Trouver un Triangle rectangle, dont l'hypotenuse soit moyenne proportionnelle entre un côté & ce même côté augmenté d'une ligne donnée.

4. Fig. **O**N propose de trouver le Triangle rectangle ABE, dont l'hypotenuse AB, soit moyenne proportionnelle entre

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 17

entre le côté AE, & le même côté AE, augmenté de la Ligne donnée AD. 4 Fig.

Si l'on suppose $AD \propto a$.

$BE \propto x$.

$AE \propto y$.

on aura $AB^2 \propto xx + yy$, & $DE \propto a + y$, & parce que l'on veut que l'Hypoténuse AB soit moyenne proportionnelle entre AE, DE, le *Quarré* AB, ou $xx + yy$ sera égal au *Rectangle* DEA, ou $ay + yy$. Ainsi on aura cette Equation $xx + yy \propto ay + yy$, ou $xx \propto ay$, qui est un Lieu à une Parabole donnée, dont le Parametre est a, ou AD, comme l'on connoît par Probl. IV. d'où nous avons tiré cette construction.

Ayant prolongé la Ligne donnée AB, indéfiniment vers E, décrivez par son extrémité A, sur l'axe AE, la Parabole BAF, dont le Parametre soit égal à la Ligne donnée AD, & cette Parabole ainsi décrite sera le Lieu qu'on cherche : de sorte que si l'on prend sur sa circonférence un point à volonté, comme B, pour en tirer sur l'axe AE, la perpendiculaire BE, le Triangle ABE, sera tel que son Hypoténuse AE sera moyenne proportionnelle entre AE, DE. Construction.

Car à cause de $AB^2 \propto BE^2 + AE^2$, par 47. 1. & de $BE^2 \propto DAE$, par la propriété de la Parabole, on aura $AB^2 \propto DAE + AE^2$, & à cause de $DAE + AE^2 \propto DEA$, par 3. 2. on aura $AB^2 \propto DEA$, & par conséquent cette analogie, $DE, AB :: AB, AE$. Ce qu'il falloit démontrer. Démonstration.

QUESTION V.

Lieu à
l'Hyperbo-
le.
3. 1. D. oph

Trouver deux Nombres , dont la difference soit à leur produit en raison donnée.

Pour résoudre cette Question par Geometrie , nous la proposerons plus generalement en cette sorte : Trouver deux Lignes , telles que le Plan sous leur difference & une Ligne donnée , soit à leur Rectangle en raison donnée.

1. Fig.

On propose de trouver deux Lignes $LI \propto x$, $LE \propto y$, telles que le Plan $APLI - APLE$, sous leur difference $LI - LE$, & la Ligne donnée $AP \propto l$, soit à leur Rectangle ELI , comme $AO \propto r$, à $AQ \propto f$.

Selon la condition de la Question , on aura cette analogie , $lx - ly$, $xy :: r$, f , & par consequent cette Equation $lfx - lly \propto rxy$, qui est un Lieu à l'Hyperbole entre ses asymptotes , où le Rectangle commun est $\frac{1}{11}$, comme l'on connoît par Probl. V. D'où nous avons tiré cette construction.

Construc.
1. oph.

Ayant fait un angle quelconque BAC , & ayant pris sur l'une des deux Lignes AB , AC , comme sur AC , la Ligne $AD \propto \frac{rf}{l}$, ou quatrième proportionnelle aux trois Lignes AO , AQ , AP , tirez par le point D , à l'autre Ligne AB , la Parallele $DE \propto AD$, & décrivez du centre A , par le point E , entre les asymptotes AB , AC , l'Hyperbole FEG , qui sera le Lieu qu'on cherche : de sorte que si l'on prend sur l'asymptote AC , depuis D vers C , un point à volonté comme K , & que par le point K , on tire à l'autre asymptote AB , la parallele KI , & par le point I , à l'asymptote AC , la

parallele HI, les deux Lignes LE, LI, représenteront les deux Nombres qu'on cherche, c'est à-dire que le Rectangle APLI-APLE, sera au Rectangle ELI, comme AO, à AQ. 1. Fig.

Car puisque par la Nature de l'Hyperbole, on a cette analogie, AK, AD :: DE, KI, ou AK, AD :: AD, KI, à cause de DE ∼ AD, par la construction, en divisant on aura celle cy, DK, AD :: AD-KI, KI, ou LI, AD :: LE, KI, & en permutant on aura celle cy, LI, LE :: AD, KI, & en divisant on aura celle cy, LI, LI-LE :: AD, AD-KI, ou LI, LI-LE :: AD, LE, & par conséquent ADLI-ADLE ∼ ELI. C'est pourquoy on pourra faire cette analogie, ADLI-ADLE, ADq :: ELI, ADq, & si à la place des deux premiers termes ADLI-ADLE, ADq, dont la hauteur commune est AD, on met leurs bases LI-LE, AD, qui sont en même raison, par 1. 6. on aura cette autre analogie, LI-LE, AD :: ELI, ADq, & donnant aux deux premiers termes LI-LE, AD, la hauteur commune AP, on aura celle cy ; APLI-APLE, APAD :: ELI, ADq, & en permutant on aura celle cy, APLI-APLE, ELI :: APAD, ADq, & à cause de la hauteur AD, qui est commune aux deux derniers termes APAD, ADq, on aura celle cy, APLI-APLE, ELI :: AP, AD, & si au lieu des deux derniers termes AP, AD, on met les deux AO, AQ, qui sont en même raison, par la construction, on aura cette dernière analogie, APLI-APLE, ELI :: AO, AQ. Ce qu'il falloit démontrer. Demons- tration.

Nous avons donné dans nôtre Diophante plusieurs solutions de cette Question en nombres, entre lesquelles

20 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

1. Fig. la solution suivante est la plus simple & la plus générale de toutes.

$\frac{abf}{af + bf} \text{ } \frac{abf}{af + bf}$

Si $r \propto 1$, & $s \propto 6$, & que l'on suppose $a \propto 1$, & $b \propto 2$, les deux Nombres qu'on cherche, seront 6, 3. & si l'on suppose $a \propto 1$, & $b \propto 3$, les deux Nombres seront 12, 4. Ainsi des autres, pourvu que b soit moindre que $\frac{af}{f}$.

QUESTION VI.

Lieu à l'El.
lipse.

Décrire sur une base donnée un Triangle, tel que la somme des Quarrez de ses deux côtez soit égale à la somme des Quarrez de la base donnée & de sa perpendiculaire, qui tombe de l'angle opposé.

1. Fig.

ON propose de décrire sur la base donnée AB , le Triangle ABC , en sorte que la somme des Quarrez des deux côtez AC , BC , soit égale à la somme du Quarré de la base donnée AB , & du Quarré de sa perpendiculaire CD .

Si l'on suppose... $AB \propto a$.

$CD \propto x$.

$AD \propto y$.

On aura $BD \propto a - y$.

$AC^2 \propto xx + yy$.

$BC^2 \propto xx + yy - 2ay + aa$.

& parce que l'on veut que la somme des Quarrez CA , CB , soit égale à celle des Quarrez AB , CD , on aura cette Equation, $2xx + 2yy - 2ay + aa \propto xx + aa$, ou $yy - ay \propto -\frac{1}{2}xx$, qui est un Lieu à une Ellipse donnée, dont un Diametre est a , & son Parametre est

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 22

2a, c'est pourquoy le second Diametre sera R 2aa, comme l'on connoit par Probl. III. d'où nous avons tiré cette construction. 4. P. 8.

Tirez par le point E, milieu de la base donnée AB, à la même Ligne AB, la perpendiculaire FG, dont la longueur se terminera en cette sorte. Ayant pris sur la perpendiculaire FG, les deux Lignes EH, EI, égales chacune à AE, ou à BE, menez la droite AI, & faites les Lignes EF, EG, égales chacune à cette droite AI, pour décrire des deux Foyers H, I, à l'entour des deux axes AB, FG, une Ellipse, qui sera le Lieu qu'on cherche: de sorte que si on prend sur sa circonference un point à volonté, comme C, pour le sommet du Triangle ABC, ce Triangle ABC, satisfera à la Question, c'est à dire que si du point C, on tire sur la base AB, la perpendiculaire CD, la somme ACq + BCq sera égale à la somme ABq + CDq. Construc-
tion.

Car puisque le Parametre de l'Ellipse est double de son Diametre AB, par la construction on aura 2ADB ∼ CDq, par la Nature de l'Ellipse, & ajoutant ADq, & BDq, on aura ces deux Equations, 2ADB + ADq ∼ ACq, & 2ADB + BDq ∼ BCq, dont la somme donnera cette troisième Equation, 2ADB + ADq + 2ADB + BDq ∼ ACq + BCq, & à cause de 2ADB ∼ CDq, comme il a esté démontré, & de ADq + 2ADB + BDq ∼ ABq, par 4. 2. on aura CDq + ABq ∼ ACq + BCq. Ce qu'il falloit démontrer. Demons-
tration.



PROBLEME I.

Construire un Lieu à la Ligne droite.

Les Equations qui donnent des Lieux *simples*, ou des Lieux à la *Ligne droite*, se peuvent toutes reduire à l'une des quatre formules suivantes ;

$$y \sim \frac{ax}{b}.$$

$$y \sim \frac{ax}{b} + c.$$

$$y \sim \frac{ax}{b} - c.$$

$$y \sim c - \frac{ax}{b}.$$

Pour construire le Lieu de la premiere Equation,
Premiere Equation. $y \sim \frac{ax}{b}$, supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indéterminée $AB \sim x$, & que l'angle des deux Lignes inconnues, x, y , soit égal au donné CAD. Supposons encore que de l'extrémité B, de la Ligne indéterminée $AB \sim x$, il parte la Ligne indéfinie $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE soit égal au donné CAD. Cette Ligne $BE \sim y$ sera terminée en E, de quelque grandeur que soit la Ligne $AB \sim x$, par la Ligne Locale AG, qu'on tirera en cette sorte.

7. Fig.

A cause de la fraction $\frac{ax}{b} \sim y$, on a cette analogie, $b, a :: x, y$, qui fait connoître que les quatre Lignes b, a, x, y , sont les côtez homologues de deux Triangles semblables, & que par conséquent l'angle des deux premières b, a , est égal à celui des deux dernières x, y ; Si donc on prend sur la Ligne indéfinie $AB \sim x$, la Ligne $AF \sim b$, & que par le point F , on tire à la Ligne AD , la parallèle $FG \sim a$, la droite AG sera le Lieu de la première Equation $y \sim \frac{ax}{b}$.

Construc.
tion.
7. Fig.

Car si sur cette Ligne AG , on prend tel point que l'on voudra, entre A , & G , ou au-delà de G , comme E , & que par ce point E on tire à la Ligne AD , la parallèle EB , en supposant $AB \sim x$, & $EB \sim y$, on aura dans les deux Triangles semblables, ABE , AFG , cette analogie, $AB, BE :: AF, FG$, ou $x, y :: b, a$, & par conséquent cette Equation, $ax \sim by$, ou $y \sim \frac{bx}{a}$, qui est la même que la proposée.

Demonstration.

Pour construire le Lieu de la deuxième Equation, $y \sim \frac{ax}{b} + c$, supposons que du point fixe A , il parte la Ligne indéterminée $AB \sim x$, & que l'angle des deux Lignes inconnues x, y , soit égal au donné CAD . Supposons encore que de l'extrémité B de la Ligne indéterminée $AB \sim x$, il parte la Ligne indéterminée $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE soit égal au donné CAD . Cette Ligne $BE \sim y$, sera terminée en E par la Ligne Locale HK , que l'on tirera en cette sorte.

Deuxième
Equation.
8. Fig.

Si l'on suppose la fraction $\frac{ax}{b} \sim z$, on aura cette analogie, $b, a :: x, z$, qui fait connoître que les quatre Lignes b, a, x, z , sont les côtez homologues de deux Triangles semblables, & que par con-

Construc.
tion.

8. Fig.

sequent l'angle des deux premières b, a , est égal à celui des deux dernières x, z . Si donc on prend sur la Ligne indéfinie $AB \sim x$, la Ligne $AF \sim b$, & que par le point F , on tire à la Ligne AD , la parallèle $FG \sim a$, en joignant la droite AG , on aura sur la Ligne BE , la Ligne $BI \sim z \sim \frac{ax}{b}$, à laquelle on doit ajouter la Ligne $IE \sim c$, parce que dans l'Equation il y a $\frac{a^2}{b} + c$, mais comme le point B n'est pas déterminé, recourons au point fixe A , & prenons sur la Ligne AD , la Ligne $AH \sim c$, & tirons par le point H , à la Ligne AG , la parallèle HK , qui sera le Lieu qu'on cherche, & la démonstration s'en fera comme auparavant.

Troisième
Equation.

9. Fig.

Pour construire le Lieu de la troisième Equation, $y \sim \frac{ax}{b} - c$, on fera une construction semblable à la précédente, excepté qu'il faut ôter de la Ligne $BI \sim \frac{ax}{b}$, la Ligne $IE \sim c$, à cause de $\frac{ax}{b} - c$, c'est-à-dire qu'il faut prendre sur la Ligne AD prolongée en bas, la Ligne $AH \sim c$, & la Ligne LK sera le Lieu qu'on cherche, & la démonstration s'en fera de la même façon.

Quatrième
Equation.

10. Fig.

Pour construire le Lieu de la quatrième Equation, $y \sim c - \frac{ax}{b}$, on fera une construction semblable à la précédente, excepté qu'il faut ôter de la Ligne $IE \sim c$, la Ligne $BI \sim \frac{ax}{b}$, à cause de $c - \frac{ax}{b}$, c'est-à-dire qu'il faut tirer en bas au dessous de la Ligne $AB \sim x$, la Ligne $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE des deux Lignes indéterminées soit égal au complément à 180 degrés de l'angle donné CAD , & la Ligne HL sera le Lieu qu'on cherche, & la démonstration s'en fera de la même façon.

PROBLEME II.

PROBLEME II.

Construire un Lieu au Cercle.

Comme les Equations qui donnent des Lieux au Cercle , peuvent arriver en plusieurs manières différentes , & qu'il seroit trop long de les rapporter icy toutes , nous donnerons seulement icy quelques exemples , qui pourront servir à proportion pour la solution des autres , en commençant par les plus simples.

Proposons donc premièrement ce Lieu au Cercle , Premier
Exemple.
 $yy \sim aa - xx$. Puisque $aa - xx$ est la difference de deux
 Quarrez , elle est produite par la somme $a + x$, & par
 la difference $a - x$ de leurs côtez : & puisque le Rec-
 tangle sous $a + x$ & $a - x$, sçavoir $aa - xx$, est égal au
 Carré yy , on doit considérer la quantité inconnüe y ,
 comme une ordonnée au Diamètre d'un Cercle , dont
 le rayon ou demy Diametre est a : & puisque $a + x$,
 $a - x$, sont des Lignes , la quantité inconnüe x , doit
 être en ligne droite avec la connue a , & elle doit re-
 présenter la partie du Diametre comprise entre le cen-
 tre & l'ordonnée.

C'est pourquoy supposons que du point fixe A , il Construc-
tion.
11. Fig.
 parte la Ligne indeterminée $AB \sim x$, & que de son
 extremité B , il parte la Ligne indefinie $BE \sim y$, en
 sorte que l'angle ABE soit droit , car s'il n'étoit pas
 droit , au lieu d'un Cercle on auroit une *Ellipse*. Parce
 que la Ligne $AB \sim x$, n'est pas si grande que le rayon
 $AC \sim a$, à cause de $a - x$, prenez sur cette même Li-
 gne $AB \sim x$, prolongée , d'un côté la Ligne $AC \sim a$,
 & de l'autre côté la Ligne $AD \sim a$, pour avoir $BC \sim$

D

11. Fig.

$a - x$, & $DB \sim a + x$, & parce que le Rectangle DBC, ou $aa - xx$, est égal au Quarré yy , on connoît que la quantité inconnüe y , est moyenne proportionnelle entre DB, BC, ou entre $a + x$, $a - x$. Ainsi la perpendiculaire BE, doit être prise pour l'indeterminée y , & elle sera terminée en E, par la circonference d'un Cercle décrit du centre A, par les extremitéz C, D, du Diametre CD. Ainsi cette circonference fera le Lieu de l'Equation proposée, $yy \sim aa - xx$.

Démonstration.

Car si l'on prend sur cette circonference un point tel que l'on voudra, comme E, & que l'on en tire sur le Diametre BC, la perpendiculaire EB, comme nous avons supposé AD, ou $AC \sim a$, si l'on suppose $AB \sim x$, & $BE \sim y$, on aura $DB \sim a + x$, & $BC \sim a - x$, & parce que le Rectangle DBC est égal au Quarré BE, par la propriété du Cercle, on aura cette Equation, $yy \sim aa - xx$, qui est la même que la proposée.

Second Exemple.

Proposons maintenant ce Lieu au Cercle, $yy \sim bx - xx$, ou $xx - bx \sim -yy$. Il en faut premièrement ôter le second terme, pour la rendre de même forme que la précédente, en supposant $x \sim z + \frac{1}{2}b$, & vous aurez cet autre Lieu au Cercle, $zz \sim \frac{1}{4}bb - yy$, duquel on tirera aisément une construction par un raisonnement semblable au précédent. C'est pourquoy il suffit de regarder la Figure, & icy les noms de chaque Ligne, qui serviront tant pour la construction que pour la démonstration.

12. Fig.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$AD \sim b.$$

$$AC \sim \frac{1}{2}b \sim CD.$$

$$BD \sim b - x.$$

$$BC \sim x \sim x - \frac{1}{2}b.$$

12. Fig.

Proposons encore ce Lieu au Cercle, $\bar{y}\bar{y} - b\bar{y} \sim c\bar{x} - x\bar{x}$. Il en faut premierement ôter les seconds termes, en supposant $y \sim x + \frac{1}{2}b$, & $x \sim a + \frac{1}{2}c$ pour avoir cet autre Lieu au Cercle, $xx \sim \frac{bb + cc}{4} - aa$, ou $xx \sim mm - aa$, en supposant $\frac{bb + cc}{4} \sim mm$, duquel on tirera aisément une construction à l'imitation de la precedente. C'est pourquoy il vous suffira de regarder la Figure, & icy 13. Fig. les noms de chaque Ligne.

Troisième Exemple.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$DF \sim \frac{1}{2}b.$$

$$AD \sim \frac{1}{2}c.$$

$$AC \sim c.$$

$$AF \sim m \sim \frac{1}{2}R. bb + cc.$$

$$BC \sim c - x.$$

$$EI \sim y - \frac{1}{2}b \sim x.$$

$$FI \sim x - \frac{1}{2}c \sim a.$$

$$BC \sim y - b.$$

PROBLEME III.

Construire un Lieu à l'Ellipse.

Comme les Equations qui donnent des Lieux à l'Ellipse, peuvent arriver en plusieurs manières différentes, & qu'il seroit trop long de les expliquer icy toutes, nous donnerons seulement quelques exemples des cas les plus difficiles, en commençant par les plus faciles, pour pouvoir à leur imitation résoudre les autres.

Dij

Premier
Exemple.

Proposons donc premierement ce Lieu à l'Ellipse ;
 $xx \sim aa - \frac{b^2yy}{c^2}$. Pour construire cette Ellipse , vous con-
 sidererez que la nature d'une Ellipse étant telle , que
 le Diametre est à son Parametre , comme le Rectan-
 gle sous les parties du même Diametre est au Quarré
 de l'ordonnée correspondante , & que reduisant l'E-
 quation proposée , $xx \sim aa - \frac{b^2yy}{c^2}$, en proportion on a
 cette analogie , $b , c :: aa - xx , yy$, on doit conside-
 rer les quantitez b , c , comme deux termes homo-
 logues au Diametre & à son Parametre , & alors le
 Rectangle $aa - xx$, dont les côtez sont $a \mp x , a - x$,
 sera le Rectangle des deux parties du Diametre , les-
 quelles par consequent seront $a \mp x , a - x$, & le côté
 y du Quarré yy sera l'ordonnée correspondante à ces
 deux parties. C'est pourquoy il faut comme dans le
 Cercle, que le demy Diametre soit a , & que sa partie
 comprise entre le centre & l'ordonnée soit x .

Construc-
tion.
34. Fig.

Supposons donc que du point fixe A il parte la Li-
 gne indéterminée $AB \sim x$, & parce que cette Ligne
 n'est pas si grande que le demy Diametre a , à cau-
 se du côté precedent $a - x$, prenez sur cette même Li-
 gne $AB \sim x$, prolongée de côté & d'autre les Lignes
 AC , AD , égales chacune à la quantité connue a ,
 pour avoir $BC \sim a - x$, & $DB \sim a \mp x$. Et parce que
 les deux quantitez inconnues x , y , doivent faire un
 angle donné , supposons que de l'extrémité B , de la
 Ligne indéfinie $AB \sim x$, il parte la Ligne indétermi-
 née , $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE soit égal au
 donné. Après cela décrivez du centre A , à l'entour
 du Diametre CD , une Ellipse , dont le Diametre
 CD soit à son Parametre CG , comme b à c , & dont

lés ordonnées au même Diametre CD, soient parallèles à la Ligne BE, & cette Ellipse ainsi décrite sera le Lieu de l'Equation proposée $xx \sim aa - \frac{b^2 y^2}{c^2}$. 14. Fig.

Car si l'on prend sur la circonference de cette Ellipse un point à volonté, comme E, & qu'on en tire au Diametre CD, l'ordonnée EB, comme nous avons fait AC $\sim a$, & AD $\sim a$, si l'on suppose AB $\sim x$, & BE $\sim y$, on aura BD $\sim a + x$, & BC $\sim a - x$, & parce que le Diametre CD est à son Parametre CG, comme b à c , par la construction, & que cette raison est égale à celle du Rectangle DBC, au Carré BE, c'est-à-dire à celle du Rectangle $aa - xx$, au Carré yy , par la nature de l'Ellipse, on aura cette analogie, $b, c :: aa - xx, yy$, & conséquemment cette Equation, $b^2 yy \sim aac - cxx$, ou $xx \sim aa - \frac{b^2 y^2}{c^2}$, qui est la même que la proposée. Démonstration,

Proposons ce Lieu à l'Ellipse $xx + dx \sim aa - \frac{b^2 y^2}{c^2}$. Il le faut premierement reduire à un de même forme que le precedent, en ôtant le second terme, sçavoir en supposant $x \sim z - \frac{1}{2} d$, pour avoir ce Lieu reduit, $zz \sim aa + \frac{1}{4} dd - \frac{b^2 y^2}{c^2}$, ou $zz \sim mm - \frac{b^2 y^2}{c^2}$, en supposant $aa + \frac{1}{4} dd \sim mm$. Si l'on fait dans ce Lieu reduit un raisonnement semblable au precedent, on connoîtra que le demy Diametre de l'Ellipse est m , ou R. $aa + \frac{1}{4} dd$, & que ce Diametre est à son Parametre comme b à c . D'où l'on tirera aisément une construction: c'est pourquoy je me contenteray de vous donner seulement la construction toute faite, & icy les noms de chaque Ligne, qui serviront tant pour la construction que pour la démonstration. 15. Fig.

15. Fig.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$AC \sim \frac{1}{2}d.$$

$$CF \sim m \sim R. aa + \frac{1}{2}dd \sim CG.$$

$$FG \sim 2m \sim R. 4aa + dd.$$

$$BC \sim z.$$

$$BF \sim m + z.$$

$$BG \sim m - z.$$

$$\text{Diam. Param.} :: b, c. \text{ Param.} \sim \frac{1}{b}cm.$$

Autre construction.

On peut trouver une autre construction, en reduisant la derniere Equation $zz \sim mm - \frac{b^2yy}{c^2}$, en celle-cy, $yy \sim \frac{cmm}{b} - \frac{c^2z}{b}$, qui nous fait connoître que le demy Diametre de l'Ellipse est $R \frac{cm}{b}$, ou $R. \frac{aa}{b} + \frac{dd}{b}$, & que le Diametre doit être à son Parametre, comme c à b , & de plus que la partie du Diametre comprise entre le centre & l'ordonnée doit être y . Ainsi en faisant un raisonnement semblable au precedent, on trouvera aisément une construction. C'est pourquoy pour ne pas dire plusieurs fois la même chose, je me contenteray de vous donner simplement la Figure, & icy les noms de chaque Ligne qui serviront, tant pour la construction, que pour la démonstration.

16. Fig.

$$AB \sim y.$$

$$BE \sim x.$$

$$AC \sim \frac{1}{2}d.$$

$$DE \sim z.$$

$$m \sim R. aa + \frac{1}{2}dd.$$

$$CF \sim R \frac{cmm}{b}.$$

$$DF \sim R \frac{cmm}{b} + y.$$

$$DG \sim R \frac{cmm}{b} - y.$$

DES LIEUX GEOMETRIQUES.

31

$$FG \propto R \frac{acmm}{b}.$$

$$\text{Diam. Param.} \propto c, b. \text{ Param.} \propto \frac{Rabmm}{c}.$$

16. Fig.

Proposons ce Lieu à l'Ellipse, $xx - dx \propto ay - \frac{byy}{c}$. Il le faut premierement reduire à un de même forme que le premier, en ôtant les seconds termes, sçavoir en supposant $x \propto z + \frac{1}{4}d$, pour avoir cette autre Equation, $zz - \frac{1}{4}dd \propto ay - \frac{byy}{c}$, ou $yy - \frac{acy}{b} \propto \frac{cdd}{4b} - \frac{czz}{b}$, d'où l'on ôtera encore le second terme, en supposant $y \propto w + \frac{ac}{4b}$, pour avoir ce Lieu reduit, $zz \propto \frac{acw}{4b} + \frac{1}{4}dd - \frac{bw}{c}$, ou $zz \propto mm - \frac{bw}{c}$, en supposant $\frac{ac}{4b} + \frac{1}{4}dd \propto mm$. Faisant dans ce Lieu reduit un raisonnement semblable au precedent, on connoîtra que le demy Diametre de l'Ellipse est m , ou $R. \frac{ac}{4b} + \frac{1}{4}dd$, & que le Diametre est à son Parametre, comme b à c .

Troisième
Exemple.

C'est pourquoy supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indeterminée AB $\propto x$, de laquelle il faut ôter la Ligne AC $\propto \frac{1}{4}d$, pour avoir BC $\propto z$, à cause de $x \propto z + \frac{1}{4}d$: & parce que les quantitez inconnues x, y , doivent faire un angle donné, supposons que de l'extremité B, de la Ligne indefinie AB $\propto x$, il parte la Ligne indeterminée BE $\propto y$, en sorte que l'angle ABE, soit égal au donné. Il faut ôter de cette Ligne BE $\propto y$, la Ligne BH $\propto \frac{ac}{4b}$, pour avoir EH $\propto w$, à cause de $y - \frac{ac}{4b} \propto w$: mais comme le point B, n'est pas déterminé, tirez du point fixe A, à la Ligne BE, la parallele AD $\propto \frac{ac}{4b}$, & par le point D, à la Ligne AB, la parallele DH, car ainsi en quelque Lieu que soit la Ligne BE, vous aurez toujours EH $\propto y - \frac{ac}{4b}$, ou EH $\propto w$, & DH $\propto x$. Ainsi les deux quantitez z, w , du Lieu reduit $zz \propto mm - \frac{bw}{c}$, seront représentées par les deux Lignes BC, EH, & comme

Construc-
tion.
17. Fig.

32 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

17. Fig. leurs extremités ne se joignent pas, car elles doivent toujours faire un angle donné, on tirera par le point C, à la Ligne BE, la parallele CO, & on prendra OH pour z , parce qu'elle est égale à BC. Et parce que par le Lieu réduit $zz \sim mm - \frac{aa}{c}$, on connoît que z , ou OH, est la partie du Diametre terminée par le centre & par l'ordonnée, il faut que le Diametre de l'Ellipse soit sur la Ligne DH, & que son centre soit au point O. Si donc on prend sur la Ligne DH, de côté & d'autre les Lignes OF, OG, égales chacune à m , on aura le Diametre FG, à l'entour duquel on décrira une Ellipse, dont le Diametre soit à son Parametre comme b , à c , & dont les ordonnées soient paralleles à la Ligne BE, & cette Ellipse ainsi décrite sera celle qu'on cherche, & la démonstration s'en fera comme auparavant.

Quatrième
Exemple.

Proposons ce Lieu à l'Ellipse, $yy - \frac{dxy}{c} \sim aa - \frac{bxx}{c}$. Il le faut premierement reduire à une autre de même forme que le premier, en ôtant le second terme, sçavoir en supposant $y \sim z \sqrt{\frac{dx}{a}}$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $zz \sim aa - \frac{bxx}{c} + \frac{d \cdot xx}{4a}$, ou $zz \sim aa - \frac{(bxx + cddx)}{4cd}$, ou $zz \sim aa - \frac{mxx}{n}$, en supposant $4bff + cdd \sim m$, & $4cff \sim n$.

Construc-
tion.

18. Fig.

Ce Lieu étant ainsi réduit, supposons que du point fixe A, il parte la Ligne infinie AB $\sim x$, & que de son extremité B il parte la Ligne indéterminée BE $\sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ôter de cette Ligne BE $\sim y$, la Ligne BH $\sim \frac{dx}{a}$, pour avoir EH $\sim z$, à cause de $y - \frac{dx}{a} \sim z$; Mais parce que le point B, n'est pas déterminé, prenez la Ligne AC $\sim zf$, sur la Ligne infinie AB $\sim x$, & menez par le point C, à la

à la Ligne BE, la parallele CD $\sim d$, car ainsi menant la droite AD, & la prolongeant jusqu'à ce qu'elle coupe la Ligne BE, en H, en quelque Lieu que soit cette Ligne BE, on aura toujours BH $\sim \frac{dx}{x}$, à cause des Triangles semblables ACD, ABH, & conséquemment EH $\sim x$. Et parce que dans le Triangle ACD, on connoît outre les côtez AC, CD, l'angle C, le troisième côté AD sera aussi connu, & si on le nomme r , on aura AH $\sim \frac{rx}{r}$; Ainsi les deux quantitez indeterminées x , x , du Lieu reduit $xx \sim aa - \frac{mxx}{n}$ seront représentées par les deux Lignes AB, EH, & parce que leurs extremités ne se joignent pas, on prendra AH pour AB; mais comme AH n'est pas égale à AB, si l'on change AB en AH, c'est-à-dire x en $\frac{rx}{r}$, on doit aussi changer le Lieu reduit $xx \sim aa - \frac{mxx}{n}$, ou $\frac{rx}{m} \sim \frac{aan}{m} - xx$, en un autre conforme à la valeur $\frac{rx}{r}$ de AH, sçavoir où au lieu du simple Quarré xx de la Ligne AB $\sim x$, il y ait le Quarré $\frac{rxx}{4n}$ de la Ligne AH $\sim \frac{rx}{r}$, en le multipliant par le Quarré $\frac{rr}{4n}$, car ainsi on aura cet autre Lieu reduit, $\frac{rrxx}{4nm} \sim \frac{aanrr}{4nm} - \frac{r^2xx}{4n}$, qui appartient à une Ellipse, dont le Diametre est à son Parametre, comme nrr à $4ffm$, car en reduisant ce Lieu en proportion, on a cette analogie, nrr , $4ffm :: \frac{aanrr}{4nm} - \frac{r^2xx}{4n}$, xx , qui fait connoître que R $\frac{rxx}{4n}$, ou $\frac{x}{r}$, ou AH est la partie du Diametre entre le centre & l'ordonnée; & comme l'ordonnée est EH, il faut que le Diametre de l'Ellipse soit sur la Ligne AH, & que le centre soit en A. Après quoy le reste sera facile à achever, en considerant les noms des Lignes que nous avons icy ajoûtez.

18. Fig.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$EH \sim z.$$

$$AC \sim 2f.$$

$$CD \sim d.$$

$$AD \sim r.$$

$$AH \sim \frac{rx}{z}.$$

$$BH \sim \frac{dx}{z}.$$

$$AF \sim R \frac{aanrr}{4dm}.$$

$$FH \sim R \frac{aanrr}{4dm} + \frac{rx}{z}.$$

$$GH \sim R \frac{aanrr}{4dm} - \frac{rx}{z}.$$

$$m \sim 4bff - cdd.$$

$$n \sim 4cff.$$

$$Diam. Param. :: mrr, 4ffm.$$

Cinquième
Exemple.

Proposons ce Lieu à l'Ellipse, $yy + \frac{dxy}{r} \sim ax - \frac{bx^2}{c}$. Il le faut premièrement réduire à un de même forme que le premier, en ôtant le second terme, sçavoir en supposant premièrement $y \sim z - \frac{dx}{z}$, pour avoir cet autre Lieu $zz \sim ax - \frac{bx^2}{c} + \frac{dax}{z}$, ou $zz \sim ax + \frac{cdaxz - 4bffxy}{4cz}$, ou $zz \sim ax - \frac{mxy}{n}$, en supposant $cdd - 4bff \sim m$, & $4cff \sim n$, comme auparavant, ou bien encore $xx - \frac{pux}{m} \sim -\frac{nxy}{m}$, & en supposant derechef $x \sim u + \frac{an}{au}$, pour avoir ce dernier Lieu réduit, $uu \sim \frac{a:mn}{4rm} - \frac{puz}{m}$.

Construc.
tion.
19. Fig.

Ce Lieu étant ainsi réduit, supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indéfinie $AB \sim x$, & que de son extrémité B, il parte la Ligne indéterminée $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ajouter à cette Ligne $BE \sim y$, la Ligne $BH \sim \frac{dx}{z}$, pour avoir $EH \sim z$, à cause de $y + \frac{dx}{z} \sim z$. Mais parce que le point B n'est pas déterminé, faites $AD \sim 2f$, & menez par le point D à la Ligne BE, la parallèle DO

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 35

19. Fig.

car ainsi menant la droite AO, & la prolongeant jusqu'à ce qu'elle coupe la Ligne BE aussi prolongée en H, en quelque Lieu que soit cette Ligne BE, on aura toujours $BH \propto \frac{1x}{11}$, à cause des Triangles semblables ADO, ABH. Nous avons donc $EH \propto x$, qui est une des quantitez inconnues du Lieu réduit $\omega\omega \propto \frac{220n}{4mm} - \frac{nnx}{m}$; & pour trouver l'autre, qui est ω , parce que nous avons supposé $x \propto \frac{2n}{m} \propto \omega$, il faut ôter de $AB \propto x$, la Ligne $AC \propto \frac{2n}{1m}$, pour avoir $CB \propto \omega$, & si l'on tire par le point C, à la Ligne BE, la parallèle CI, & que l'on nomme r la Ligne AO, on aura $IH \propto \frac{r\omega}{11}$, à cause des quatre Lignes proportionnelles, AD, AO, CB, IH. Ainsi les deux quantitez indéterminées x, ω , du Lieu réduit $\omega\omega \propto \frac{220n}{4mm} - \frac{nnx}{m}$, seront représentées par les deux Lignes EH, BC: & comme leurs extremités ne se joignent pas, on prendra IH pour BC. Mais comme IH n'est pas égale à BC, si l'on change $BC \propto \omega$, en $IH \propto \frac{r\omega}{11}$, il faut aussi changer le Lieu réduit $\omega\omega \propto \frac{220n}{4mm} - \frac{nnx}{m}$, en celui-cy, $\frac{rr\omega\omega}{11} \propto \frac{220nr}{168mm} - \frac{nnrrx}{4mm}$ qui appartient à une Ellipse, dont le demy Diametre est $\frac{211r}{41m}$, & dont le Diametre est à son Parametre comme nrr à $4ffm$, car en reduisant le dernier Lieu réduit $\frac{rr\omega\omega}{11} \propto \frac{220nr}{168mm} - \frac{nnrrx}{4mm}$, en proportion, on a cette analogie, $nrr, 4ffm :: \frac{220nr}{168mm} - \frac{1.1\omega\omega}{411}$, x, x , qui fait connoître que $\frac{r\omega}{11}$, ou IH est la partie du Diametre entre le centre & l'ordonnée, & comme l'ordonnée est EH, il faut que le Diametre de l'Ellipse soit sur la Ligne IH, & que le centre soit en I, &c.

Proposons encore ce Lieu à l'Ellipse, $yy + gy - \frac{dxy}{1} \propto aa - \frac{bxx}{1}$. Il le faut premierement reduire en un de même forme que le premier, en ôtant les seconds termes,

Sixième Exemple.

Eij

ſçavoir en ſuppoſant premièrement $y \sim z - \frac{1}{2}g \mp \frac{dx}{2f}$, pour avoir cet autre Lieu, $zz \sim \frac{1}{4}gg - \frac{dgg}{4f} \mp \frac{zdx}{4f} \mp \frac{aa}{4} - \frac{bx}{2}$, ou $zz \sim \frac{1}{4}gg - \frac{aa}{4} \sim \frac{cdxx - \frac{1}{2}bx}{4fm} - \frac{dgg}{4f}$, ou $zz - pp \sim -\frac{mxx}{a} - \frac{dgg}{4f}$, en ſuppoſant $add - 4bff \sim m$, $4c^2ff \sim n$, & $\frac{1}{4}gg \mp \frac{aa}{4} \sim pp$, ou bien encore $xx \mp \frac{dgg}{4fm} \sim \frac{npp}{m} - \frac{mxx}{m}$, & en ſuppoſant derechef $x \sim \omega - \frac{dgg}{4fm}$, pour avoir ce Lieu ſans ſecond terme, $\omega\omega \sim \frac{d^2npp}{16fm} \mp \frac{npp}{m} - \frac{mxx}{m}$, ou $\omega\omega \sim qq - \frac{mxx}{m}$, en ſuppoſant $\frac{1}{16fm} \mp \frac{npp}{m} \sim qq$.

Conſtruc-
tion.
10. Fig.

Ce Lieu étant ainſi réduit, ſuppoſons que du point fixe A, il parte la Ligne indéfinie $AB \sim x$, & que de ſon extrémité B, il parte la Ligne indéterminée $BE \sim y$, en ſorte que l'angle ABE ſoit donné. Il faut ajouter à la Ligne $AB \sim x$, la Ligne $AG \sim \frac{dgn}{4fm}$, pour avoir $CB \sim \omega$, à cauſe de $x \sim \omega - \frac{dgn}{4fm}$. Il faut auſſi ajouter à la Ligne $BE \sim y$, la Ligne $BN \sim \frac{1}{2}g$, pour avoir $EN \sim y \mp \frac{1}{2}g$, & en ôter la Ligne $NH \sim \frac{dx}{2f}$, pour avoir $EH \sim z$, à cauſe de $y \sim z - \frac{1}{2}g \mp \frac{dx}{2f}$. Mais parce que le point B n'eſt pas déterminé, tirez par le point C à la Ligne BE, la parallèle $CD \sim \frac{1}{2}g$, & par le point D, à la Ligne AB, la parallèle $DN \sim \omega$, pour avoir $EN \sim y \mp \frac{1}{2}g$. Tirez encore par le point A à la Ligne BE, la parallèle $AL \sim \frac{1}{2}g$, & ayant fait la Ligne $LI \sim 2f$, tirez par le point I, à la Ligne BE, la parallèle $IK \sim d$, car ainſi menant la droite LK, & la prolongeant juſqu'à ce qu'elle rencontre la Ligne EB en H, en quelque Lieu que ſoit cette Ligne EB, on aura toujours $NH \sim \frac{dx}{2f}$, & conſéquemment $EH \sim z$. Enfin prolongez la même Ligne LK, juſqu'à ce qu'elle rencontre la Ligne CD auſſi prolongée en O, par où vous mènerez à la Ligne AB la parallèle $OM \sim \omega$. Et parce que le côté LK du Triangle LIK, eſt donné, ſi on

le nomme r , on aura $OH \propto \frac{r\omega}{x^2}$ à cause des Triangles semblables LIK , OMH . Ainsi les deux quantitez indeterminées x , ω , de l'Equation reduite, $\omega\omega \propto qq - \frac{nzz}{m}$, seront representées par les Lignes EH , OM ; & comme leurs extremités ne se joignent pas, on prendra OH pour OM , ou $\frac{r\omega}{x^2}$ pour ω , & $\frac{rr\omega\omega}{4n^2} \propto \frac{qqrr}{4n^2} - \frac{nnrrzz}{4m^2}$, ou $\frac{nnrrzz}{4dm} \propto \frac{qqrr}{4n^2} - \frac{rr\omega\omega}{4n^2}$ pour $\omega\omega \propto qq - \frac{nzz}{m}$, où l'on voit que ce dernier Lieu appartient à une Ellipse, dont le Diametre est à son Parametre, comme nrr à $4ffm$, &c.

20. Fig.

PROBLEME IV.

Construire un Lieu à la Parabole.

Les Lieux qui appartiennent à la Parabole, se peuvent tous reduire à l'une des quatre formules suivantes.

$$yy \propto ax$$

$$yy \propto ax + bb.$$

$$yy \propto ax - bb.$$

$$yy \propto bb - ax.$$

Pour construire le Lieu de la premiere Equation, $yy \propto ax$, supposons que du point fixe A , il parte la Ligne indeterminée $AB \propto x$, & que de son extremité B il parte la Ligne indefinie $BE \propto y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Puisque le Quarré yy de la Ligne $BE \propto y$, est égal au Rectangle ax , on la doit considerer comme l'ordonnée dans une Parabole, & la Ligne $AB \propto x$, comme la partie du Diametre comprise entre le sommet & l'ordonnée. D'où il suit que le Diametre de cette Parabole est sur la Ligne AB , & que le sommet est en A , & de plus que le Parametre est a .

Première
Equation.
21. Fig.

38 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

Construc-
tion.
21. Fig.

Si donc on décrit sur le Diametre AD, une Parabole, dont le Parametre AC $\sim a$, & dont les ordonnées soient parallèles à la Ligne BE, cette Parabole ainsi décrite fera le Lieu de l'Equation proposée $yy \sim ax$.

Demon-
stration.

Car si on prend sur la circonference de cette Parabole un point à volonté, comme E, & qu'on en tire sur le Diametre AD, l'ordonnée BE; comme nous avons fait AC $\sim a$, si l'on suppose AB $\sim x$, & BE $\sim y$, parce que le Rectangle CAB est égal au Quarré de l'ordonnée EB, par la nature de la Parabole, on aura cette Equation, $yy \sim ax$, qui est la même que la proposée.

Deuxième
Equation.
21. Fig.

Pour construire le Lieu de la seconde Equation, $yy \sim ax + bb$, supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indefinie AB $\sim x$, & que de son extremité B, il parte la Ligne indeterminée BE $\sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Puisque le Quarré yy de la Ligne BE $\sim y$, est égal au Rectangle $ax + bb$, dont les côtez sont $a, x + \frac{bb}{a}$, on la doit considerer comme l'ordonnée dans une Parabole, & le côté $x + \frac{bb}{a}$ comme la partie du Diametre entre le sommet & l'ordonnée, & par consequent l'autre côté a comme le Parametre. Mais pour avoir la partie $x + \frac{bb}{a}$, il faut ajoûter à la Ligne AB $\sim x$, la Ligne AC $\sim \frac{bb}{a}$.

Troisième
Equation.
23. Fig.

Pour construire le Lieu de la troisiéme Equation, $yy \sim ax - bb$, on fera une construction semblable à la precedente, excepté qu'au lieu de prendre AC $\sim \frac{bb}{a}$, sur la Ligne AB, prolongée vers A, il la faut prendre sur la même Ligne AB, depuis A vers B, pour avoir BC $\sim x - \frac{bb}{a}$, à cause de $yy \sim ax - bb$.

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 39

Pour construire le Lieu de la quatrième Equation, $yy \sim bb - ax$, on fera une construction tout-à-fait semblable à la précédente, mais il faut concevoir AC plus grande que AB, à cause de $yy \sim bb - ax$. Quatrième Equation. 24. Fig.

Nous avons dit que tous les Lieux à la Parabole peuvent être réduits à l'une des quatre formules précédentes, & pour vous le faire voir, nous ajouterons icy les exemples suivans.

Proposons ce Lieu à la Parabole, $yy + ay \sim bx - \frac{1}{2}aa$. Premier Exemple.
Il en faut premièrement ôter le second terme, en supposant $y \sim z - \frac{1}{2}a$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $zz \sim bx$, qui est de même forme que le premier des quatre précédens.

C'est pourquoy supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indéfinie $AB \sim x$, & que de son extrémité B, il parte la Ligne indéterminée $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE, soit donné. Il faut ajouter à la Ligne $BE \sim y$, la Ligne $BD \sim \frac{1}{2}a$, pour avoir $DE \sim z$, à cause de $y \sim z - \frac{1}{2}a$: mais comme le point B, n'est pas déterminé, tirez du point fixe A, à la Ligne BE, la parallèle AC $\sim \frac{1}{2}a$, & du point C, à la Ligne AB, la parallèle CD, car ainsi en quelque Lieu que soit la Ligne BE, on aura toujours $ED \sim z$: & comme son Carré zz est égal au Rectangle bx , on connoît aisément qu'il faut décrire par le point C, sur le Diamètre CD, une Parabole, dont le Paramètre CF $\sim b$, & dont les ordonnées soient parallèles à la Ligne BE, & cette Parabole ainsi décrite sera le Lieu qu'on cherche. Construction. 25. Fig.

Proposons ce Lieu à la Parabole, $yy - ay \sim bx + cc$. Deuxième Exemple.
Il en faut premièrement ôter le second terme, en sup-

40 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

16. Fig. posant $y \sim x + \frac{1}{4}a$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $xx \sim bx + cc + \frac{1}{4}aa$, qui est de même forme que le second des quatre precedens, duquel par consequent on tirera aisément une construction, sur tout en regardant les noms de chaque Ligne, qui sont icy écrits par ordre.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$DE \sim x.$$

$$AC \sim \frac{1}{4}a.$$

$$CF \sim b.$$

$$CG \sim \frac{cc}{b} + \frac{aa}{4b}.$$

Troisième
Exemple.

Proposons ce Lieu à la Parabole, $yy - ay \sim bx + \frac{1}{4}aa$. Il en faut premierement ôter le second terme, en supposant $y \sim x + \frac{1}{4}a$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $xx \sim bx - \frac{1}{4}aa$, qui est de même forme que le troisième des quatre precedens, duquel par consequent il sera aisé de tirer une construction, en 17. Fig. considerant la valeur de chaque Ligne, que nous avons icy marquée par ordre.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$DE \sim x.$$

$$AC \sim \frac{1}{4}a.$$

$$CF \sim b.$$

$$CG \sim \frac{aa}{4b}.$$

Quatrième
Exemple.

Proposons ce Lieu à la Parabole, $yy - ay \sim cc - bx$. Il en faut premierement ôter le second terme en supposant $y \sim x + \frac{1}{4}a$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $xx \sim \frac{1}{4}aa + cc - bx$, qui est de même forme que le dernier des quatre precedens, duquel par

par conséquent on tirera aisément une construction, 28. Fig.
par la valeur des Lignes, que vous voyez icy.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$DE \sim z.$$

$$AC \sim \frac{1}{b}a.$$

$$FG \sim b.$$

$$CF \sim \frac{az}{ab} + \frac{cc}{b}.$$

Proposons ce Lieu à la Parabole, $yy - \frac{axy}{b} \sim cx - \frac{axy}{AND}$. Cinquième
Il en faut premièrement ôter le second terme, en sup-
posant $y \sim z + \frac{ax}{b}$, pour avoir cet autre Lieu sans se-
cond terme, $zz \sim cx$, qui est semblable à la première
des quatre formules précédentes. Exemple.

C'est pourquoy supposons que du point fixe A, il
parte la Ligne indéfinie $AB \sim x$, & que de son ex-
tremité B, il parte la Ligne indéterminée $BE \sim y$, en
sorte que l'angle ABE, soit donné. Il faut ôter de la
Ligne $BE \sim y$, la Ligne $BC \sim \frac{ax}{b}$, pour avoir $EC \sim z$,
à cause de $y \sim z + \frac{ax}{b}$: mais comme le point B, n'est
pas déterminé, faites $AD \sim zb$, & par le point D,
tirez à la Ligne BE, la parallèle $DF \sim a$, car menant
la droite AF, & la prolongeant jusqu'à ce qu'elle ren-
contre en C, la Ligne BE, en quelque Lieu que soit
cette Ligne BE, on aura toujours $BC \sim \frac{ax}{b}$, & con-
séquentement $EC \sim z$, à cause des Triangles sembla-
bles ABC, ADF. Et parce que dans le Triangle ADF,
on connoît les deux côtes AD, DF, & l'angle com-
pris ADF, le troisième AF, sera aussi connu, & si
on le nomme r , on trouvera $AC \sim \frac{ra}{b}$; Ainsi les deux
quantitez indéterminées x, z , du Lieu réduit $zz \sim cx$,
seront représentées par les deux Lignes AB, CE, &
F

Construc-
tion.
29. Fig.

42 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

29. Fig. comme leurs extremités ne se joignent pas, on prendra AC pour AB, ou $\frac{ix}{ib}$ pour x . Or comme le Carré de CE, ou xx , est la première partie du Lieu réduit $xx \sim cx$, on connoît quelle est l'ordonnée dans la Parabole qu'on cherche, dont le Parametre seroit c , si la partie du Diametre entre le sommet & l'ordonnée étoit x , mais comme elle est $\frac{ix}{ib}$, ou AC, au lieu de c pour Parametre, on aura $\frac{ibc}{i}$, qu'on trouvera en divisant c par $\frac{i}{ib}$. Si donc on décrit par le point A, sur le Diametre AC, une Parabole, dont le Parametre AG $\sim \frac{ibc}{i}$, & dont les ordonnées soient parallèles à la Ligne BE, cette Parabole ainsi décrite sera le Lieu qu'on cherche.

Démonstration.

Car si l'on prend sur la circonférence de cette Parabole un point à volonté, comme E, & qu'on en tire sur le Diametre AC, l'ordonnée CE: comme nous avons fait AD $\sim 2b$, DF $\sim a$, AF $\sim r$, & le Parametre AG $\sim \frac{ibc}{i}$, si l'on suppose AB $\sim x$, & BE $\sim y$, on aura AC $\sim \frac{ix}{ib}$, BC $\sim \frac{ax}{ib}$, & CE $\sim y - \frac{ax}{ib}$, dont le Carré étant égal au Rectangle GAC, par la nature de la Parabole, on aura cette Equation, $yy - \frac{2xf}{ib} + \frac{aaxx}{ibb} \sim cx$, ou $yy - \frac{axx}{b} \sim cx - \frac{aaxx}{4ib}$, qui est la même que la proposée.

La raison pourquoy il faut diviser c par $\frac{i}{ib}$, pour avoir le Parametre de la Parabole, est telle. Puisque le Rectangle GAC, ou $\frac{ixx}{ib}$, en supposant le Parametre AG $\sim a$, est égal au Carré xx de l'ordonnée EC $\sim x$, & que ce même Carré xx est égal au Rectangle cx , on aura cette Equation, $\frac{ixx}{ib} \sim cx$, dans laquelle on trouvera $a \sim \frac{ibc}{i}$, pour le Parametre AG.

Sixième Exemple.

Proposons encore ce Lieu à la Parabole, $yy + \frac{axx}{b} +$

$dy \sim cc - \frac{axx}{4bb}$. Il en faut premierement ôter le second terme, en supposant $y \sim x - \frac{ax}{4b} - \frac{1}{4}d$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $xx \sim cc + \frac{1}{4}dd + \frac{adx}{4b}$, & si l'on suppose $cc + \frac{1}{4}dd \sim ff$, & $\frac{ad}{4b} \sim m$, on aura cet autre Lieu, $xx \sim ff + mx$, qui est semblable à la seconde des quatre formules precedentes.

C'est pourquoy supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indefinie AB $\sim x$, & de son extremité B, la Ligne indeterminée BE $\sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ajoûter à la Ligne BE $\sim y$, la Ligne BD $\sim \frac{1}{4}d$, & la Ligne DH $\sim \frac{ax}{4b}$ pour avoir EH $\sim x$, à cause de $y \sim x - \frac{ax}{4b} - \frac{1}{4}d$. Mais comme le point B n'est pas déterminé, tirez par le point A à la Ligne BE, la parallele AC $\sim \frac{1}{4}d$, & par le point C, à la Ligne AB, la Parallele CF $\sim 2b$. Enfin tirez du point F à la Ligne BE, la parallele FG $\sim a$, car menant la droite CG, & la prolongeant jusqu'à ce qu'elle rencontre la Ligne BE, aussi prolongée en H, en quelque Lieu que soit cette Ligne BE, on aura toujours DH $\sim \frac{ax}{4b}$, à cause des Triangles semblables CFG, CDH, & consequemment EH $\sim x$, dont le Quarré xx étant égal au Rectangle $ff + mx$, dont les côtez sont m , $\frac{ff}{m} + x$, on connoît que le Parametre doit être m , & que la partie du Diametre entre le sommet & l'ordonnée devroit être $\frac{ff}{m} + x$, qu'on trouvera en ajoûtant à la Ligne AB $\sim x$, la Ligne AI $\sim \frac{ff}{m}$, pour avoir BI $\sim \frac{ff}{m} + x$, qui ne peut pas être cette partie interceptée, parce que la Ligne BE n'est pas l'ordonnée, ou x , car c'est EH. Il faut donc que cette partie interceptée soit sur la Ligne CH, afin qu'elle soit correspondante à l'ordonnée EH : mais comme

Construc-
tion.
30. Fig.

30. Fig.

elle doit aussi avoir un rapport avec la Ligne BI, on tirera du point I, à l'ordonnée EH, la parallèle IK, laquelle rencontrant la Ligne CH, prolongée en K, donnera le point K, pour le sommet de la Parabole, & KH, pour la partie du Diametre entre le sommet & l'ordonnée. Il n'y a donc plus qu'à déterminer la longueur du Parametre, & la valeur de la partie KH, ce que nous ferons ainsi.

Puisque dans le Triangle CFG, on connoît les deux côtes CF, FG, & l'angle compris CFG, le troisième côté CG sera aussi connu, & si on le nomme r , on trouvera $CH \sim \frac{rx}{zb}$, & $CK \sim \frac{fr}{zbm}$, & conséquemment $KH \sim \frac{fr}{zbm} + \frac{rx}{zb}$, pour la partie interceptée. Or si cette partie interceptée étoit $\frac{a}{m} + x$, ou BI, le Parametre seroit m , comme vous avez vû. C'est pourquoy le Parametre doit changer, & pour le trouver, on le nommera u , & parce que le Rectangle sous le Parametre KL, & la partie interceptée KH, sçavoir $\frac{fr u}{zbm} + \frac{rx u}{zb}$, est égal au Quarré xx , de l'ordonnée EH $\sim x$, & que ce même Quarré xx est égal à $ff + mx$, on aura cette Equation, $\frac{fr u}{zbm} + \frac{rx u}{zb} \sim ff + mx$, dans laquelle on trouvera $\frac{zbm}{u} \sim u$, pour le Parametre KL. Si donc on décrit par le point K, sur le Diametre KH, une Parabole, dont le Parametre KL $\sim \frac{zbm}{u}$, & dont les ordonnées soient parallèles à la Ligne EH, cette Parabole ainsi décrite sera le Lieu qu'on cherche.

PROBLEME V.

*Construire un Lieu à l'Hyperbole entre ses
Asymptotes.*

Les Equations qui donnent des Lieux à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, se peuvent toutes reduire à une de même forme que la suivante, $xy \sim ab$, dont la construction est telle.

Supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indéfinie $AB \sim x$, & de son extrémité B, la Ligne indéterminée $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Tirez du point fixe A, à la Ligne BE, la parallèle AC égale à l'une des deux quantitez connues a, b , du Rectangle ab , comme à la première a , & par le point C, à la Ligne AB, la parallèle CD, égale à l'autre quantité connue b ; Après cela décrivez du centre A, par le point D, entre les Asymptotes AB, AC, une Hyperbole, qui sera le Lieu qu'on cherche.

Construc.
tion.
31. Fig.

Car si on prend sur la circonference de cette Hyperbole un point à volonté, comme E, & que l'on en tire à l'une des Asymptotes AB, AC, comme à AC, la parallèle EB; comme nous avons fait $AC \sim a$, & $CD \sim b$, si l'on suppose $AB \sim x$, & $BE \sim y$, on considerera que puisque le Rectangle ACD est égal au Rectangle ABE, par la nature des Asymptotes, on aura cette Equation, $ab \sim xy$, qui est la même que la proposée.

Demonst.
tration.

Pour vous faire voir que toutes les Equations à l'Hyperbole entre ses Asymptotes se peuvent reduire

à une de même forme que la precedente, nous ajoûterons icy les Exemples suivans.

Premier Exemple. Proposons donc premierement ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ab \sim \frac{cy}{d} + my$. On divisera en premier lieu, l'Equation proposée par $\frac{c}{d}$, pour avoir cette autre Equation, $\frac{abd}{c} \sim xy + \frac{dmy}{c}$, où le Rectangle xy des deux lettres inconnues se trouve réduit à l'unicé, ce qui doit toujours être ainsi, autrement le Lieu proposé seroit mal resolu. Supposez $x + \frac{dm}{c} \sim z$, pour avoir cet autre Lieu, $\frac{abd}{c} \sim yz$, & si vous supposez $\frac{abd}{c} \sim nd$, on aura ce dernier Lieu $nd \sim yz$, qui est de même forme que le precedent.

Construction. C'est pourquoy supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indeterminée $AB \sim x$, & de son extremité B, la Ligne indefinie $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ajoûter à la Ligne $AB \sim x$, la Ligne $AC \sim \frac{dm}{c}$, pour avoir $BC \sim z$, à cause de $x + \frac{dm}{c} \sim z$. Tirez par le point C à la Ligne BE, la parallele $CD \sim x$, & par le point D, à la Ligne BC, la parallele $DF \sim d$, & décrivez du centre C, par le point F, entre les Asymptotes CB, CD, une Hyperbole, qui sera le Lieu qu'on cherche, & la démonstration s'en fera comme auparavant.

Deuxième Exemple. Proposons ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ab \sim \frac{cy}{d} - my$. Divisez-le par $\frac{c}{d}$, pour avoir cet autre Lieu, $\frac{abd}{c} \sim xy - \frac{dmy}{c}$, dans lequel supposant $x - \frac{dm}{c} \sim z$, il viendra cet autre Lieu $\frac{abd}{c} \sim yz$, & si l'on suppose $\frac{abd}{c} \sim dn$, on aura ce dernier Lieu réduit $dn \sim yz$, qui étant de même forme que le precedent, on en tirera aisément une construction, par les noms de chaque Ligne, qui sont icy marquez.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$BC \sim z.$$

$$AC \sim \frac{dm}{c}.$$

$$DF \sim d.$$

$$CD \sim n.$$

33. Fig.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ab \sim my - \frac{xy}{u}$, ou $\frac{ab}{c} \sim \frac{dmy}{c} - xy$. Supposiez $\frac{dm}{c} - x \sim z$, ou $\frac{ab}{c} \sim dn$, pour avoir cet autre Lieu réduit $dn \sim yz$, d'où l'on tirera aisément une construction à l'imitation de la précédente, en considérant les noms de chaque Ligne, qui sont icy marquez.

Troisième
Exemple.

34. Fig.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$BC \sim z.$$

$$AC \sim \frac{dm}{c}.$$

$$DF \sim d.$$

$$CD \sim n.$$

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ax \sim xy - by$. Supposiez premièrement $x - b \sim z$, pour avoir cet autre Lieu, $yz - az \sim ab$. Supposiez encore $y - a \sim w$, pour avoir ce dernier Lieu réduit, $ab \sim zw$, duquel on tirera aisément une construction, par les noms de chaque Ligne, qui sont icy marquez.

Quatrième
Exemple.

35. Fig.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$BC \sim z.$$

$$EF \sim w.$$

$$AC \sim b \sim DG.$$

$$GH \sim a \sim CD.$$

36. Fig.

$$CG \propto a + b.$$

$$BF \propto a.$$

Cinquième
Exemple.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ax \propto xy + by$. Supposiez premierement $x + b \propto z$, pour avoir cet autre Lieu, $az - ab \propto yz$, ou $ab \propto az - yz$. Supposiez encore $a - y \propto u$, pour avoir ce dernier Lieu reduit, $ab \propto zu$, duquel on tirera aisément une construction, par la valeur de chaque Ligne, que nous avons icy ajoutée.

36. Fig.

$$AB \propto x.$$

$$BE \propto y.$$

$$BC \propto z.$$

$$EF \propto u.$$

$$CD \propto a.$$

$$AC \propto b.$$

$$DF \propto b + x.$$

$$BC \propto b + x.$$

Sixième
Exemple.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ax \propto by - xy$. Supposiez premierement $b - x \propto z$, pour avoir cet autre Lieu, $ab \propto az + yz$. Supposiez encore $a + y \propto u$, pour avoir ce dernier Lieu reduit, $ab \propto zu$, duquel on tirera aisément une construction, par les noms de chaque Ligne, qui ont été icy marquez.

37. Fig.

$$AB \propto x.$$

$$BE \propto y.$$

$$BC \propto z.$$

$$EF \propto u.$$

$$AC \propto b \propto DG.$$

$$GH \propto a \propto CD.$$

$$CG \propto b - a.$$

$$DE \propto z.$$

Proposons

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 49

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ab - xx \sim xy \dagger cy$. Supposé Septième Exemple. premierement $x \dagger c \sim z$, ou $x \sim z - c$, pour avoir cet autre Lieu, $ab - cc \sim zz - 2cz \dagger yz$. Supposé encore $z - 2c \dagger y \sim \omega$, pour avoir ce dernier Lieu réduit, $ab - cc \sim z\omega$, ou $dd \sim z\omega$, en supposant $ab - cc \sim dd$.

Pour la construction, supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indéfinie $AB \sim x$, & de son extrémité B, la Ligne indéterminée $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ajouter à la Ligne $AB \sim x$, la Ligne $AC \sim c$, pour avoir $BC \sim z$, à cause de $x \dagger c \sim z$. Il faut aussi ajouter à la Ligne $BE \sim y$, la Ligne $BG \sim z - 2c$, pour avoir $EG \sim \omega$, à cause de $z - 2c \dagger y \sim \omega$: mais comme le point B n'est pas déterminé, faites $CF \sim 2c$, & tirez par le point C, à la Ligne BE, la parallèle $CD \sim 2c$, car menant la droite DF, & la prolongeant jusqu'à ce qu'elle rencontre la Ligne BE, aussi prolongée en G, en quelque Lieu que soit cette Ligne BE, on aura toujours $BG \sim z - 2c$, à cause des deux Triangles isocèles semblables CFD, BFG, & par conséquent $EG \sim \omega$. Ainsi les deux quantitez indéterminées z, ω , du Lieu réduit $dd \sim z\omega$, seront représentées par les deux Lignes CB, EG, & comme leurs extrémités ne se joignent pas, à la place de $BC \sim z$, on prendra son égale & parallèle EK: & parce que le Rectangle KEG, ou $z\omega$, est égal au Rectangle dd , dont les côtés sont d, d , on tirera du point D, à la Ligne KE, la parallèle $DH \sim d$, & on décrira du centre D, par le point H, entre les Asymptotes DL, DG, une Hyperbole qui sera le Lieu qu'on cherche.

Construction.
38. Fig.

50 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

Demonf-
tration.
38. Fig.

Car si l'on prend sur la circonference de cette Hyperbole un point à discretion, comme E, & que l'on tire à l'une des Asymptotes, la parallele BE & par le point H, la parallele HI; comme nous avons fait AC $\propto c$, CD $\propto 2c$, CF $\propto 2c$, & DH $\propto d \propto HI$, si l'on suppose AB $\propto x$, & BE $\propto y$, on aura CR ou KE $\propto x + c$, & BF ou BG $\propto x - c$, & par conséquent EG $\propto x - c + y$, & parceque le Rectangle KEG est égal au Rectangle DHI, par la propriété des Asymptotes, on aura cette Equation, $xx + cy + xy - cc \propto ab - cc$, ou $ab - xx \propto xy + cy$, qui est la même que la proposée.

Huitième
exemple.

Proposons encore ce Lieu à l'Hyperbole entre ses Asymptotes, $ax - xx \propto ab - xy - cy$. Supposez premièrement $x + c \propto z$, ou $x \propto z - c$, pour avoir cet autre Lieu, $az - ac - zz + 2cz - cc \propto ab - yz$, ou $ab + ac + cc \propto az - zz + 2cz + yz$. Supposez encore $a - z + 2c + y \propto w$, pour avoir ce dernier Lieu réduit, $ab + ac + cc \propto zw$, ou $dd \propto zw$, en supposant $ab + ac + cc \propto dd$. D'où l'on tirera aisément une construction à l'imitation de la précédente. C'est pourquoy je me contenteray de vous donner icy les noms de chaque Ligne.

39. Fig.

$$AB \propto x.$$

$$BE \propto y.$$

$$BC \propto z.$$

$$EG \propto w.$$

$$AC \propto c.$$

$$DH \propto d.$$

$$CD \propto 2c + a \propto CF.$$

$$BG \propto 2c + a - z.$$

$$KE \propto x + c.$$

$$BG \propto a + c - x.$$

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 51

$$EG \sim a + c - x + y.$$

39. Fig.

$$d \sim R. ab + ac + ce.$$

Les Equations de ces deux derniers exemples appartiennent aussi à une Hyperbole par son Parametre, comme vous allez voir dans le Probleme suivant.

PROBLEME VI.

Construire un Lieu à l'Hyperbole par son Parametre,

Les Lieux à l'Hyperbole par son Parametre se peuvent tous reduire à l'une des deux formules suivantes.

$$xx - aa \sim yy.$$

$$xx - aa \sim \frac{byy}{c}.$$

Pour construire le Lieu de la premiere Equation, Premiere Equation.
 $xx - aa \sim yy$, lequel est une Hyperbole Equilatera, comme vous allez voir, supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indeterminée AB $\sim x$, & de son extremité B, la Ligne indefinie BE $\sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Puisque le Quarré yy de la Ligne BE $\sim y$, est égal au Rectangle $xx - aa$, dont les côtez sont $x + a$, $x - a$, on doit considerer cette Ligne BE comme une ordonnée dans l'Hyperbole, & les côtez $x + a$, $x - a$, doivent être sur le Diametre de la même Hyperbole. Ainsi on doit considerer la Ligne AB $\sim x$, comme une partie de ce Diametre prolongé autant qu'il en sera besoin, & à cause des côtez $x + a$, $x - a$, on luy doit ajoûter d'une part la Ligne AD $\sim a$, & de l'autre côté en ôter la Ligne AC $\sim a$, pour avoir DB $\sim x + a$, & BC $\sim x - a$, dont le Rectangle DBC, ou $xx - aa$, estant égal au Quarré

40. Fig.

Gij

52 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

40. Fig. yy de la Ligne $BE \sim y$, on connoît que CD ou $2a$ est le Diametre déterminé d'une Hyperbole Equilateré, & que par conséquent le point A en est le centre, & C le sommet.

Si donc on décrit du centre A , par le point C , une Hyperbole, dont le Diametre détermine $CD \sim 2a$, soit égal à son Parametre, & dont les ordonnées soient parallèles à la Ligne BE , cette Hyperbole ainsi décrite fera le Lieu de l'Equation proposée $xx - aa$

$\sim yy$.

Demonstration.

Car si on prend sur la circonférence de cette Hyperbole un point à volonté, comme E , & qu'on en tire sur le diametre CB , l'ordonnée BE ; comme nous avons fait $AC \sim a$, & $AD \sim a$, si l'on suppose $AB \sim x$, & $BE \sim y$, on aura $DB \sim x + a$, & $BC \sim x - a$, & parce que le Rectangle DBC , est égal au Quarré de l'ordonnée BE , par la nature de l'Hyperbole Equilateré, on aura cette Equation, $xx - aa \sim yy$, qui est la même que la proposée.

Deuxième Equation.

Pour construire le Lieu de la seconde Equation, $xx - aa \sim \frac{b^2 yy}{c^2}$, on en tirera premièrement cette analogie, $b, c :: xx - aa, yy$, qui fait connoître, que ce Lieu est à une Hyperbole Scalene, dont le Diametre déterminé est à son Parametre, comme b , à c , après quoy on trouvera aisément une construction à l'imitation de la précédente, en considerant les noms de chaque Ligne, qui sont icy marquez.

41. Fig.

$AB \sim x$
 $BE \sim y$
 $AC \sim a$
 $CD \sim 2a$

$$BD \sim x + a.$$

$$BC \sim x - a.$$

$$\text{Diam. Param.} :: b, c.$$

$$2d. \frac{ac}{b^2}$$

41. Fig.

Pour vous faire voir que toutes les Equations qui donnent des Lieux à l'Hyperbole par son Parametre, se peuvent reduire à l'une des deux precedentes, nous ajoûterons icy les Exemples suivans.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole par son Parametre, $xx + ax \sim yy$. Il en faut premièrement ôter le second terme, en supposant $x \sim z - \frac{1}{2}a$, pour avoir cette autre Equation sans second terme, $zz - \frac{1}{4}aa \sim yy$, qui est de même forme que la premiere des deux precedentes.

Premier
Exemple.

C'est pourquoy supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indefinie $AB \sim x$, & de son extremité B, la Ligne indeterminée $BE \sim y$, en sorte que l'angle ABE, soit donné. Il faut ajoûter à la Ligne $AB \sim x$, la Ligne $AC \sim \frac{1}{2}a$, pour avoir $CB \sim z$, à cause de $x + \frac{1}{2}a \sim z$: & parce que dans le Lieu reduit, $zz - \frac{1}{4}aa \sim yy$, le Quarré yy de la Ligne $BE \sim y$, est égal au Rectangle $zz - \frac{1}{4}aa$, dont les côtez sont $z + \frac{1}{2}a$, $z - \frac{1}{2}a$, dont $z - \frac{1}{2}a$, est représenté par la Ligne $AB \sim x$, on aura l'autre côté $z + \frac{1}{2}a$, en ajoûtant à la Ligne $BC \sim z$, la Ligne $CD \sim \frac{1}{2}a$, après quoy le reste sera facile à achever..

Construc-
tion.
42. Fig.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole par son Parametre, $xx - ax \sim yy$. Il en faut premièrement ôter le second terme, en supposant $x \sim z + \frac{1}{2}a$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $zz + \frac{1}{4}aa \sim yy$, qui est de même forme que la premiere des deux formules.

Deuxième
Exemple.

54 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

precedentes. C'est pourquoy on en tirera aisément une construction, en considerant les noms de chaque Ligne, qui sont icy marquez.

$$AB \sim x.$$

$$BE \sim y.$$

$$BC \sim z.$$

$$AC \sim \frac{1}{x} a \sim CD.$$

$$BC \sim x - \frac{1}{x} a.$$

$$BD \sim x - a.$$

$$Diam. \sim Param.$$

$$a \quad a$$

Troisième
Exemple.

44. Fig.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole par son Parametre, $xx - ax \sim \frac{by}{c}$. Il en faut premierement ôter le second terme, en supposant $x \sim z + \frac{1}{x} a$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $zz - \frac{1}{x} aa \sim \frac{by}{c}$, qui est semblable à la dernière des deux formules precedentes, ce qui fait connoître que le Lieu proposé $xx - ax \sim \frac{by}{c}$, est à une Hyperbole, dont le Diametre déterminé est à son Parametre comme b à c , à cause de la fraction $\frac{by}{c}$. Après quoy la construction sera tout-à-fait la même que la precedente.

Quatrième
Exemple.

45. Fig.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole par son Parametre, $xx + ax \sim \frac{by}{c}$. Il en faut premierement ôter le second terme, en supposant $x \sim z - \frac{1}{x} a$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $zz - \frac{1}{x} aa \sim \frac{by}{c}$, qui étant semblable à la dernière des deux formules precedentes, fait connoître que le Lieu proposé $xx + ax \sim \frac{by}{c}$, est à une Hyperbole, dont le Diametre est à son Parametre comme b à c , après quoy la construction sera tout-à-fait la même que celle du premier Exemple.

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 55

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole par son Parametre, $xx + ax \sim yy + by$. Il en faut premièrement ôter les seconds termes, en supposant $x \sim z - a$, & $y \sim w - \frac{1}{2}b$, pour avoir cet autre Lieu sans second terme, $zz + \frac{bb-aa}{4} \sim ww$, ou $zz - \frac{1}{4}dd \sim ww$, en supposant $bb - aa \sim -dd$. D'où nous avons tiré cette construction.

Cinquième
Exemple.
45. Fig.

Supposons que du point fixe A, il parte la Ligne indéfinie AB $\sim x$, & de son extrémité B, la Ligne indéterminée BE $\sim y$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ajouter à la Ligne AB $\sim x$, la Ligne AC $\sim \frac{1}{2}a$, pour avoir BC $\sim z$, à cause de $x \sim z - \frac{1}{2}a$. Mais il faut ajouter à la Ligne BE $\sim y$, la Ligne BF $\sim \frac{1}{2}b$, pour avoir EF $\sim w$, à cause de $y \sim w - \frac{1}{2}b$. Mais comme le point B n'est pas déterminé, tirez du point C, à la Ligne BE, la parallèle CD $\sim \frac{1}{2}b$, & du point D, à la Ligne AB, la Parallèle DF $\sim z$, car ainsi vous aurez EF $\sim w$. Ainsi les deux quantitez indéterminées z, w , du Lieu réduit $zz - \frac{1}{4}dd \sim ww$, seront représentées par les deux Lignes DF, EF: après quoy le reste sera facile à achever.

Construc-
tion.
46. Fig.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole par son Parametre, $xx - ax \sim yy - by$. Si on ôte les seconds termes, en supposant $x \sim z + \frac{1}{2}a$, & $y \sim w + \frac{1}{2}b$, on trouvera aisément une construction à l'imitation de la précédente, & il ne faut que regarder la Figure pour la comprendre.

Sixième
Exemple.
48. Fig.

Proposons ce Lieu à l'Hyperbole, $ab - xx \sim xy + cy$, ou $xx + xy \sim ab - cy$, qui est le même que celui que nous avons proposé au septième Exemple du Problème précédent. Il en faut premièrement ôter le second terme, en supposant $x \sim z - \frac{1}{2}y$, pour avoir cet autre

Septième
Exemple.

56 DES LIEUX GEOMETRIQUES.

48. Fig. Lieu, $xx - \frac{1}{2}yy \sim ab - cy$, ou $yy - 4cy \sim 4xz - 4ab$, d'où il faut encore ôter le second terme, en supposant $y \sim \omega + 2c$, pour avoir ce dernier Lieu, $\omega\omega - 4cc + 4ab \sim 4xz$, ou $\omega\omega - dd \sim 4xz$, en supposant $4ab - 4cc \sim -dd$.

Construc-
tion. 47. Fig. Pour la construction, supposez que du point fixe A, il parte la Ligne indéterminée AB $\sim y$, & de son extrémité B, la Ligne indéfinie BE $\sim x$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ajouter à la Ligne BE $\sim x$, la Ligne BF $\sim \frac{1}{2}y$, pour avoir EF $\sim z$, à cause de $x \sim z - \frac{1}{2}y$: mais comme le point B n'est pas déterminé, prolongez comme vous voudrez la Ligne AB en C, & tirez par le point C, à la Ligne BE, la parallèle CD, égale à la moitié de AC, car menant la droite AD, & la prolongeant jusqu'à ce qu'elle rencontre la Ligne BE, aussi prolongée en F, on aura BF $\sim y$, à cause des Triangles semblables ACD, ABF, & conséquemment EF $\sim z$. Il faut encore ôter de la Ligne AB $\sim y$, la Ligne AG $\sim 2c$, pour avoir GB $\sim \omega$, à cause de $y \sim \omega + 2c$. Ainsi les deux quantitez indéterminées z, ω , du Lieu réduit $\omega\omega - dd \sim 4xz$, seront représentées par les deux Lignes EF, GB: mais comme leurs extrémités ne se joignent pas, on tirera du point G, à la Ligne BE, la parallèle GH, & on prendra FH, pour GB, c'est-à-dire $\frac{nn}{m}$ pour ω ; car si l'on suppose AC $\sim m$, & AD $\sim n$, on trouvera HF $\sim \frac{nn}{m}$. Puisque donc on change ω en $\frac{nn}{m}$, il faut aussi changer le Lieu réduit $\omega\omega - dd \sim 4xz$, en celui-ci, $\frac{nn\omega\omega}{mm} - \frac{ddnn}{mm} \sim 4xz$, d'où l'on tire cette analogie, $4nn, mm :: \frac{nn\omega\omega}{mm} - \frac{ddnn}{mm}, zz$, qui fait connoître que le Lieu proposé $ab - xx \sim xy + cy$, est à une Hyperbole, dont le Diamètre

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 57

mettre est à son Parametre , comme $4nn$ à mm ; Après 47. Fig.
quoy le reste s'achevera facilement , en regardant les
noms de chaque Ligne , que nous avons icy ajoûtez.

$$AB \sim \gamma.$$

$$BE \sim x.$$

$$EF \sim \varepsilon.$$

$$BG \sim \omega.$$

$$AC \sim m.$$

$$CD \sim \frac{1}{2} m.$$

$$EF \sim \frac{1}{2} \gamma.$$

$$AG \sim 2\varepsilon.$$

$$AD \sim n.$$

$$HF \sim \frac{nw}{m}.$$

$$HI \sim \frac{dn}{m} \sim HK.$$

$$KI \sim \frac{adn}{m}.$$

$$\text{Diam. Param.} :: 4nn, mm.$$

$$\frac{adn}{m} \cdot \frac{dn}{2n}.$$

Nous avons supposé 4α plus grand que $4ab$, & s'il
avoit été moindre , le Lieu reduit seroit tel , $\omega\omega + dd$
 $\sim 4\varepsilon\varepsilon$, ou $4\varepsilon\varepsilon - dd \sim \omega\omega$, dont la construction est 49. Fig.
semblable à la precedente , excepté que le Diametre
de l'Hyperbole est sur la Ligne GH , & que le Dia-
metre traversant est à son Parametre , comme mm à
 $4nn$, car si on multiplie le Lieu reduit $4\varepsilon\varepsilon - dd \sim \omega\omega$,
par $\frac{nn}{mm}$, comme il a été fait auparavant, on aura cet
autre Lieu, $\frac{nn\varepsilon\varepsilon}{mm} - \frac{ddnn}{mm} \sim \frac{nn\omega\omega}{mm}$, d'où l'on tire cette ana-
logie $mm, 4nn :: \varepsilon\varepsilon - \frac{1}{2} dd, \frac{nn\omega\omega}{mm}$, qui fait connoître
que le Diametre est à son Parametre , comme mm à
 $4nn$, & que le demy Diametre est $R \div dd$, ou $\div d$,
& enfin que $R \frac{nn\omega\omega}{mm}$, ou $\frac{nw}{m}$, ou EM est une ordonnée
dans l'Hyperbole, &c. Voyez les noms de chaque Ligne.

H

19. Fig.

$$AB \sim y.$$

$$BE \sim x.$$

$$EF \sim z.$$

$$BG \sim w.$$

$$AC \sim m.$$

$$CD \sim \frac{1}{2}m.$$

$$BF \sim \frac{1}{2}y.$$

$$AG \sim 2c.$$

$$AD \sim n.$$

$$KM \sim z + \frac{1}{2}d.$$

$$IM \sim z - \frac{1}{2}d.$$

$$HI \sim \frac{1}{2}d \sim HK.$$

$$\text{Diam. Param.} = mm, 4nn.$$

$$d. \frac{a \text{ den}}{mm}.$$

Huitième
Exemple.

Proposons encore ce Lieu à l'Hyperbole, $ax^2 - xx$
 $\sim ab - xy - cy$, ou $xx - ax - xy \sim cy - ab$, qui est la même que celle que nous avons proposée au huitième Exemple du Probleme precedent. Il en faut premièrement ôter le second terme, en supposant $x \sim z + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}y$, pour avoir cet autre Lieu, $zz - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}ay - \frac{1}{2}yy \sim cy - ab$, ou $yy + 2ay + 4cy \sim 4ab - aa + 4zz$, d'où il faut encore ôter le second terme, en supposant $y \sim w - a - 2c$, pour avoir ce dernier Lieu, $ww - 4ab - 4ac - 4cc \sim 4zz$, ou $ww - dd \sim 4zz$, en supposant $4ab + 4ac + 4cc \sim dd$.

Construc.
tion.
10. Fig.

Pour la construction, supposez que du point fixe A, il parte la Ligne indéterminée $AB \sim y$, & de son extrémité B, la Ligne indéfinie $BE \sim x$, en sorte que l'angle ABE soit donné. Il faut ôter de la Ligne $BE \sim x$, la Ligne $BH \sim \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}y$, pour avoir $EH \sim z$, à cause de $x \sim z + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}y$: Mais comme le point B, n'est

DES LIEUX GEOMETRIQUES. 59

pas déterminé, tirez du point A, à la Ligne BE, la
 10. Fig.
 parallele AC $\propto \frac{1}{2}a$, & du point C, à la Ligne AB,
 la parallele CD, qui donnera BD $\propto \frac{1}{2}a$; & pour avoir
 DH $\propto \frac{1}{2}y$, prenez sur CD, une Ligne quelconque
 CF $\propto m$, & tirez par le point F, à la Ligne BE, la
 parallele FG $\propto \frac{1}{2}m$, car menant la droite CG, & la
 prolongeant jusqu'à ce qu'elle rencontre la Ligne BE,
 en H, vous aurez DH $\propto \frac{1}{2}y$, à cause des Triangles
 semblables CFG, CDH, & par conséquent DH $\propto$
 $\frac{1}{2}a \div \frac{1}{2}y$, & EH $\propto x$. Il faut ajouter à la Ligne AB,
 ou CD $\propto y$, la Ligne CI $\propto a \div 2c$, pour avoir ID $\propto \omega$,
 à cause de $y \propto \omega - a - 2c$. Ainsi les deux quantitez inde-
 terminées x, ω , du Lieu reduit $\omega\omega - dd \propto x x$, seront
 représentées par les deux Lignes, EH, ID; & comme
 leurs extremitéz ne se joignent pas, on tirera du point
 I, à la Ligne BE, la parallele IK, qui rencontrera la
 Ligne CH, au point K, qui sera le centre de l'Hy-
 perbole, parce que l'on doit changer la Ligne ID $\propto \omega$
 en la Ligne KH $\propto \frac{\omega\omega}{m}$, & par conséquent le Lieu re-
 duit $\omega\omega - dd \propto x x$, en celuy-cy $\frac{\omega\omega\omega\omega}{mm} - \frac{d\omega\omega\omega}{mm} \propto \frac{\omega\omega x x}{mm}$, & ache-
 ver le reste comme dans l'Exemple precedent.





F I N.

803363



800374


















D $yvaqx.$

Li. Geom. p. 23.



$yvaqx + c.$







$$yy - by \sim xx - xx$$

$$xxaa - \frac{byy}{c}$$



$$xx + \partial x \sim aa - \frac{byy}{c}$$



$$xx + ax \sim aa^{-b} \frac{yy'}{\varepsilon}$$






$$xx - \partial x \vee ay - \frac{byy}{c}$$

$$yy - \frac{\partial xy}{f} \vee aa - \frac{bxx}{c}$$



$$yy + \partial xy \vee ax - \frac{bxx}{c}$$



$$yy + \partial xy - \frac{\partial xy}{f} \vee aa - \frac{bxx}{c}$$




yyvax

Li. Geom. p. 38.


yyvaxtbb.




yyvax-bb.




yyvbb-ax.



yytayvbx^{1/4}aa.







yy-ayvbx^{1/4}cc.






















$$xx - aa \sim \frac{byy}{c}$$

Li. Geom. p. 53.


$$xx + ax \sim yy$$



$$xx - ax \sim yy$$



$$xx - ax \sim \frac{byy}{c}$$








$xx \sim byy.$

Li. Geom. p. 55.

$xx \sim yy \sim byy.$







$xx-axvyy-by$

Li. Geom. p. 57.

$ab-xxvxytcy$



$ax-xxvab-xy-cy$

